

زراعة البانيك

الدكتور إبراهيم بولس إبراهيم
و كيل تقدير الزراعة بميت غمر

البانيك هو المحصول الذي تستعمل حبوبه في تغذية طيور الزينة و بيع هواة تربية هذه الطيور بأثمان غالبة، و ذلك كثراً فيما يلي طريقة زراعة هذا المحصول:

الارض المواتقة: ينمو هذا المحصول في كل أنواع الاراضي تقريباً

تجهيز الارض للزراعة: يتوقف عدد مرات الحرش على طبيعة الارض فتحرث إما وجهاً واحداً أو وجهين وتزحف ثم تقسم إلى أحواض.

موعد الزراعة: البانيك محصول صيفي يزرع خلال شهري أبريل ومايو، وبمسكن

زراعته عروة ثانية بعد نضج الأولى.

طريقة الزراعة: تزرع التقاوى شرائفي أحواض، وتعطى بعد الزراعة جيداً ثم تروى وإذا كانت المساحة المزروعة صغيرة زرع البانيك تلقياً في سطور على أبعاد تتراوح بين ٣٠ و ٤٠ سنتيمتراً.

كثافة التقاوي: يسكن الفدان من ٦ - ٨ أقداح من حبوب البانيك.

الخلف: تخفف النباتات عندما يبلغ طولها نحو ١٥ سنتيمتراً وترك نباتان في الجورة.

الرى: يتوقف عدد الريات على طبيعة الأرض، وهي تروى في المتوسط كل أسبوعين

التسميد: يجب أن يسمد هذا المحصول تسميداً جيداً، فإذا توفر السماد البسلدي سمد الفدان بنحو ٢٠٠ غريط وإذا استعمل السماد الكيماوى فإن ما يتراوح بين ١٠٠ و ١٥٠ كيلو من التربات يكفى، على أن توضع على دفتين: الأولى بعد الخلف مباشرة والثانية بعد نحو أسبوعين من الأولى.

العرق: يتوقف عدد مرات العرق على نوع الأرض ونمو الحشائش، ولتعزق الأرض عادة عند الخلف وتتقى الحشائش كلما لزم ذلك.

الحصاد: يجب حصاد البانيك عندما تكون الحبة قد نضجت تماماً وتبدأ الأوراق في الذبول ويكون ذلك عادة بعد نحو ثلاثة أشهر من الزراعة.

وقطع العيدان وقصل منها الكيزان ثم تجفف وقصل منها البذور.