The effect of ultra-short sprint training on some functional and physical variables and their relationship to the numerical level of fin swimmers

The research aims to identify the effect of ultra-short sprint training on some physiological and physical variables under investigation and their relationship to the numerical level of fin swimmers. The researcher used the experimental approach, and the research sample size was (16) swimmers. The results showed the superiority of ultra-short sprint training (USRPT) over traditional training in physiological variables (vital capacity VC - lactic acid accumulation rate - creatine phosphokinase CPK accumulation rate) and physical variables (leg muscle power - maximum speed - speed endurance) and numerical level for the 100-meter fin distance. Ultra-short sprint training (USRPT) affected the physiological variables (vital capacity VC by 48.03%, blood lactic acid accumulation rate by 19.28%, creatine phosphokinase (CPK) accumulation rate by 9.28% and physical variables (leg muscle power by 19.53%, maximum speed by 7.91%, speed endurance by 7.31%).

تأثير تدريبات تنظيم مسافات السرعة فائقة القصر على بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية وعلاقتها بالمستوى الرقعى لسباحى الزعانف

*د.م.أ / أشرف محمد جمعة نعيم

يهدف البحث الي التعرف على " تأثير تدريبات تنظيم السرعة القصير جداً على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية " قيد البحث " وعلاقتها بالمستوى الرقعى لسباحى الزعانف، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وبلغ حجم عينة البحث (١٦) سباح، واطهرت النتائج أفضلية تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) عن التدريبات التقليدية فى المتغيرات الفسيولوجية (السعة الحيوية VC - معدل تراكم حمض اللاكتيك - معدل تراكم إنزيم كرياتين فسفوكاينيز CPK) والمتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين - السرعة القصوى - تحمل السرعة) والمستوى الرقعى لمسافة ١٠٠ متر زعانف، و أثرت تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) على المتغيرات الفسيولوجية (السعة الحيوية VC بنسبة ٤٨,٠٣٪، معدل تراكم حمض اللاكتيك بالدم بنسبة ١٩,٢٨٪، معدل تراكم إنزيم كرياتين فسفوكاينيز CPK بنسبة ٩,٢٨٪) وعلى المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين بنسبة ١٩,٥٣٪، السرعة القصوى بنسبة ٧,٩١٪، تحمل السرعة بنسبة ٧,٣١٪).

تأثير تدريبات تنظيم مسافات السرعة فائقة القصر على بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية وعلاقتها بالمستوى الرقمي لسباحي الزعانف

*د.م.أ / أشرف محمد جمعة نعيم

مقدمة البحث:

اهتم العلماء والمدرّبون بتدريب التحمل للعديد من السنوات لأن زيادة التحمل الهوائي يساهم بشكل كبير في تحسين أداء السباحة في جميع السباقات بدءاً من مسافة الـ ١٠٠م حتى المسافات الأطول وذلك بالمقارنة بأي تكيفات فسيولوجية أخرى ، كما يلاحظ أن الإهتمام كان أقل كثيراً بتدريب السرعة وتدريب القدرة ، على الرغم من أن التكيفات في هذا النطاق تساهم في تحسين الأداء في جميع السباقات ، ليس فقط في سباقات السرعة ولكن أيضاً في سباقات المسافات المتوسطة وسباقات المسافة حيث أن التحسن في السرعة والقدرة يفيد سباحي السرعة وسباحي المسافات المتوسطة والمسافة فيما يعرف بالسرعة السهلة **Easy Speed** حيث تعطى السباح الفرصة لقيادة السباق بشكل أسرع ومجهود أقل ، كما أنها تزود سباحي المسافات المتوسطة وسباحي المسافات بضرقات النهاية وهي القدرة على الأداء بسرعة أسرع أثناء الجزء الأخير من السباق. (١٢ : ٤٥١)

ويشير أبو العلا عبد الفتاح (٢٠١٦م) أن الأرقام القياسية في السباحة تطورت بشكل كبير بدأ من منتصف القرن الماضي وحتى وقتنا الحالي ، ويرجع السبب في ذلك إلى إرتباط تدريب السباحة بتطبيقات العلوم المختلفة كعلم الفسيولوجيا والميكانيكا الحيوية وغيرها وخلال هذه الفترة الزمنية تطورت البحوث وللدراسات وبناء على نتائجها تغيرت كثير من المعتقدات التي أثبتت هذه البحوث خطأها وتدعو البحوث الحديثة إلى إعادة النظر في كثير من المعتقدات حول تطبيق تدريبات نظم الطاقة في السباحة . (٣ : ٢١١)

ويشير كل من أبو العلا أحمد عبد الفتاح، محمد أحمد عبد الله (٢٠١٣م) أن رياضة السباحة من الرياضات التنافسية والتي ظهر بها مؤخراً تطور هائل في مستويات الإنجاز الرقمي وهذا الإنجاز جاء نتيجة التعرف على أفضل الأساليب التدريبية الحديثة والتي أمكن من خلالها سهولة تشكيل وضبط الأحمال البدنية المستخدمة بما يتناسب مع المرحلة العمرية مما جعلها تؤثر بصورة صحيحة على أجهزة الجسم الداخلية ، لذلك تظهر هذه الأجهزة مجموعة من الإستجابات الفسيولوجية كرد فعل لتطبيق هذه الأحمال البدنية ومن هذه

الإستجابات (نبض القلب ، تراكم حامض اللاكتيك) وهذه الإستجابات مؤشر صادق لمعرفة حالة اللاعب أثناء وضع الأحمال البدنية. (٢ : ٦)

ويشير أبو العلا عبد الفتاح (٢٠١٦) نقلا عن مايبورج (Myburgh) إلى أن طريقة التدريب التقليدية وجهت إليها العديد من الإنتقادات العلمية لإعتمادها على تطبيقات نظم إنتاج الطاقة التي يسهل فهمها ويصعب في الواقع العملي تطبيقها ، ويميل كثير من المدربين في مجال تدريب السباحة إلى تفسير إنجازات سباحينهم ونجاحهم وتحقيق إنجاز رقمي بإستخدام مصطلحات علمية مزيفة pseudo-scientific حيث ينسبون هذه الإنجازات إلى المواصفات الفسيولوجية ، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن هناك قصور في التركيز على الجوانب الفسيولوجية في إعداد السباحين فقد كشف عن أن كثير من الحقائق الفسيولوجية لم يكن لها أهمية في الواقع التطبيقي، وأن تطبيقات فسيولوجيا للتدريب واجهت الكثير من الإنتقادات العلمية خاصة عند تطبيقها في السباحة، أن ما يحدده المدرب من شدات لحمل التدريب في برنامجه التدريبي غالباً ما لا يطبقها وينفذها السباح. (٣ : ١٥٠-١٥١)

ومن خلال القراءات والدراسات النظرية والمجال التطبيقي نلاحظ أن حوالي ٨٠٪ من مسابقات سباحة الزعانف تستغرق أقل من دقيقتان ، ولهذا تعتبر عمليات التمثيل اللاهوائي أساسية في سباقات سباحة الزعانف وهي التي تسيطر على سباقات الـ (٥٠ م ، ١٠٠ م) سباحة الزعانف، وتستمر لتصبح ذات أهمية في سباق الـ ٢٠٠ م، لذلك كلما قصرت سباقات سباحة الزعانف كلما زادت متطلبات نظام التمثيل اللاهوائي للطاقة وهذا ينطبق بشكل خاص على سباقات (٥٠ م ، ١٠٠ م ، ٢٠٠ م) والتي تستمر من حوالي (٢٠ — ١٢٠ ث) ، وتتطلب السباقات الأطول مثل سباق ٨٠٠ م سباحة زعانف إلى الأطول مساهمة أكبر من نظام الطاقة الهوائي، والأدلة على ذلك تأتي من تركيز لاكتات الدم بعد سباقات (١٠٠ م ، ٢٠٠ م) في منافسات سباحة الزعانف والتي تكون عالية جدا لتصل إلى ١٦ — ٢٠ مللي مول/ لتر مما يشير إلى قدر كبير من الطاقة مستمدة من التكسير اللاهوائي للجليكوجين مما ينتج عنه تراكم حمض اللاكتيك . فزيادة التدريب اللاهوائي تظهر بشكل ضروري وهام لتعزيز التدريب التخصصي وأداء السباحين في السباقات القصيرة . (١٣ : ٢١)

ويرى روبيرجس (٢٠٠٦) Robergs, RA أن أحجام للياردات الكبيرة والتدريبات الأرضية التي لا ترتبط بأداء سباحي المستويات العليا تؤثر على مستوى الأداء سلباً وتختلف الألياف العضلية والطاقة المستخدمة تبعاً لإختلاف مسابقات السرعة . كما تختلف بشكل كبير تأثيرات للتدريب تبعاً لأداء مجموعة للتدريب الفعلية، وأن تنمية الساعات الفسيولوجية لها

حدودها في الوصول إلى التكيف ولا تحدث بعد تحقيق هذا التكيف أى فوائد مستقبلية وأن سعة العمل اللاهوائى وعوامله ومؤشراته لا ترتبط بالأداء فى السباحة. (١٥ : ٢١٥)

ويشير ماجلش (Maglisco, E.w ٢٠٠٣) ، أن بعض الإختبارات الفسيولوجية التى أجريت على السباحين فى فترة التجهيز القمى للمنافسة **Taper** ترتبط بشكل ضعيف بالأداء التنافسى . (١٣ : ١٩٩)

مشكلة البحث:

يعتبر تقنين حمل التدريب الصعوبة الرئيسية التى تواجه كل مدرب بمعنى أن يضع المدرب حمل التدريب الذى يتناسب مع كل سباح وقد يكون حمل التدريب المرغوب تنفيذه كثيراً جداً بناءً على الفروق الفردية بين السباحين. (٢ : ٢١٦)

وحتى وقتنا الحالى مازال يستخدم فى العديد من الدول التدريب التقليدى Traditional Training للسباحة حيث تشمل جميع برامج التدريب مسافات تكرارية تزيد عن ٢٠٠متر وتهدف إلى تنمية السعات الفسيولوجية مثل تدريبات تقليل التنفس Hypoxic Training ومجموعات تدريب تحمل اللاكتيك Tolerance Sets Lactate مع التركيز على تكملة كل فقرة من برنامج التدريب بما فى ذلك والتمرينات الأرضية وأدوات السباحة وغيرها من أى أنشطة لا تتصل بشكل مباشر بخصائص مسافة السباق ، وتتنوع شدة التدريب فى البرنامج التدريبي ما بين إختلاف عدد التكرارات وتراكم التحميل الذى يتطلب فترة من الإعداد والتجهيز القمى Taper قبل البطولة الهامة تستغرق حوالى أسبوعين ومن الصعب تحقيق أفضل مستويات السباح بدون فترة التجهيز القمى للبطولة Taper ، وتقوم أسس التدريب التقليدى على ما توصل إليه علم التدريب من تطبيقات نظم إنتاج الطاقة الهوائية واللاهوائية . (٣ : ١٤٩ ، ١٥٠)

إن تدريب نظم إنتاج الطاقة وحدها (مجموعات التدريب الهوائية وتحمل اللاكتيك وتريبات مجموعات القدرة Power) لا يرتبط بمتطلبات السباق لأن الجهاز العصبى العضلى (Neuromuscular) هو الذى يتحكم فى عمل الألياف العضلية خلال السباق ذاته بالإعتماد على الأنماط الخاصة بالسباق داخل المخ والتى تحتاج أن يمزج التدريب ما بين طاقة وتكنيك الأداء لسباق معين وهذا لن يتحقق بالتدريب الهوائى منفصلاً واللاكتيك والقدرة كل منفصل فى مجموعات تدريبية منفصلة ويخضع لسيطرة مناطق أخرى بالمخ لا تعتمد على أنماط عصبية عضلية خاصة بالسباق خلافاً لإندماج كل من هذه المتطلبات معاً فى مزيج خاص بالسباق نفسه وسرعته وتكنيك الأداء .

لذلك فإن تدريب تنظيم سرعة السباق فائقة القصر صممت لأداء أحجام كافية من شدة الأداء فى السباق والتي سوف تزيد من تحفيز كل من النظام الهوائى وعملية تحويل الألياف اللاهوائية إلى الأكسدة وقد تصل طرق التدريب الأخرى إلى نفس النتيجة لكن عادة لا يحدث ذلك لأن مخازن الجليكوجين تكون قد نفذت وينتج عن ذلك عدم تعلم تكتيك تنظيم السرعة وتتضائل وظيفة النظام الهوائى مع إستمرار زيادة التعب ولا يستشفى الجليكوجين المستهلك بصورة سريعة وقد يتطلب ذلك عدة ساعات تصل إلى حوالى ٤٨ ساعة ، بينما تبدأ الجرعة التدريبية التالية قبل الإستشفاء الكامل للجليكوجين ، لذلك فإن جرعة التدريب التى تنفذ بعد ٤٨ ساعة يكون مخزون الجليكوجين قد تم استشفائه وهنا تكمن ميزة طريقة التدريب (USRPT) لأنها لا تستهلك الجليكوجين لذلك يمكن تنفيذها مرتين فى اليوم . وقد يكون من الصعب إدراك أن (USRPT) تعتبر طريقة تدريب لزيادة توفير أحجام تدريب أكبر بسرعة السباق لذلك تؤدى إلى مستويات تكيف أكسدة أسرع وأعلى لدى السباحين وهى الطريقة التى تحقق أكثر متطلبات السباق ولا يحقق التدريب الهوائى وحده تنمية هذه الوظيفية ولا ينمى وحده الحالة البدنية المثلى للمنافسة . (٣ : ٢١٥)

ولهذا فقد رأى الباحث عدم التوازن بين عملية تحميل السباحين بأحمال متنوعة ومختلفة فى أهدافها وبين عمليات الإستشفاء باستخدام الأساليب المتعددة مثل الراحة الإيجابية والراحة السلبيه والوسائل النفسية وغيرها وهذا الامر الذى يسبب ظاهرة الحمل الزائد للسباحين ووصول اللاعب الى إستهلال كمية كبيرة من الجليكوجين المخزون فى العضلة والتي بدورها تحتاج الى المزيد من الوقت لإستعادة الشفاء .

لذا فكان من الضرورى إستخدام طرق جديدة تتناسب مع قدرات السباحين ومراعاة الفروق الفردية بينهم وتجنب حمل التدريب العالى أو المنخفض بالنسبة لسباحى الزعانف. ومن هنا رأى الباحث أنه من الأهمية التعرف على مدى فاعلية تدريبات تنظيم السرعة القصير جداً على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية " قيد البحث" وعلاقتها بالمستوى الرقمى لسباحى الزعانف.

هدف البحث

يهدف البحث الى التعرف على " تأثير تدريبات تنظيم السرعة القصير جداً على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية " قيد البحث" وعلاقتها بالمستوى الرقمى لسباحى الزعانف.

فروض البحث

١. توجد فروق دالة إحصائية في المتغيرات الفسيولوجية " قيد البحث " بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعتين (التجريبية- الضابطة) لصالح القياس البعدي .
٢. توجد فروق دالة إحصائية في المتغيرات البدنية " قيد البحث " بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) لصالح القياس البعدي .
٣. توجد فروق دالة إحصائية في المستوى الرقمي لسباحي الزعانف (١٠٠م) بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) لصالح القياس البعدي .
٤. توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين المتغيرات الفسيولوجية والبدنية " قيد البحث " والمستوى الرقمي لسباحي الزعانف (١٠٠م) في القياسات البعيدة لعينة البحث الكلية .

المصطلحات المستخدمة في البحث

تدريبات تنظيم السرعة القصيرة جدا : (USRPT) Ultra Short Race Pace Training

هي قدرة السباح على أداء مجموعة تدريبية تتميز بالمسافات التكرارية القصيرة والراحات البينية الصغيرة جدا بسرعة قصوى تعادل سرعة السباق الشخصي للسباح ويقسم الزمن على مسافة التكرار (تعريف إجرائي)(٣: ١٥٠)

الدراسات المرجعية:

جدول (١)

الدراسات العربية

م	اسم الباحث	عنوان الرسالة	هدف الدراسة	المنهج	العينة	أهم النتائج
١	أحمد محمد أحمد حسن المغربي ٢٠٠٩م	" بعض الاستجابات البيوكيميائية والوظيفية المصاحبة للموسم التدريبي وعلاقتها بالمستوى الرقمي لسباحي المسافات القصيرة "	-التعرف على العلاقة بين الاستجابات الخاصة بالمتغيرات البيوكيميائية والوظيفية قيد البحث، والمستوى الرقمي لسباحي المسافات القصيرة ١٠٠م زعانف	المنهج التجريبي	(٢٠) سباح من سباحي ستاد المنصوره	هناك علاقة دالة إحصائية للإستجابات الخاصة بالمتغيرات البيوكيميائية والوظيفية لسباحي المسافات القصيرة ١٠٠م زعانف ، بالإضافة إلى ارتفاع في بعض الإنزيمات "CPK,LDH,SGPT,SGOT"

م	اسم الباحث	عنوان الرسالة	هدف الدراسة	المنهج	العينة	أهم النتائج
٢	أبو العلا أحمد عبد الفتاح ومحمد أحمد عبد الله جاد ٢٠١٣م	" تأثير تدريبات تنظيم سرعة السباق بالمسافات أقل من القصيرة على مستوى الأداء في السباحة "	- التعرف على تأثير تدريبات سرعة السباق أقل من القصيرة على (USRPT) مستوى الأداء في السباحة كما يعبر عنة المستوى الرقمي لمسافة السباق	المنهج التجريبي	(٥٢) سباح وسباحة من سباحي نادي الجزيرة الرياضي تتراوح أعمارهم من ١١ إلى ١٤ سنة	تحسن مستوى الأداء في السباحة نتيجة لاستخدام تدريبات سرعة السباق بالمسافات أقل من القصيرة (USRPT) كما يقاس بزمن أداء مسافة السباق أفضل من تدريبات السباحة التقليدية لدى السباحين والمسافات بالرغم من قلة حجم أعمال التدريب مقارنة بتدريبات السباحة التقليدية , ولا يؤدي استخدام تدريبات سرعة السباق بالمسافات أقل من القصيرة (USRPT) إلى زيادة شعور السباح بالتعب مقارنة بتدريبات السباحة التقليدية لدى السباحين والمسافات
٣	محمود محمد سيد محمد دياب ٢٠١٧م	"تأثير التدريب بفترات الراحة والمسافات فائقة القصير بسرعة السباق و التدريب التقليدي على بعض متغيرات الأداء والمستوى الرقمي لسباحي الزحف على البطن "	التعرف على تأثير تصميم برنامج تدريبي وفقاً للمحددات الفنية لطريقة برنت روشال (USRPT) والطريقة التقليدية وفقاً لمحددات ماجليشيو على متغير الأداء الكينماتيكي (معدل طول الضربة - معدل تكرار الضربة - معدل كفاءة الضربة) لسباحة ١٠٠م زحف على البطن والمستوى الرقمي لسباحة الزحف على البطن لمسافة (٥٠م , ١٠٠م , ٤٠٠م)	المنهج التجريبي	(١٦) سباح من سباحي نادي المقاولون العرب (١٢) سنة	تفوق سباحي المجموعة التجريبية على سباحي المجموعة الضابطة في متغير الأداء الكينماتيكي (معدل طول الضربة - معدل تكرار الضربة - معدل كفاءة الضربة) حيث إتمام مسافة السباق بمعدل ضربات اكبر وكفاءة ضربة أعلى , وكذلك تفوق سباحي المجموعة التجريبية على سباحي المجموعة الضابطة في تحقيق زمن اقل لنهاية السباق لمسافة (٥٠م , ١٠٠م) سباحة زحف على البطن , بينما تفوقت المجموعة الضابطة في تحقيق زمن اقل لنهاية السباق لمسافة ٤٠٠م سباحة زحف على البطن

<p>تحسن قيم (٥٠ م , ١٠٠ م , ٤٠٠ م , ٨٠٠ م) زحف على البطن للمسافات المختلفة للسرعة والمسافة (هوائي ولاهوائي) , وقياسات السعة الحيوية للرتين كمؤشر لمدى التكيف للبرنامج التدريبي خلال الموسم .</p>	<p>(١٤) سباح من سباحي نادي البنك الأهلي الذكور(١٠) سنوات</p>	<p>المنهج التجريبي</p>	<p>التعرف على إمكانية توفير قاعدة بيانات لقيم المتوسطات الحسابية للسباحات (٥٠ م , ١٠٠ م) زحف على البطن للعمل اللاهوائي وسباحة (٤٠٠ م و ٨٠٠ م) زحف على البطن للعمل الهوائي لسباحي ما قبل البطولة ودلالة الفروق للقياس القبلي والبعدي لأثر التدريب بفترات الراحة والمسافات فائقة القصر (USRPT)</p>	<p>" تدريب المسافات فائقة القصر بسرعة السباق و تأثيرها على السعة الحيوية و المستوى الرقمي لسباحي ما قبل البطولة"</p>	<p>٤ محمد سيد صدقي عبد الله ٢٠١٩م</p>
<p>تحسن القدرات للقياس البعدي لجميع المتغيرات نتيجة استخدام السرعة القصوى مرتفعة الشدة خلال البرنامج التدريبي</p>	<p>(١٥) سباح من سباحي النادي الأهلي (١٢) سنة</p>	<p>المنهج التجريبي</p>	<p>التعرف على دلالة الفروق للسرعة القصوى مرتفعة الشدة وبعض المتغيرات البدنية لناشئ سباحة الزعانف والمستوى الرقمي لسباحة (٥٠ م , ١٠٠ م) سباحة زحف على البطن للسباحين الناشئين ومدى تأثير تدريبات السرعة القصوى على أداء السباحين</p>	<p>"تأثير تدريبات السرعة القصوى مرتفعة الشدة على بعض المتغيرات البدنية والمستوى الرقمي لناشئ سباحة الزعانف"</p>	<p>٥ إسلام عبد البديع قاسم خطاب ٢٠١٩م</p>
<p>أفضلية تدريبات تنظيم السرعة بالسافات شديدة القصر (USRPT) عن التدريبات التقليدية في المتغيرات الوظيفية (السعة الحيوية VC - معدل تراكم حمض اللاكتيك - معدل تراكم إنزيم كرياتين فسفوكاينيز CPK) والتمغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين - السرعة القصوى - تحمل السرعة)</p>	<p>١٤ سباح من نادي جزيرة الورد بالمنصورة (١٧ سنة)</p>	<p>المنهج التجريبي</p>	<p>التعرف على بعض المتغيرات الوظيفية (معدل نبض القلب - السعة الحيوية - معدل تراكم حامض اللاكتيك - معدل إنزيم كرياتين فسفو كاينيز CPK) والتعرف على بعض المتغيرات البدنية (القدرة</p>	<p>تأثير تدريبات تنظيم السرعة والمسافات شديدة القصر على بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية</p>	<p>٦ منى عادل عبد الفتاح عابدين ٢٠٢٠م</p>

والمستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف.			والمستوى الرقمي لسباحي ١٠٠ متر زعانف	العضلية للرجلين - مرونة مفصل الكتف - مرونة مفصل القدم - السرعة القصوى - تحمل السرعة) والتعرف على المستوى الرقمي لسباحي ١٠٠م زعانف
--	--	--	--	--

جدول (١)

الدراسات الأجنبية

م	اسم الباحث	عنوان الرسالة	هدف الدراسة	المنهج	العينة	أهم النتائج
١	سبيرلش وهيجيل وآخرون Sperlich, B. Haegel, et all م٢٠٠٩	" شدة التدريب أكثر فاعلية وأفضل من زيادة حجم التدريب للرياضيين الصغار "	المقارنة بين التدريب ذو الشدة العالية والتدريب ذو الحجم الأكبر بالنسبة للرياضيين الصغار	المنهج التجريبي	(٢٧) ساح من سن ٩-١٢ سنة ومن سن ١٤ - ١٩ سنة	التدريب ذو الحجم الأكبر ليس ضروريا مقارنة بالتدريب ذو الشدة الأعلى للسباحين الصغار من سن ٩-١٤ سنة حيث أن التدريب ذو الشدة الأعلى يحقق نفس النتائج مع توفير الوقت.
٢	فاسيلوس وآخرون Vassilioet et all م٢٠١٠	" السرعة الحرجة مع وبدون استعمال الزعانف مع الناشئين "	تحديد السرعة الحرجة بين السباحين الذكور و الإناث عن طريق استعمال الزعانف	المنهج التجريبي	(١٠ سباحين)	لعدد وجاءت النتائج عقب تطبيق المسافات (٢٥-٥٠-١٠٠-٢٠٠ متر) مع أقصى شدة وكانت الاختبارات تنفذ في نفس الظروف تم حساب السرعة الحرجة وأظهرت النتائج أن حساب السرعة الحرجة يتأثر بالأداء الفني للسباحة والسرعة الحرجة تكون اكبر عند استخدام الزعانف مع الجنسين
٣	دانيال مارينو واخرون Danial A. Marinho et all م٢٠١٢	"السرعة الحرجة اللاهوائية وأداء السباحة للسباحين الناشئين	تحليل العلاقة بين السرعة الحرجة اللاهوائية والأداء في المسافات القصيرة للسباحات الأربع للسباحين الناشئين، وتحديد	المنهج التجريبي	(٢٠ سباح) (١٢) ذكور (٨) إناث تتراوح أعمارهم بين ١٠ : ١٢ سنة	وجود علاقة ارتباط قوى بين السرعة الحرجة اللاهوائية وأداء السباحة لسباحة الزحف على البطن لمسافة ٥٠م, ١٠٠م, ٢٠٠م لكلا الجنسين

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون السرعة الحرجة اللاهوائية تقنية مهمة حيث توفر ردود فعل مفيدة على السباحين خاصة لمسافة ٢٠٠م.			السرعة الحرجة اللاهوائية من خلال علاقة المسافة بالزمن ومقارنتها بأفضل أرقام لديهم في سباقات ٥٠ م, ١٠٠ م, ٢٠٠ م		
وجود تحسن وعلاقة ارتباطية بين زمن البداية ومدى التحسن فيه حيث كان متوسط زمن ٥٠ متر سباحة زعانف هو ٣٣,٣٣ ث ثم تحسن الى ٣٠,٧٧ ث في نهاية الموسم، وكان هناك علاقة ارتباطية إيجابية في تحسن الزمن بلغت ٠,٨٩ وهو رقم عالي وهذا يرجع الى التدريب بهذه الطريقة التي تعتبر مناسبة وقياسية لتدريب سباحي السرعة.	(٩) سباحين	المنهج التجريبي	التعرف على فاعلية التدريب بتنظيم السرعة والمسافات شديدة القصر USRPT على سباحات ١١-١٢ سنة وهذه الطريقة تعتمد على انتاج اللاكتيك	"فاعلية التدريب بتنظيم السرعة والمسافات شديدة القصر USRPT على سباحات ١١-١٢ سنة"	بيتر راتيغان Peter Rattigan ٢٠١٥ م

إجراءات البحث

منهج البحث

استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي للمجموعتين (التجريبية- الضابطة) وإجراء القياسات (القبلية- البعدية).

مجتمع وعينة البحث : بلغ حجم مجتمع البحث عدد (٢٦) سباح من سباحي نادي الحوار الرياضي والمسجلين بالإتحاد المصري للسباحة للمراحل السنوية (١٥-١٦) سنة

شروط إختيار العينة:

➤ أن يكون السباح مسجل في الاتحاد المصري للسباحة للموسم التدريبي ٢٠٢٠م/ ٢٠٢١ م .

➤ إجتياز الكشف الطبي وأن يكون كل سباح لائق صحياً وبدنياً.

➤ يتم تدريب العينة داخل حمام نادي الحوار تحت نفس الظروف وتحت إشراف

الباحث على كل من المجموعتين (التجريبية - الضابطة) ويراعى أن يتم

التركيز على تدريبات (USRPT) للمجموعة التجريبية .

- موافقة أفراد العينة على المشاركة في إجراء القياسات المتنوعة للبحث بما فيها سحب عينات الدم لتحليلها.
- الإنتظام في التدريب خلال مراحل الموسم التدريبي الصيفي (٢٠٢٠م - ٢٠٢١م) واستبعاد السباحين الغير منتظمين في التدريب
- ألا يقل العمر التدريبي للسباحين عن (٥) سنوات

حجم العينة:

بناءً على الشروط السابقة بلغ حجم عينة البحث (١٦) سباح تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة بواقع (٨) سباحين لكل مجموعة للمراحل السنوية (١٥-١٦) سنة وتم إستبعاد عدد (٢) سباحين لم تنطبق عليهم الشروط وتم أخذ (٨) سباحين للدراسة الإستطلاعية .

اعتدالية توزيع البيانات لعينة البحث:

جدول (٣)

المتوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري ومعامل الالتواء لعينة البحث في القياسات الأساسية (السن، الوزن، الطول، العمر التدريبي)

ن = ١٦

م	المتغير	وحدة القياس	المتوسط	الوسيط	الإنتواء	الإلتواء
١.	السن	سنة	١٥,٢٠	١٥,٠٠	٠,٤١٠	١,٣١٨
٢.	الوزن	كجم	٥٨,٥٠٠	٥٨,٥٠٠	٤,٤٠٩	٠,٠٦٧
٣.	الطول	سم	١٧٠,٨٣٣	١٧١,٥٠٠	٤,١٦٢	٠,١٧٧
٤.	العمر التدريبي	سنة	٧,٠٨٩	٧,٠٠٠	٠,٦٥٢	٠,١٧٣-

ينتضح من جدول (٣) أن قيم معامل الإلتواء قد تراوحت بين (-٠,١٧٣ ، ١,٣١٨) وهي تنحصر بين (+٣) مما يدل على إعتدالية البيانات لأفراد العينة.

تكافؤ مجموعتي البحث:

جدول (٤)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجموعتين (التجريبية - الضابطة)
في القياسات الأساسية (السن، الوزن، الطول، العمر التدريبي)

$$n_1 = n_2 = 8$$

المتغيرات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة	
		متوسط	انحراف	متوسط	انحراف
السن	سنة	١٥,٢٥٧٠	٠,٤٠٨	١٥,١١٤٠	٠,٤١٤٠
الوزن	كجم	٦٠,٧١٤٠	٤,٨٨٩	٥٧,٥٧١	٣,٥٩٩٠
الطول	سم	١٧١,٤٢٩٠	٣,٣٠٩	١٧٠,٥٧١٠	٤,٧٩١
العمر التدريبي	سنة	٧,٠٨٦٠	٠,٦٢٠	٦,٨٥٧٠	٠,٦٩٠

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,١٧٩

يتضح من جدول (٤) وجود فروق غير داله إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات (السن، الوزن، الطول، العمر التدريبي) حيث كانت قيمة ت المحسوبه أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تلك المتغيرات.

جدول (٥)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) في المتغيرات الفسيولوجية

$$n_1 = n_2 = 8$$

المتغيرات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة	
		متوسط	انحراف	متوسط	انحراف
النبض في الراحة	ن/ق	٧٦,٨٥٧٠	٧,٢٩٠	٧٦,٧١٤	٢,٣٦٠
النبض بعد ١٠٠ متر بأقصى سرعة	ن/ق	١٩٨,٢٨٦	٤,٥٣٦	١٩٨,٥٧١	٣,٤٠٩
السعة الحيوية VC	لتر	٣,٤٤٧٠	٠,٣٨٤٠	٣,٤٧٠	٠,٣١٨٠
معدل تراكم حمض اللاكتك بالدم	ملي جرام/ديسيلتر	٧٠,٧٠٠	٨,١٧٢٠	٦٧,٦٠٠	٥,٠٢٩٠
معدل تركيز إنزيم كرياتين فسفو كائينز CpK	وحدة/لتر	٢٣٢,٥٧١	١٥,٢٩٦	٢٣٣,٢٨٦	١٧,٨٤٩

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,١٧٩

يتضح من جدول (٥) وجود فروق غير داله إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الفسيولوجية (قيد البحث) حيث كانت قيمة ت المحسوبه أقل من قيمتها الجدولية

عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تلك المتغيرات.

جدول (٦)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجموعتين (التجريبية - الضابطة)

في المتغيرات البدنية والمستوى الرقمي

ن = ٢ = ٨

قيمة "ت"	المجموعة الضابطة		المجموعة التجريبية		وحدة القياس	المتغيرات	
	متوسط	انحراف	متوسط	انحراف			
٠,٢٥٣-	١,٦٧٦٠	٣٧,١٤٣	٥,٧٤٠٠	٣٦,٥٧١	سم	القدرة العضلية للرجلين	الإختبارات البدنية (خارج الماء)
٠,٤٦٣	٥,١١٣٠	٤٤,٨٥٧	٢,٥٤٥٠	٤٥,٨٥٧	سم	مرون مفصل الكتف (أفقية)	
٠,٠٧١	٤,٥٠٤٠	٧٦,٤٢٩	٩,٦٥٦٠	٧٦,٧١٤	زاوية	مرونة مفصل القدم (قبض)	
٠,١٠٣	٢,١٣٨	١٤٤,٧١٤	١٠,٧٤٦	١٤٥,١٤٣	زاوية	مرونة مفصل القدم (بسط)	
٠,٦٠٤-	٠,١٥٣٠	١٢,٧٤٠	٠,٤٧٠٠	١٢,٦٢٧	ث	السرعة القصوى (٢×٢م)	الإختبارات البدنية (داخل الماء)
٠,٠١٧-	٠,٩٤٢٠	٣٤,٢٨٠	١,٤٨٢٠	٣٤,٢٦٩	ث	تحمل السرعة (٦×٥٠م)	
٠,١٠٠	١,٣٣٨	٥٨,١٣٤	١,٧٣٨٠	٥٨,٢١٧	ث	المستوى الرقمي ١٠٠ متر	

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,١٧٩

يتضح من جدول (٦) وجود فروق غير داله إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات البدنية (قيد البحث) والمستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف، حيث كانت قيمة ت المحسوبه أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تلك المتغيرات.

مجالات البحث

➤ المجال البشري : (السباحين الناشئين بنادى الحوار بالمنصورة مرحلة ١٥-١٦ سنة)

(سنة)

➤ المجال الزمنى : (٢٠٢١م) تم إجراء هذه الدراسة فى الفترة من ٢٠٢١/٣/٣١م إلى

٢٠٢١/٨/٢٩م

➤ المجال المكاني : (حمام السباحة بنادى الحوار الرياضى)

أدوات جمع البيانات:

القياسات والإختبارات:

جدول (٧) القياسات الأساسية

وحده القياس	القياسات الأساسية	
بالسنتمتر	الطول الكلى	١
بالكجم	الوزن	٢

القياسات الفسيولوجية:

قام الباحث بإجراء القياسات للمتغيرات الفسيولوجية قيد البحث والتي اشتملت على:

جدول (٨) القياسات الفسيولوجية

م	المتغيرات الفسيولوجية	الهدف	إسم الجهاز/ طريقة الأداء
١	قياس معدل نبض القلب للسباحين فى وقت الراحة وقياس معدل نبض القلب بعد المجهود (أداء سباحة ١٠٠متر زعانف بأقصى سرعة)	معرفة النبض فى الدقيقه الواحده أثناء الراحة ولتثناء المجهود بعد سباحة ١٠٠م زعانف	وذلك بالجس المباشر بأصابع اليد على الشريان السباتى (من جانب الرقبة)، وتم القياس بتطبيق المعادلة (١٥ × ٤).
٢	قياس السعة الحيوية للرتنين	قياس كفاءة الجهاز التنفسى من خلال السعة الحيوية VC	جهاز الاسبيروميتر الإلكتروني
٣	قياس معدل تركيز حامض اللاكتيك Lactic Acide ولنزيم كرياتين فسفوكاينز (CPK) عن طريق سحب عينات الدم من السباحين	لمعرفة نسبة تراكم اللاكتيك فى الدم	جهاز Spectra Phtometer (Automatic Biochemistry Analyser) CRPK Spectra

القياسات البدنية والمستوى الرقمي

جدول (٩)

القياسات البدنية (خارج-داخل) الماء والمستوى الرقمي

م	القياسات خارج الماء	الهدف
١	القدرة العضلية للرجلين	قياس القوة الانفجارية للرجلين (الإختبار المعدل للوثب العمودي باستخدام حزام أبلاكوف).
٢	مرونة مفصل الكتفين	قياس مرونة مفصل الكتفين من الوضع العمودي
٣	مرونة مفصل القدمين (بسط)	قياس مرونة مفصلي القدمين من وضع البسط
٤	مرونة مفصل القدمين (القبض)	قياس مرونة مفصلي القدمين من وضع القبض
القياسات البدنية داخل الماء وقياس المستوى الرقمي		
١	إختبار السرعة القصوى (٢×٢٥ متر) بأقصى سرعة / ٣ق راحة	قياس السرعة القصوى
٢	إختبار تحمل السرعة (٦×٥٠ متر) بسرعة السباق / ١ق راحة	قياس تحمل السرعة للسباحين
٣	قياس مسافة ١٠٠ متر زعانف أقصى سرعة	قياس زمن ١٠٠ متر زعانف

الخطوات التمهيدية لإجراء البحث

أخذ الموافقات الإدارية:

قام الباحث بعض الخطوات التمهيدية قبل البدء في تطبيق التدريبات التقليدية وتدريبات (USRPT) وإجراء القياسات القبلية وذلك كالتالي:

- تم التواصل مع المسؤولين عن إدارة نادي الحوار وإدارة النشاط الرياضي بالنادي والمدير الفني للسباحة بالنادي، وتوضيح طبيعة البحث وأهميته لرفع مستوى السباحين، ثم الإجتماع مع المدربين لتعريفهم بخطوات العمل في حدود التعليمات الصادرة لهم من المدير الفني بالتنفيذ مع إشرافه بشكل مباشر مع الباحث في تنفيذ التدريبات المقترحة على السباحين.
- تم الاجتماع بالسباحين وأولياء الأمور لتوضيح أهمية الإلتزام بالتدريب وفق المحتوى وبنفس الإتجاهات لتحقيق الهدف من إجراء البحث وإنعكاس التدريب على النتائج الخاصة بمستوياتهم الرقمية.

➤ قام الباحث بتسجيل الفترات الزمنية لبدء تدريب الموسم الصيفي (٢٠٢١م) مع تحديد بدلية ونهاية كل مرحلة تدريبية (مرحلة الإعداد العام والخاص، مرحلة المنافسات)، وذلك حتى يمكن تحديد أنسب التوقيتات الزمنية لإجراء القياسات الفسيولوجية والبدنية (قيد البحث) والمستوى الرقمي بما لا يؤثر على سير العملية التدريبية.

إعداد استمارة تسجيل البيانات الخاصة بالسباحين:

قام الباحث بتصميم استمارتين إحداهما مجمعة للسباحين والأخرى فردية خاصة بكل سباح على حدة لتسجيل البيانات ثم تفريغها ومعالجتها إحصائياً بعد ذلك، وقد اشتملت الاستمارة على البيانات التالية: (إسم السباح، السن، الطول، العمر التدريبي، القياسات الفسيولوجية والبدنية) قيد البحث والمستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف.

الخطوات التنفيذية لإجراء البحث

بناء البرنامج التدريبي المقترح

بعد الإطلاع على المراجع العلمية ومنها أبو العلا عبد الفتاح (٢٠١١) والدراسات المرجعية العربية والأجنبية ومنها دراسة كل من أبو العلا أحمد عبد الفتاح ومحمد أحمد عبد الله جاد (٢٠١٣) ودراسة محمود محمد سيد محمد دياب (٢٠١٧) ودراسة محمد سيد صدقي عبد الله (٢٠١٩) ودراسة منى عادل عبد الفتاح عابدين (٢٠٢٠) وذلك لتحديد مكونات حمل التدريب (حجم - الشدة - فترات الراحة) الخاصة بالبرنامج التدريبي والتعرف على صيغة الأحمال المشار إليها في المراجع .

إجراء الدراسات الاستطلاعية:

قام الباحث بإجراء عدد (٢) دراسة إستطلاعية على عينة عددها (٨) سباحين من خارج عينة البحث وذلك بهدف تقنين الأحمال التدريبية المشار إليها في المراجع والدراسات المرجعية لتطبيقها على عينة البحث الأساسية

الدراسة الإستطلاعية الأولى :-

أجريت هذه الدراسة على عينة استطلاعية قوامها (٨) سباحين من داخل مجتمع البحث وخارج قوام عينة البحث خلال يومي ٢٤-٢٥/٥/٢٠٢١م بنادى الحوار الرياضى، وذلك لتحديد مكونات حمل التدريب (حجم - الشدة - فترات الراحة) الخاصة بالبرنامج

هدف الدراسة الإستطلاعية الأولى :

- تحديد أنسب الطرق للقياس وتسجيل القياسات
- إكتشاف الصعوبات أثناء إجراء القياسات
- تحديد التريب الأمثل لإجراء القياس
- سرعة ضبط الأجهزة المستخدمة فى إجراء القياسات
- تدريب القائمين بالقياسات الفسيولوجية وأيضا التدريب على تسجيل البيانات

نتائج الدراسة الإستطلاعية الأولى :

- تم تحديد الأجهزة والأدوات التى سوف تستخدم فى الدراسة والتأكد من مدى صلاحيتها .
- تم تحديد مكان إجراء التجربة الأساسية (حمام السباحة بنادي الحوار)
- تم إستبعاد السباحين التى لم تنطبق عليهم الشروط قبل البدء فى تطبيق أى إجراءات للبحث .

الدراسة الإستطلاعية الثانية :

أجريت هذه الدراسة على عينة استطلاعية قوامها (٨) سباحين من داخل مجتمع البحث وخارج قوام عينة البحث خلال يومى ١٩-٢٠/٦/٢٠٢١م بنادى الحوار الرياضى

هدف الدراسة الإستطلاعية الثانية :

- تحديد مكونات حمل التدريب الخاصة بالبحث (شدة-حجم-الكثافة)
- تحديد الفتره الزمنية الملائمة لإستمرارية البرنامج
- تحديد الوحدات التدريبية - تحديد زمن الوحده التدريبية
- تحديد المجموعات التدريبية
- تحديد فترات الراحة بين التكرارات والراحة بين المجموعات

نتائج الدراسة الإستطلاعية الثانية :

توضيح طريقة أداء تدرجات السرعة بامسافات شديدة القصر (USRPT)

١. تكوين الفقرات التدريبية وتوضيح متغيرات الحمل لكل سباح، يبدأ السباحين فى أداء هذه الفقرات.

٢. يستمر السباح فى أداء التكرارات حتى الوصول لمرحلة لا يستطيع السباح أداء التكرار بالزمن الصحيح (المستهدف) وهنا يتوقف السباح عن السباحة لعدد ٢ تكرار ثم يكمل الأداء.

٣. فى حالة توقف السباح للمرة الثانية وعدم قدرته على الأداء بالزمن الصحيح (المستهدف) يتوقف لعدد ٢ تكرار، وفى حالة التكرار للمرة الثالثة يتوقف السباح عن الأداء تماماً ويؤدى باقى التدريبات بتدريبات استشفائية بسيطة حتى نهاية التدريب.(٣: ٣١٦)

جدول (١٠)

المعاملات الإحصائية للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) فى المتغيرات البدنية

$$n=2=1$$

ت	المجموعة الضابطة		المجموعة التجريبية		وحدة القياس	المتغيرات	
	متوسط	انحراف	متوسط	انحراف			
٠,٢٥٣-	١,٦٧٦	٣٧,١٤٣	٥,٧٤٠	٣٦,٥٧١٠	سم	القدرة العضلية للرجلين	الإختبارات البدنية (خارج الماء)
٠,٤٦٣	٥,١١٣	٤٤,٨٥٧	٢,٥٤٥	٤٥,٨٥٧٠	سم	مرون مفصل الكتف (أفقية)	
٠,٠٧١	٤,٥٠٤	٧٦,٤٢٩	٩,٦٥٦	٧٦,٧١٤٠	زاوية	مرونة مفصل القدم (قبض)	
٠,١٠٣	٢,١٣٨	١٤٤,٧١٤	١٠,٧٤٦	١٤٥,١٤٣	زاوية	مرونة مفصل القدم (بسط)	
٠,٦٠٤-	٠,١٥٣	١٣,٧٤٠	٠,٤٧٠	١٣,٦٢٧٠	ث	السرعة القصوى (٢٥×٢م)	الإختبارات البدنية (داخل الماء)
٠,٠١٧-	٠,٩٤٢	٣٤,٢٨٠	١,٤٨٢	٣٤,٢٦٩	ث	تحمل السرعة (٥٠×٦م)	

قيمة ت الجدولية عند $0,05 = 2,447$

يتضح من جدول (١٠) وجود فروق داله إحصائياً بين المجموعتين المميزة والأقل تمايز فى المتغيرات البدنية (قيد البحث) والمستوى الرقى حيث كانت قيمة ت المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة $0,05$ مما يدل على صدق الإختبارات البدنية والمستوى الرقى لمسافة ١٠٠ متر زعانف.

إجراء القياسات القبليّة:

تم إجراء القياسات القبليّة للسباحين عينة البحث خلال يومى ٣-٤ / ٧/ ٢٠٢١م، حيث قام الباحث والمساعدين من المدربين بتنفيذ القياسات التالية:

- اليوم الأول:

الطول، الوزن (متغيرات أساسية).

القياسات البدنية خارج الماء (القدرة العضلية- مرونة الكتفين- مرونة القدم).

القياسات البدنية داخل الماء إختبار السرعة القصوى (٢٥×٢ متر) بأقصى سرعة / ٣ق راحة

إختبار تحمل السرعة (٥٠×٦ متر) بسرعة السباق/ ١ق راحة

- اليوم الثاني:

- قام الباحث مع المساعدين بقياس المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف.
- قياس المتغيرات الفسيولوجية (معدل نبض القلب - السعة الحيوية VC - معدل تراكم حامض اللاكتيك - معدل تركيز إنزيم الكرياتين فسفوكاينيز cpk) بعد سباحة ١٠٠ متر زعانف بأقصى سرعة.

تنفيذ التجربة الأساسية:

تم تطبيق التجربة لمدة ٦ أسابيع وذلك في الفترة من ٢٠٢١/٧/٧م إلى ٢٠٢١/٨/١٧م خلال فترة المنافسات للموسم الصيفي ٢٠٢١م بنادي الحوار الرياضي بواقع ٨ وحدات في الأسبوع حيث تم إعطاء المجموعة التجريبية تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) وإعطاء المجموعة الضابطة التدريبات التقليدية.

تطبيق التدريبات التقليدية:

تم تطبيق التدريب التقليدي للمجموعة الضابطة في فترة المنافسات حيث استغرق تطبيق البرنامج ٦ أسابيع ليصل عدد الوحدات التدريبية ٤٨ وحدة بواقع ٨ وحدات أسبوعياً، وقد تراوح الحجم التدريبي الأسبوعي من ٣٢: ٤٢ كيلو متر، وكان الحجم لكل طرق التدريب المستخدمة كالتالي:

- ٨٠٠ - ١٠٠ كيلو متر من تدريب التحمل الأساس.

➤ Basic Endurance Training (En.1)

➤ ٣٣,٦ كيلو متر من تدريب العتبة الفارقة.

➤ Anaerobic Threshold Endurance Training (En.2)

➤ ٢٢,٤ كيلو متر من تدريب الحمل الزائد.

➤ Over Load Endurance Training (En.3)

➤ ٣٣,٦ كيلو متر من تدريب تحمل اللاكتيك.

➤ Lactate Tolerance Training (Sp.1)

➤ ٢٢,٤ كيلو متر من تدريب إنتاج اللاكتيك.

➤ Lactate Production Training (Sp.2)

➤ ١١,٢ كيلو متر من تدريب القدرة.

➤ Power Training (Sp.3)

وبذلك يكون الحجم الإجمالي لهذه المرحلة ٢٢٤ كيلو متر.

➤ تطبيق تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT):
تم تنفيذ تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) لمدة ٦ أسابيع ليصل عدد الوحدات التدريبية ٤٨ وحدة بواقع ٨ وحدات أسبوعياً وقد تراوح الحجم التدريبي الأسبوعي من ٣٥,٧ : ٣٧,٥ كيلو متر.

وكان الحجم لكل مسافة من مسافات التدريب كالتالي:

- ٣,٣ كيلو متر لمسافة ١٢,٥ متر.
- ٢٦,٢ كيلو متر لمسافة ٢٥ متر.
- ٥٩,٤ كيلو متر لمسافة ٥٠ متر.
- ٤٢,٦ كيلو متر لمسافة ٧٥ متر.

وقد قام الباحث بتحديد شدة الأداء كما ذكرها أبو العلا عبد الفتاح وبرنت رشال Brent
Rushall (٢٠١٦م) كالتالي:

١. تحديد الزمن المستهدف لكل سباح في مسافة ١٠٠ متر زعانف بحيث يفوق هذا الزمن أفضل زمن حققه السباح بفارق يتفق المدرب مع السباح عليه.
٢. يتم تحديد زمن قطع المسافات القصيرة كالتالي:
 - في حالة مسافة ٥٠ متر (نص مسافة السباق) وذلك بقسمة الزمن المستهدف على ٢.
 - في حالة مسافة ٢٥ متر (ربع مسافة السباق) وذلك بقسمة الزمن المستهدف على ٤.
٣. يتم تكوين الفقرات التدريبية (متغيرات الحمل) (الحجم، الزمن، الراحة) بناءً على قدرات السباحين والفقرة التدريبية من الخطة العامة. (٧: ٣١٦)

جدول (١١)

يوضح عدد التكرارات المثالية باستخدام المسافات شديدة

القصر (USRPT) لمسافات السباق

مسافات السباق						
١٥٠٠م	٨٠٠م	٤٠٠م	٢٠٠م	١٠٠م	٥٠م	التكرارات
-	-	-	-	-	٦×٤	١٢.٥ متر
-	٥٠	٤٠	٤٠	٣٠	تبعاً للفروق الفردية	٢٥ متر
٥٠	٤٠	٣٠	٣٠	٢٠	-	٥٠ متر
٣٥ - ٣٠	٣٠	٢٤	٢٠	-	-	٧٥ متر
٣٠ - ٢٥	-	-	-	-	-	١٠٠ متر

مستويات الشدة المستخدمة بالمسافات المختلفة في التدريب:

- مسافة ١٢,٥ متر سرعة الخطو ٥٠ متر.
- مسافة ٢٥ متر، ٥٠ متر سرعة الخطو ١٠٠ متر.
- مسافة ٧٥ متر سرعة الخطو ٢٠٠ متر.

وقد تم توحيد التدريبات الأرضية بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) والتي تتناسب مع القدرات الفردية التخصصية للسباحين.

القياسات البعدية:

تم إجراء القياسات البعدية للمجموعة التجريبية في يومي ١٧-١٨/٨/٢٠٢١م بنادي الحوار الرياضي وذلك تحت نفس الظروف ومع تثبيت كل من زمن فترة الإحماء ومحتوياته التي تسبق أداء السباحين لسباحة ١٠٠متر زعانف بأقصى سرعة، وتم قياس باقي المتغيرات الفسيولوجية والبدنية (قيد البحث) وبنفس الترتيب الذي تم في القياسات القبلية ، وتم إجراء القياسات البعدية للمجموعة الضابطة في يومي ٢٧-٢٨/٨/٢٠٢١م بنادي الحوار الرياضي وذلك تحت نفس الظروف ومع تثبيت كل من زمن فترة الإحماء ومحتوياته التي تسبق أداء السباحين لسباحة ١٠٠متر زعانف بأقصى سرعة، وتم قياس باقي المتغيرات الفسيولوجية والبدنية (قيد البحث) وبنفس الترتيب الذي تم في القياسات القبلية ويرجع إختلاف توقيت القياسات البعدية نظراً لان تدريبات (USRPT) لا تحتاج إلي فترة تهدئة وهذا ما تم ذكره في مميزات (USRPT) عن طرق التدريب التقليدية جدول (١/٢) .

المعالجات الإحصائية لبيانات البحث

تحقيقاً لأهداف البحث وفروضه استخدم الباحث الأساليب الإحصائية الآتية:

- المتوسط.
- الوسيط.
- الإنحراف المعياري.
- معامل الالتواء.
- إختبار دلالة الفروق (ت).
- معادلة معدل التغير = (البعدي - القبلي / القبلي) × ١٠٠.
- وقد تم إختبار مستوى الدلالة عند (٠,٠٥) للتأكد من دلالة النتائج الإحصائية.

عرض ومناقشة وتفسير النتائج

في ضوء أهداف البحث والمنهج المستخدم، وفي حدود العينة والقياسات التي تم تطبيقها، سوف يتم عرض وتفسير النتائج في ضوء فروض البحث، ومن خلال عرض النتائج التي توصل إليها الباحث وفي إطار أهداف البحث وفروض ومنهجه واسترشاداً بنتائج الدراسات المرجعية والقراءات النظرية سوف يتم مناقشة النتائج.

عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الأول:

جدول (١٢)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودلالة الفروق بين القياسين (القبلي والبعدي)

للمجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث

ن = ٨

م	الدلالات الإحصائية المتغيرات	وحدة القياس	القياس القبلي		القياس البعدي		قيمة ت	معدل التغير
			متوسط	انحراف	متوسط	انحراف		
١.	النبض في الراحة	نبضه/ق	٧٦,٨٥٧٠	٧,٢٩٠٠	٦٨,٨٥٧٠	٥,٧٥٧٠	٧,٤٨٣	١٠,٤١%
٢.	النبض بعد ١٠٠ متر باقصي سرعة	نبضه/ق	١٩٨,٢٨٦	٤,٥٣٦٠	١٩١,٠٠٠	٤,٣٥٩٠	٣,٥٨٥	٣,٦٧%
٣.	السعة الحيوية VC	لتر	٣,٤٤٧٠	٠,٣٨٤٠	٥,١٠٣٠	٠,٨٦٤٠	٨,٤٧٣	٤٨,٠٣%
٤.	معدل تراكم حمض اللاكتك بالدم	ملي جرام/ ديسيلتر	٧٠,٧٠٠	٨,١٧٢٠	٥٧,٠٦٩٠	٤,٣٨٥٠	٨,٧٤٤	١٩,٢٨%
٥.	معدل تركيز إنزيم كرياتين فوسفو كينيز CpK	وحدة/لتر	٢٣٢,٥٧١	١٥,٢٩٦	٢١١,٠٠٠	١١,٨٠٤	٥,٧٩٦	٩,٢٨%

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,٤٤٧

يتضح من جدول (١٢) وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية (قيد البحث) لصالح القياس البعدي، حيث كانت قيمة ت المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل تحسن مستوى المجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية (قيد البحث).

يتضح من جدول (١٢) وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية (قيد البحث) لصالح القياس البعدي، حيث تراوحت قيم "ت" المحسوبة ما بين (٣,٥٨٥ - ٨,٧٤٤) بينما كانت القيمة الجدولية لإختبار "ت" عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ هي (٢,٤٤٧)، وهذا يدل على تحسن المجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية (قيد البحث)، كما توضح النتائج نسبة التحسن في معدل نبض القلب في الراحة ١٠,٤١%، ومعدل نبض القلب بعد المجهود ٣,٦٧%، السعة الحيوية VC ٤٨,٠٣%، معدل

تراكم حمض اللاكتك بالدم ١٩,٢٨٪، معدل تركيز إنزيم كرياتين فسفوكاينيز CPK ٩,٢٨٪. ويعزى الباحث هذا التحسن في المتغيرات الفسيولوجية (معدل نبض القلب، السعة الحيوية VC، وإنخفاض معدل حامض اللاكتك، وإرتفاع إنزيم كرياتين فسفوكاينيز في الدم) إلى تأثير تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) حيث أن تلك التدريبات تستهدف تطوير الحالة الفسيولوجية للسباح وهذا يتفق مع ما أشار إليه سبيرليتش وآخرون **Sperlich et all** (٢٠٠٩) أن تدريبات (USRPT) تشترط أن تكون فترات الراحة قصيرة جداً لا تزيد عن ٢٠ ثانية بين التكرارات وهذا يساعد على تفعيل الوظيفة الهوائية الإستثنائية من خلال الأكسجين المخزون خلال مجموعات التدريب وخلال الراحة في المجموعات التدريبية مما يساعد على سرعة الإستشفاء وسرعة إستعادة المكونات الفوسفاتية وتحسين الحالة الوظيفية للسباح.

(٢٥:١٦)

ويؤكد ذلك نتائج دراسة محمد سيد صدقي (٢٠١٩م) (٢٠١٩) بأن تمنع الرياضي بمستوى جيد من إستهلاك الأكسجين ومعدل نبض القلب والسعة الحيوية بالإضافة إلى معدلات منخفضة من حامض اللاكتك يؤدي هذا إلى تأخر ظهور التعب وتحسن مستوى أئلئه، فالرياضي الجيد حينما يتمتع بإنخفاض معدل نبض القلب وتركيز حامض اللاكتك أثناء الراحة وغيرها من العوامل التي تتدل على الإرتفاع في قدرته تزداد فرصة إرتفاع مستوى الإنجاز لديه.

جدول (١٣)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودلالة الفروق بين القياسين (القبلي والبعدي)

للمجموعة الضابطة في المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث

ن = ٨

م	الدلالات الإحصائية المتغيرات	وحدة القياس	القياس القبلي		القياس البعدي		قيمة ت	معدل التغير
			متوسط	انحراف	متوسط	انحراف		
١.	النبض في الراحة	نبضه/ق	٧٦,٧١٤٠	٢,٣٦	٧١,١٤٣٠	٥,٣٩٨٠	٢,٦٣٥	٧,٢٦٪
٢.	النبض بعد ١٠٠ متر زعانف بأقصى سرعة	نبضه/ق	١٩٨,٥٧١	٣,٤٠٩٠	١٩٤,٤٢٩	٢,٢٩٩٠	٣,٤٤٢	٢,٠٩٪
٣.	السعة الحيوية VC	لتر	٣,٤٧٠٠	٠,٣١٨٠	٣,٨٨٩٠	٠,٤٩٥٠	٣,٤٠٠	١٢,٠٦٪
٤.	معدل تراكم حمض اللاكتك بالدم	ملي جرام/ديسيلتر	٦٧,٦٠	٥,٠٢٩٠	٦٢,٨٥٧	٥,٠٠٦٠	٣,٥٩٩	٧,٠٢٪
٥.	معدل تركيز إنزيم كرياتين فسفو كاينيز CpK	وحدة/لتر	٢٣٣,٢٨٦	١٧,٨٤٩	٢٢٥,٢٨٦	١٢,٧٦٣	٢,٦٣٢	٣,٤٣٪

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,٤٤٧

يتضح من جدول (١٣) وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات الوظيفية (قيد البحث) لصالح القياس البعدي حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تحسن مستوى المجموعة الضابطة في المتغيرات الفسيولوجية (قيد البحث).

يتضح من جدول (١٣) وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات الفسيولوجية (قيد البحث) لصالح القياس البعدي حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين (٢,٦٣٢ – ٣,٥٩٩) بينما كانت "ت" الجدولية (٢,٤٤٧) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ وهذا يدل على تحسن المجموعة الضابطة في المتغيرات الوظيفية (قيد البحث)، كما توضح النتائج نسبة التحسن في معدل نبض القلب في الراحة (٧,٢٦٪)، ومعدل نبض القلب بعد المجهود (٢,٠٩٪)، والسعة الحيوية VC (١٢,٠٦٪)، ومعدل تراكم حامض اللاكتيك (٧,٠٢٪)، ومعدل تركيز إنزيم كرياتين فسفو كائينز CPK (٣,٤٣٪).

يعزى الباحث هذا التحسن في مستوى المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث للمجموعة الضابطة إلى تأثير التدريب التقليدي الذي إشتغل على تدريبات مرتفعة الشدة خلال فترة المنافسات تضمنت تدريبات الحمل الزائد EN.3، وتدريبات تحمل اللاكتيك SP.1، وتدريبات إنتاج اللاكتيك SP.2، وتدريبات للقدرة SP.3، وهذا يتفق مع نتائج دراسة أحمد المغربي (٢٠٠٩م) (٢٠٠٩) أن السعة الحيوية ومعدل ضربات القلب تمثل أكثر المتغيرات الفسيولوجية إستجابة لبذل المجهود الذي يتم في الوحدات التدريبية ذات الشدة العالية لأن الأحمال البدنية المرتفعة الشدة يرتبط معها زيادة معدل ضربات القلب مع قلة في حجم الدم المدفوع في الضربة، كما أن التدريب التقليدي أظهر تحسن في معدل تركيز حمض اللاكتيك وتركيز إنزيم كرياتين فسفو كائينز CPK

وبذلك يتحقق صحة الفرض الأول جزئياً وللذي ينص على (توجد فروق دالة إحصائياً في المتغيرات الفسيولوجية "قيد البحث" بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعتين (التجريبية- الضابطة) لصالح القياس البعدي).

عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الثاني:

جدول (١٤)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودلالة الفروق بين القياسين (القبلي والبعدي)

للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية قيد البحث

ن = ٨

معدل التغير	قيمة ت	القياس البعدي		القياس القبلي		وحدة القياس	الدلالات الإحصائية	المتغيرات
		متوسط	انحراف	متوسط	انحراف			
٪١٩,٥٣	٥,٨٣٩	٥,٢١٩	٤٣,٧١٤٠	٥,٧٤٠٠	٣٦,٥٧١٠	سم	القدرة العضلية للرجلين	الإختبارات البدنية
٪٨,٧٢	٢,٣٠٩	٤,٤٨٨	٤٩,٨٥٧٠	٢,٥٤٥٠	٤٥,٨٥٧٠	سم	مرونة مفصل الكتف (أفقية)	(خارج الماء)
٪١,٣٠	٠,٨٣٧	٦,٨٩٧	٧٥,٧١٤	٩,٦٥٦٠	٧٦,٧١٤٠	زاوية	مرونة مفصل القدم (قبض)	
٪٥,٤١	٢,١٥٤	٨,٢٦٦	١٥٣,٠٠	١٠,٧٤٦	١٤٥,١٤٣	زاوية	مرونة مفصل القدم (بسط)	
٪٧,٩١	٣,١٤٠	٠,٤٥٥	١١,٥٤٩٠	٠,٤٧٠٠	١٢,٦٢٧٠	ث	السرعة القصوى (٢٥×٢م)	الإختبارات البدنية
٪٧,٣١	٣,٠٨٩	١,٥١٥	٣١,٧٦٣	١,٤٨٢٠	٣٤,٢٦٩٠	ث	تحمل السرعة (٦×٥م)	(داخل الماء)

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,٤٤٧

يتضح من جدول (١٤) وجود فروق غير داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في متغيرات (مرونة مفصل الكتف، مرونة مفصل القدم قبض وبسط) حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥، كما يتضح وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين، السرعة القصوى، تحمل السرعة) لصالح القياس البعدي، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل تحسن مستوى المجموعة التجريبية في بعض المتغيرات البدنية (قيد البحث).

يتضح من جدول (١٤) وجود فروق غير داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في متغيرات (مرونة مفصل الكتف، مرونة مفصل القدم قبض وبسط) حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين (٢,٣٠٩ - ٠,٨٣٧) بينما كانت "ت" الجدولية (٢,٤٤٧) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ وهذا يدل على عدم وجود تحسن معنوي في تلك المتغيرات. ويعزى الباحث ذلك إلى قصر فترة التطبيق (٦ أسابيع) وقلة تدريبات المرونة في هذه الفترة مما أدى إلى عدم وجود تحسن في متغيرات (مرونة مفصل الكتف، مرونة مفصل القدم قبض وبسط).

كما يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في باقى المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين، السرعة القصوى، تحمل السرعة) لصالح القياس البعدي حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين (٢,٦٣٧ - ٥,٨٣٩) بينما كانت "ت" الجدولية (٢,٤٤٧) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥، وهذا يدل على تحسن المجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين وإختبارها) (الإختبار المعدل للوثب العمودي باستخدام حزام ابلاكوف) بنسبة (١٩,٥٣٪)، والسرعة القصوى وإختبارها (٢ × ٢٥ متر / ٣ ق) بنسبة (٧,٩١٪)، وتحمل السرعة وإختبارها (٦ × ٥٠ متر / ١ ق) بنسبة (٧,٣١٪).

ويعزى الباحث هذا التحسن في مستوى (القدرة العضلية للرجلين، السرعة القصوى، تحمل السرعة) للمجموعة التجريبية إلى تأثير تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) حيث أن تلك التدريبات تتميز بالشدة العالية التي تحاكي سرعة السباق وتكرار المسافات بهذه الشدة العالية (الزمن المستهدف) يكون له تأثير إيجابي على تنمية السرعة القصوى وتحمل السرعة والقدرة للسباحين، حيث أن هذه التدريبات تؤدي في نفس المسار الحركي التخصصي (الأداء- السرعة) ويؤكد ذلك نتائج دراسة أبو العلا عبد الفتاح ومحمد جاد (٢٠١٣م) ودراسة محمد سيد صدقي (٢٠١٩م) ودراسة إسلام عبد البديع (٢٠١٩م)

جدول (١٥)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودلالة الفروق بين القياسين (القبلي والبعدي)

للمجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية قيد البحث

ن = ٨

معدل التغير	قيمة ت	القياس البعدي		القياس القبلي		وحدة القياس	الدلالات الإحصائية	المتغيرات
		متوسط	انحراف	متوسط	انحراف			
٧,٣١٪	٢,٦٤٣	١,٢١٥	٣٩,٨٥٧	١,٦٧٦	٣٧,١٤٣	سم	القدرة العضلية للرجلين	الإختبارات البدنية (خارج الماء)
٢,٨٧٪	٠,٥٧٦	٤,٥٩٨	٤٦,١٤٣	٥,١١٣	٤٤,٨٥٧	سم	مرون مفصل الكتف (أفقية)	
١,١٢٪	٠,٧٢٤	٤,٨٢١	٧٧,٢٨٦	٤,٥٠٤	٧٦,٤٢٩	زاوية	مرونة مفصل القدم (قبض)	
١,٦٨٪	١,٠٣٨	٥,٥٨١	١٤٧,١٤٣	٢,١٣٨	١٤٤,٧١٤	زاوية	مرونة مفصل القدم (بسط)	الإختبارات البدنية (داخل الماء)
٤,١٦٪	٢,٤٦٠	٠,٤٥٩	١٢,١٦٩	٠,١٥٣	١٢,٧٤٠	ث	السرعة القصوى (٢ × ٢٥م)	
٣,٧١٪	٢,٥٢٧	٠,٩٦٩	٣٣,٠٠٩	٠,٩٤٢	٣٤,٢٨٠	ث	تحمل السرعة (٦ × ٥٠م)	

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,٤٤٧

يتضح من جدول (١٥) وجود فروق غير داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في متغيرات (مرونة مفصل الكتف، مرونة مفصل القدم قبض وبسط) والمستوى

الرقمى لمسافة ١٠٠ متر زعانف، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥، كما يتضح وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى باقى المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين، السرعة القصوى، تحمل السرعة) لصالح القياس البعدى، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تحسن مستوى المجموعة الضابطة فى تلك المتغيرات.

يتضح من جدول (١٥) وجود فروق غير داله إحصائياً بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى متغيرات (مرونة مفصل الكتف، مرونة مفصل القدم قبض وبسط) حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبه ما بين (٠,٥٧٦ - ١,٠٣٨) بينما كانت "ت" الجدولية (٢,٤٤٧) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ وهذا يدل على عدم وجود تحسن معنوى فى تلك المتغيرات.

ويعزى الباحث ذلك إلى عدم التركيز على تدريبات المرونة الخاصة بالأداء خلال فترة المنافسات مثل ما يتم التركيز عليها فى الفترات الأولى من الموسم التدريبى (الإعداد العام والخاص).

كما يتضح وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين، السرعة القصوى، تحمل السرعة) لصالح القياس البعدى حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبه ما بين (٢,٤٦٠ - ٢,٦٤٣) بينما كانت "ت" الجدولية (٢,٤٤٧) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ وهذا يدل على تحسن المجموعة الضابطة فى بعض المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين وإختبارها (الإختبار المعدل للوثب العمودى باستخدام حزام ابلاكوف) بنسبة (٧,٣١٪)، والسرعة القصوى وإختبارها (٢٥ × ٢ متر / ٣ ق) بنسبة (٤,١٦٪)، وتحمل السرعة وإختبارها (٥٠ × ٦ متر / ١ ق) بنسبة (٣,٧١٪).

ويرى الباحث أن تحسن المجموعة الضابطة فى (القدرة العضلية للرجلين، السرعة القصوى، تحمل السرعة) يرجع إلى تأثير التدريبات التقليدية، حيث أن تلك التدريبات مرتبطة بالعضلات العاملة، فإن تعرض السباحين للتدريب على نفس الأداء الحركى وكذلك تشغيل نفس المجموعات العضلية لفترة تطبيق البرنامج كاملة قد أدى إلى هذا التحسن.

وبذلك يتحقق صحة الفرض الثانى جزئياً وللذى ينص على أنه (توجد فروق دلالة إحصائية فى المتغيرات البدنية "فيد البحث" بين القياسين (القبلى - البعدى) للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) لصالح القياس البعدى).

عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الثالث:

جدول (١٦)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودلالة الفروق بين القياسين (القبلي والبعدي)
للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي

ن = ٨

معدل التغير	قيمة ت	القياس البعدي		القياس القبلي		وحدة القياس	الدلالات الإحصائية المتغيرات	
		انحراف	متوسط	انحراف	متوسط		١٠٠ متر زعانف بأقصى سرعة	المستوى الرقمي
%٢,٢٨	٢,٦٣٧	١,٥١٣	٥٦,٨٢١	١,٧٣٨	٥٨,٢١٧	ث		

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,٤٤٧

يتضح من جدول (١٦) وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف لصالح القياس البعدي، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل تحسن مستوى المجموعة التجريبية في المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف.

يتضح من جدول (١٦) وجود فروق داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف لصالح القياس البعدي حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين (٥,٨٣٩ - ٢,٦٣٧) بينما كانت "ت" الجدولية (٢,٤٤٧) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ وهذا يدل على تحسن المجموعة التجريبية في المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف أقصى سرعة بنسبة (٢,٢٨%).

ويعزى الباحث هذا التحسن في المستوى الرقمي لمسافة (١٠٠م) زعانف للمجموعة التجريبية إلى تأثير تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) حيث أن تلك التدريبات تتميز بالشدة العالية التي تحاكي سرعة السباق وتكرار المسافات بهذه الشدة العالية (الزمن المستهدف) يكون له تأثير إيجابي على تنمية السرعة القصوى وتحمل السرعة والقدرة للسباحين، حيث أن هذه التدريبات تؤدي في نفس المسار الحركي التخصصي (الأداء- السرعة) وبالتالي تحسن المستوى الرقمي للسباحين ويؤكد ذلك نتائج دراسة أبو العلا عبد الفتاح ومحمد جاد (٢٠١٣م) ودراسة محمد سيد صدقي (٢٠١٩م) ودراسة إسلام عبد البديع (٢٠١٩م)

جدول (١٧)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودلالة الفروق بين القياسين (القبلي والبعدي)
للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي

ن = ٨

معدل التغير	قيمة ت	القياس البعدي		القياس القبلي		وحدة القياس	الدلالات الإحصائية المتغيرات
		انحراف	متوسط	انحراف	متوسط		
٪٠.٨٣	١.١٦٧	٠.٦٦١	٥٧.٦٢٩	١.٣٣٨	٥٨.١٣٤	ث	المستوى الرقمي ١٠٠ متر زعانف بأقصى سرعة

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,٤٤٧

يتضح من جدول (١٧) وجود فروق غير داله إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تحسن مستوى المجموعة الضابطة في تلك المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠م زعانف.

يتضح من جدول (١٧) وجود فروق غير دللة إحصائياً بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة (١.١٦٧) بينما كانت "ت" الجدولية (٢,٤٤٧) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥، وهذا يدل على عدم وجود تحسن معنوي في المستوى الرقمي لسباحي المجموعة الضابطة.

ويرى الباحث أن تحسن المجموعة الضابطة في المستوى الرقمي يرجع إلى تأثير التدريبات التقليدية، حيث أن تلك التدريبات مرتبطة بالعضلات العاملة، فإن تعرض السباحين للتدريب على نفس الأداء الحركي وكذلك تشغيل نفس المجموعات العضلية لفترة تطبيق البرنامج كاملة قد أدى إلى هذا التحسن.

وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث جزئياً وللذي ينص على أنه (توجد فروق دللة إحصائياً في المستوي الرقمي بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) لصالح القياس البعدي.

عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الرابع :

جدول (١٨)

المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري ودلالة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين
التجريبية والضابطة في المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث

$$n=2=8$$

م	الدلالات الإحصائية المتغيرات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة	
			متوسط	إنحراف	متوسط	إنحراف
١.	النبض في الراحة	نبضه/ق	٦٨,٨٥٧٠	٥,٧٥٧٠	٧١,١٤٣٠	٥,٣٩٨٠
٢.	النبض بعد مجهود ١٠٠ متر	نبضه/ق	١٩١,٠٠	٤,٣٥٩٠	١٩٤,٤٢٩	٢,٢٩٩٠
٣.	السعة الحيوية VC	لتر	٥,١٠٣٠	٠,٨٦٤٠	٣,٨٨٩٠	٠,٤٩٥٠
٤.	معدل تراكم حمض اللاكتيك	ملي جرام/ ديسيليز	٥٧,٠٦٩٠	٤,٣٨٥٠	٦٢,٨٥٧٠	٥,٠٠٦٠
٥.	معدل تركيز إنزيم الكرياتين فسفوكاينيز Cpk	وحدة/ لتر	٢١١,٠٠	١١,٨٠٤	٢٢٥,٢٨٦	١٢,٧٦٣٠

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,١٧٩

يتضح من جدول (١٨) وجود فروق غير داله إحصائياً في القياسين البعديين بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات (معدل نبض القلب) حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تحسن مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغيرات (معدل نبض القلب) بصورة متقاربة، كما يتضح وجود فروق داله إحصائياً في القياسين البعديين بين المجموعتين التجريبية والضابطة في باقي المتغيرات الفسيولوجية (السعة الحيوية VC، معدل تراكم حمض اللاكتيك، معدل تركيز إنزيم كرياتين فسفوكاينيز CPK) لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تحسن المجموعة التجريبية بمستوى أعلى من المجموعة الضابطة في تلك المتغيرات.

يتضح من جدول (١٨) وجود فروق غير داله إحصائياً في القياسين البعديين بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات (معدل نبض القلب) حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه تتراوح بين (١,٧٦٦ - ١,٨٤١) بينما كانت "ت" الجدولية (٢,١٧٩) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ وهذا يدل على تحسن المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات نبض القلب بصورة متقاربة، وهذه النتائج تتفق مع ما أشار إليه أشار إليه أبو العلا أحمد عبدالفتاح، برنت رشال (٢٠١٦م) أن معدل نبض القلب يعكس مقدار العمل الذي يؤدي به ليقابل المتطلبات المتزايدة للجسم لتثاءم الجهد البدني، حيث ينتج عن توالي عمليات الإنقباض والإنبساط لعضلة القلب في بداية التدريب زيادة في معدل نبض

القلب مباشرة، وترتبط نسبة الزيادة بمستوى شدة التدريب، ويستدل عليها بنسبة استهلاك الأوكسجين، ذلك أن معدل نبض القلب التي تستخدم للتعرف على مدى ملائمة الحمل البدني ومستوى الحالة التدريبية، وتحديد فترات الراحة اللازمة للاستشفاء، وكذلك شدة الحمل، إلى جانب ارتباط هذا النبض بمستويات التدريب الهوائية وبصفة أساسية الحد الأقصى لإستهلاك الأوكسجين والعتبة الفارقة اللاهوائية. (٣: ٢٢٧)

كما يتضح من جدول (١٨) وجود فروق دالة إحصائياً في القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات (السعة الحيوية VC، معدل تراكم حمض اللاكتيك، معدل تركيز إنزيم كرياتين فسفو كاينيز CPK) لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة تتراوح ما بين (٢,٣٠١ - ٣,٢٢٨)، بينما كانت "ت" الجدولية (٢,١٧٩) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥، وهذا يدل على تحسن المجموعة التجريبية في متغيرات (السعة الحيوية VC، معدل تراكم حمض اللاكتيك، معدل تركيز إنزيم كرياتين فسفو كاينيز CPK) بدرجة أعلى من المجموعة الضابطة، فكانت المجموعة التجريبية التي أدت تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) قد حققت معدلات تحسن في تلك المتغيرات أكبر من معدلات التغير في المجموعة الضابطة التي أدت التدريبات التقليدية، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة ذات دلالة معنوية في كل من السعة الحيوية VC (٣,٢٢٨)، معدل تراكم حامض اللاكتيك (٢,٣٠١)، معدل تركيز إنزيم كرياتين فسفو كاينيز CPK (٢,٦٨٤)، بينما كانت "ت" الجدولية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ هي (٢,١٧٩).

ويرى الباحث أن تحسن المجموعة التجريبية في متغيرات (السعة الحيوية VC، معدل تراكم حمض اللاكتيك، معدل تركيز إنزيم كرياتين فسفو كاينيز CPK) عن المجموعة الضابطة إلى أن تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) تشترط فترات عمل قصيرة وفترات راحة قليلة والتي تحافظ على انخفاض مستوى تركيز حامض اللاكتيك وبالتالي تأخر التعب، كما تساعد على سرعة الإستشفاء وتحسن الكفاءة الوظيفية للسباح وهذا يتفق مع نتائج دراسة بيتر راتيغان Peter Rattigan (٢٠١٥م) ونتائج دراسة محمد سيد صدقي (٢٠١٩م)، حيث حدث تحسن في المتغيرات الوظيفية نتيجة تطبيق تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT).

جدول (١٩)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودلالة الفروق بين القياسيين البعديين للمجموعتين
التجريبية والضابطة في المتغيرات البدنية قيد البحث والمستوى الرقمي

$$n=2=8$$

قيمة ت	المجموعة الضابطة		المجموعة التجريبية		وحدة القياس	الدلالات الإحصائية	المتغيرات
	انحراف	متوسط	انحراف	متوسط			
٢,٩٠٤	١,٢١٥٠	٣٩,٨٥٧٠	٥,٢١٩٠	٤٣,٧١٤٠	سم	القدرة العضلية للرجلين	الإختبارات البدنية
٢,٥٢٩	٤,٥٩٨٠	٤٦,١٤٣٠	٤,٤٨٨٠	٤٩,٨٥٧٠	سم	مرونة مفصل الكتف (أفقية)	(خارج الماء)
١,٤٩٤	٤,٨٢١٠	٧٧,٢٨٦٠	٦,٨٩٧٠	٧٥,٧١٤٠	زاوية	مرونة مفصل القدم (قبض)	
١,٥٥٤	٥,٥٨١٠	١٤٧,١٤٣	٨,٢٦٦٠	١٥٣,٠٠	زاوية	مرونة مفصل القدم (بسط)	الإختبارات البدنية (داخل الماء)
٢,٥٤٠	٠,٤٥٩٠	١٢,١٦٩٠	٠,٤٥٥٠	١١,٥٤٠٩	ث	السرعة القصوى (٢×٢٥م)	
٢,٨٣٣	٠,٩٦٩٠	٣٣,٠٠٩٠	١,٥١٥٠	٣١,٧٦٣٠	ث	تحمل السرعة (٦×٥٠م)	المستوى الرقمي
٢,٢٩٤	٠,٦٦١٠	٥٧,٦٢٩٠	١,٥١٣٠	٥٦,٨٢١٠	ث	١٠٠ متر زعانف أقصى سرعة	

قيمة ت الجدولية عند مستوى ٠,٠٥ = ٢,١٧٩

يتضح من جدول (١٩) وجود فروق غير داله إحصائياً في القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات (مرونة مفصل القدم (قبض) - مرونة مفصل القدم (بسط)) حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على أن مستوى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تلك المتغيرات كان بصورة متقاربة، كما يتضح من جدول (١٦) وجود فروق داله إحصائياً في القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في باقي المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين - مرونة مفصل الكتف (أفقية) - السرعة القصوى (٢×٢٥م) - تحمل السرعة (٦×٥٠م)) والمستوى الرقمي لسباحة ١٠٠ متر زعانف، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على تحسن المجموعة التجريبية بمستوى أعلى من المجموعة الضابطة في تلك المتغيرات.

يتضح من جدول (١٩) وجود فروق غير داله إحصائياً في القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات (مرونة مفصل القدم (قبض) - مرونة مفصل القدم (بسط)) حيث كانت قيمة "ت" المحسوبه (١,٤٩٤) لمرونة مفصل القدم قبض، (١,٥٥٤) لمرونة مفصل القدم بسط، بينما كانت قيمة "ت" الجدولية (٢,١٧٩) عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يدل على أن مستوى المجموعتين التجريبية والضابطة متقارب في تلك المتغيرات.

ويعزى الباحث هذه الدلالة إلى قصر فترة التطبيق (٦ أسابيع) وقلة تدريبات المرونة وقلة عدد أفراد عينة البحث.

كما يتضح من جدول (١٩) وجود فروق دالة إحصائية في القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في باقى المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين - مرونة مفصل الكتف (أفقية) - السرعة القصوى (٢٥×٢م) - تحمل السرعة (٥٠×٦م)) والمستوى الرقوى لمسافة ١٠٠ متر زعانف لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية حيث كانت قيم "ت" المحسوبة أعلى من القيمة الجدولية لإختبار "ت" عند مستوى الدلالة ٠,٠٥ مما يؤكد تحسن المجموعة التجريبية فى تلك المتغيرات والمستوى الرقوى لسباحة ١٠٠ متر زعانف بدرجة أعلى من المجموعة الضابطة، فكانت المجموعة التجريبية التى أدت تدريبات تنظيم السرعة للمسافات شديدة القصر (USRPT) قد حققت معدلات تحسن فى المتغيرات (القدرة العضلية للرجلين - مرونة مفصل الكتف (أفقية) - السرعة القصوى (٢٥×٢م) - تحمل السرعة (٥٠×٦م)) والمستوى الرقوى لمسافة ١٠٠ متر زعانف أكبر من معدلات التغير فى المجموعة الضابطة التى أدت التدريبات التقليدية، حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة ذات دلالة معنوية فى كل من القدرة العضلية للرجلين (إختبار الوثب المعدل للوثب العمودى بإستخدام حزام أبلاكوف) (٢,٩٠٤)، السرعة القصوى (إختبار ٢٥×٢ متر/٣ق) (٢,٥٤٠)، تحمل السرعة (إختبار ٥٠×٦ متر/ ١ ق) (٢,٨٣٣)، المستوى الرقوى لسباحة ١٠٠ متر زعانف (٢,٢٩٤)، بينما كانت "ت" الجدولية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ هى (٢,١٧٩).

ويرى الباحث أن تحسن المجموعة التجريبية فى تلك المتغيرات والمستوى الرقوى لمسافة ١٠٠ متر زعانف عن المجموعة الضابطة إلى أن تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) تحاكي سرعة السباق وتركز على تحسن المتطلبات البدنية الخاصة بمسافة السباق من سرعة قصوى وتحمل سرعة وقدرة عضلية والذي أدى بدوره إلى حدوث تكيف بالعضلات وتوفير الطاقة المطلوبة للحركات بشكل آلى وبشكل يحاكي طريقة السباق مما أدى بدوره إلى تحسن المستوى الرقوى لمسافة ١٠٠ متر زعانف، وهذا يتفق مع ما أشار إليه أبو العلا عبد الفتاح وبرنت رشال **Brent Rushall** (٢٠١٦م) بأن هدف تدريبات (USRPT) هو عمل قصير جداً- راحة قصيرة بين التكرارات لتسهيل أداء أكبر حجم من الشدة العالية للأداء (سرعة السباق)، وأن حدوث التكيف البدنى للسباح عند إعدادهم بتدريبات (USRPT) يتم بشكل أفضل وأسرع من إستخدام التدريبات التقليدية فى تدريب السباحين والتي لها مردود سلبى من حدوث (إجهاد زائد - إصابات - توقف مستوى) بعكس طريقة

(USRPT) التي تمثل تدريبات عالية الشدة والتي تؤدي إلى تحسن التكنيك الخاص بالسباق بما يشمله من مهارات السباق (البدء - ضربات الرجلين تحت الماء - الدوران)، وجميع هذه العوامل تختص بمدى تحقيق السرعة المستهدفة وبلوغ أعلى مستوى للإنجاز. (٧: ١٥٥) وهذا ما تؤكدته نتائج دراسة أبو العلا عبد الفتاح ومحمد جاد (٢٠١٣م)، ونتائج دراسة محمد سيد صدقي (٢٠١٩م)، حيث تحسن زمن أداء مسافة السباق للمجموعة التجريبية التي استخدمت تدريبات (USRPT) مقارنة بالمجموعة الضابطة التي استخدمت التدريبات التقليدية، وهذا يتفق أيضاً مع نتائج دراسة بيتر راتيغان PeterRattigan (٢٠١٥م) بوجود تحسن في زمن ٥٠ متر سباحة زعانف الذي أرجعه إلى التدريب بطريقة (USRPT) التي تعتبر مناسبة وقياسية لتدريب سباحي السرعة. وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع جزئياً والذي ينص على أنه (توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين المتغيرات الفسيولوجية والبدنية " قيد البحث " والمستوى الرقمي لسباحي السرعة (١٠٠م زعانف) في القياسات البعدية لعينة البحث الكلية. الإستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات:

في ضوء عرض نتائج البحث ومناقشتها توصل الباحث للاستنتاجات التالية:

١. أفضلية تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) عن التدريبات التقليدية في المتغيرات الفسيولوجية (السعة الحيوية VC - معدل تراكم حمض اللاكتيك - معدل تراكم إنزيم كرياتين فسفوكاينيز CPK) والمتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين - السرعة القصوى - تحمل السرعة) والمستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف.
٢. أثرت تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) على المتغيرات الفسيولوجية (السعة الحيوية VC بنسبة ٤٨,٠٣٪، معدل تراكم حمض اللاكتيك بالدم بنسبة ١٩,٢٨٪، معدل تراكم إنزيم كرياتين فسفوكاينيز CPK بنسبة ٩,٢٨٪) وعلى المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للرجلين بنسبة ١٩,٥٣٪، السرعة القصوى بنسبة ٧,٩١٪، تحمل السرعة بنسبة ٧,٣١٪).
٣. لم تؤثر تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) على مرونة مفصل القدم قبض وبسط.

٤. أثرت تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) المستوى الرقمي لمسافة ١٠٠ متر زعانف أقصى سرعة بنسبة ٢,٢٨٪.

التوصيات:

- فى ضوء النتائج التى أسفرت عنها الدراسة يوصى الباحث بالآتي:
- إجراء بحوث للتعرف على تأثير تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر (USRPT) على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية الأخرى وعلى المتغيرات البيوكيميائية للسباحين.
 - تطبيق مثل هذه الدراسة على سباحى المسافات المتوسطة والطويلة.
 - تطبيق مثل هذه الدراسة على مختلف المراحل السنوية للسباحين وطرق السباحة المختلفة.

المراجع

أولاً: قائمة المراجع العربية

١. أبو العلا أحمد عبد الفتاح، حازم حسين سالم (٢٠١١م): الإتجاهات المعاصرة فى تدريب السباح، دار الفكر العربي، القاهرة.
٢. أبو العلا أحمد عبد الفتاح، محمد أحمد عبدالله (٢٠١٣م): "تأثير تدريبات تنظيم سرعة السباق بالمسافات أقل من القصيرة على مستوى الأداء فى السباحة"، بحث منشور فى المجلة الأوربية لتكنولوجيا علوم الرياضة.
٣. أبو العلا أحمد عبد الفتاح، برنت رشال (٢٠١٦م): طرق تدريب السباحة تنظيم السرعة القصير جداً، مركز الكتاب الحديث، القاهرة.
٤. الاتحاد الدولي للغوص (٢٠٢٤): قواعد وتنظيمات بطولات السباحة بالزعانف
٥. أحمد محمد المغربى (٢٠٠٩م): "بعض الاستجابات البيوكيميائية والوظيفية المصاحبة للموسم التدريبي وعلاقتها بالمستوى الرقمي لسباحى المسافات القصيرة"، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة.
٦. إسلام عبد البديع قاسم خطاب (٢٠١٩م): تأثير تدريبات السرعة القصوى مرتفعة الشدة على بعض المتغيرات البدنية والمستوى الرقمي لناشئ سباحة الزعانف
٧. محمد سيد صدقى عبد الله (٢٠١٩م): "تدريب المسافة فائقة القصر بسرعة السباق وتأثيرها على السعة الحيوية والمستوى الرقمي"، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان
٨. محمد مسعود محمد مسعود (٢٠١٨م): تأثير التدريب بفترات الراحة والمسافات فائقة القصر بسرعة السباق و التدريب التقليدي على بعض متغيرات الأداء والمستوى الرقمي لسباحي الزحف على البطن
٩. محمود محمد سيد محمد دياب (٢٠١٧م): "تأثير التدريب بفترات الراحة والمسافة فائقة القصر بسرعة السباق والتدريب التقليدي على بعض متغيرات الأداء والمستوى الرقمي لسباحي الزحف على البطن"، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان
١٠. منى عادل عبد الفتاح عابدين (٢٠٢٠م): تأثير تدريبات تنظيم السرعة بالمسافات شديدة القصر على بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية والمستوى الرقمي لسباحى ١٠٠ متر زعانف

ثانياً: قائمة المراجع الاجنبية

11. Daniel , A. Marinho (2012):Applying Anaerobic Critical Velocity in Non–Elite Swimmers: International Journal of Swimming Kinetics, Covilhã. Portugal
12. Karamnizrk s(1994): Change in serum creatine kinase lactate deny progenies and aldoses activities following supra maximal exercise in athletes the journal of sport medicine and physic, fit, Vol. (34),No2 June.
13. Maglischo, E.w (2003): Swimming fastest the essential reference on technique, training and program design, human kinetics U.S.A.
14. Peter Rattigan (2015): The effectiveness of Ultra Short pace training on 11/12 registered females (Roscoe Potts) technology & Assessment in health & exercise science July 20
15. Robergs, RA, Roberto, S,O (2006): Fundamental principle of exercise physiology for fitness, performance and health, McGraw– hill publishers, Boston, USA.
16. Sperlich, B., Haegele, M., Achtzehn, S., De Marees, M., & Mester, J. (2009). :High intensity exercise in children: Results from different disciplines. A paper presented at the 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, Oslo, Norway, June 24–27
17. Vassilios Thanopoullosi (2010):Critical Velocity With and Without The Application of Swimming Fins Among Youth Fin Competitors , University of Athens , Greece