A STUDY OF SOME ECONOMIC CHARACTERS OF AN IMPORTED MERINO FLOCK

By

F.M. LABBAN AND A. RADWAN

Animal Production Dept. Ministry of Agriculture, Cairo, U.A.R.

SUMMARY

The Ministry of Agriculture imported on March 1960 a flock of Merino sheep "Fleisch Schafe" from Eastern Germany Some economic sharacters of this flock were studied. These traits were body weight, lambing rate and mortality rate. Grease fleece weight and fibre diameter were also investigated. Results obtained in this work can be summarized as follows:

- 1. The birth weights for the 4 years studied were 3.53, 3.26, 3.00 and 2.93 for single males, twin males and twin females respectively. Body weight at different ages was also reported.
- 2. The mean lambing rate was found to be L29.5. Year of lambing had statistically insignificant effect in this respect.
- 3. The mean lamb mortality rate (from birth to weaning) was 4.32%. The effect of year was statistically highly significant (P= < 0.001).
- 4. The mean grease fleece wieghts were 2.38 \pm 0.03 kg and 5.14 \pm 0.23 kg, for females and males respectively. The differences were statistically highly significant (P=<0.001).
- 5. The mean fibre diameter was found to be ranged between 19.6 and 23.5 microns at different ages over a period of 6 years. Differences between years in fibre diameter were statistically highly significant (P = < 0.01).

دراسة بعض الصفات الاقتصادية لقطيع مستورد منالأغنام الرينو

فتوح محمد اللبان ، عبد العظيم رضوان

الملخص

اجرى هذا البحث على قطيع الأغنام المرينو الذى استوردته وزارة الزراعلة من المانيا الشرقية فى مارس ١٩٦٠ وكان الهدف دراسة بعض الصفات الاقتصادية الهامة وهى وزن الجسم ونسبة انتاج الحملان والنسبة المئوية للنفوق كما تم دراسة وزن الجزة من الصوف وقطر ليفة الصوف ويمكن تلخيص اهم النتائج التى ادى اليها البحث فيما يلى:

١ - يختلف وزن الجسم عند الميلاد تبعا للجنس والحملان الفردية
والتوائم كما قدرت أوزان الكباش والنعاج إلى عمر ٦ سنوات .

٢ ـ نسبة انتاج الحملان (النسبة المثوية للحملان وبالنسبة للنعاج التي ولدت فعلا) هي ٥ ر ١٢٩ واتضح أن السنة ليس لها تأثير معنوى على هذه النسبة من عام لعام .

٣ ــ تبلغ النسبة المئوية لنفوق الحمالان (من الولادة حتى الفطام)
٣ ــ تبلغ النسبة المؤية لنفوق الحمالان (من الولادة حتى الفطام)
٣٢٠ ٢٠ وكانت الاختلافات من عام لعام ذات تأثير معنوى عال •

3 _ كان متوسط وزن الجزه من الصوف هو $7.7\% \pm 0.0\%$ و $31.0 \pm 0.0\%$. للنعاج والكباش على التوالى وكانت الفروق بينهما ذات معنوية عالية .

٥ – كان قطر ليفة الصوف يتراوح بين ١٩٦١ و ١٩٥٥ ميكرون وكانت الاختلافات في قطر ليفة الصوف من عام لعام ذات معنوية عالية احصائيا .