

## **THE EFFECT OF GIVING INTERMEDIATE AND INTERMEDIATE PLUS GUMBORO VACCINES AT THE AGE OF 21**

MAAMON AL AMIR\* and ANOUAR. ALOMAR\*\*

\* Fact. of Vet. Med.-Albaath University.

\*\*Fact. of Vet. Med.-Albaath University.

E-Mail: [mamonvet@hotmail.com](mailto:mamonvet@hotmail.com)

### **ABSTRACT**

**Received at: 3/8/2014**

This research aims to study the sera evaluation of the interference between maternal derived antibodies and IBD vaccines which are given lately. This research experienced a group of chicks taken from old aged breeders and another young ones. These were divided into groups, each one contains 30 chicks. These groups were given (Intermediate and Intermediate plus) IBD vaccines when They were 21 day. Before vaccination The MDA were examined as well as the levels of the antibodies which were produced from the vaccination. There were found that the late Gumboro vaccination would risk the Birds by Disease, There we also found That the intermediate plus vaccination would stimulate higher immune responce than the intermediate one, but it will cause a great damage in Bursa tissues.

**Accepted: 16/11/2014**

**Keywords:** *Intermediate, Intermediate plus, Gumboro vaccines, Age 21 day.*

### **تأثير إعطاء لقاحات الجمورو المتوسطة والمقواة في اليوم ٢١ من العمر**

**مأمون الأمير ، أنور العمر**

E-Mail: [mamonvet@hotmail.com](mailto:mamonvet@hotmail.com)

تهدف هذه الدراسة إلى: تقييم مصلي للتداخلات بين المناعة الأممية ولقاحات الجمورو المعطاة بعمر متاخر.

أجريت هذه الدراسة على مجموعة من صيصان دجاج اللحم أخذت من أمات (مقدمة في السن وأخرى صغيرة السن) وقسمت إلى مجموعات كل مجموعة تتتألف من ٣٠ صوص أعطيت المجموعات لقاحات جمورو مختلفة الضراوة (متوسطة و مقواة) بعمر ٢١ يوم ، وتمت مراقبة مستويات الأضداد الأممية قبل التحصين وكذلك معايرة الأضداد النوعية الناتجة عن إعطاء اللقاح أسيو عيًّا . وقد وجد أن تأخير التحصين ضد مرض الجمورو يعرض القطيع لخطر الإصابة بالمرض و كما وجد أن اللقاح المقوى يحفز استجابة مناعية أعلى من اللقاح المتوسط إلا أنه قد يسبب تآدي أشد في نسيج الجراب.

### **INTRODUCTION**

#### **المقدمة**

اكتشف مرض التهاب الجراب المعدي أو مرض الجمورو لأول مرة عام ١٩٦٢ (Cosgrove, 1962) ، ونظرًا لكون المرض قد اكتُشف في منطقة جمورو Gumboro في الولايات المتحدة الأمريكية فإن تسمية (جمورو) قد ارتبطت بالمرض ولا زالت تستخدم حتى الآن (Lukert and saif, 1997; Faragher, 1972).

ومنها الجمهورية العربية السورية حيث سُجل المرض فيها مرض الجمورو لأول مرة عام ١٩٩٦ (عبد العزيز ، ١٩٩٦) ، حيث انتشر المرض في القطر مسبباً خسائر اقتصادية كبيرة (Hubbo *et al.*, 2008).

يتبع العامل المسبب لمرض الجمورو إلى عائلة بيرنا Birnaviridae (Carter *et al.*, 2005)، وهي تضم ثلاثة أنواع رئيسية، واحد منها فقط يصيب الطيور ويدعى Avibirnavirus، وهو بدوره يضم نوعاً واحداً فقط (Brown, 1986; Practica *et al.*, 2006; Pedro *et al.*, 2008).

وهو من الفيروسات العاربة ، ذو انتظام عشاري الوجه ، يتراوح قطره ما بين ٦٥-٥٥ نانومتر (Hirai and Shimakura, 1974) ، يحتوي على الحمض النووي الريبي RNA مضاعف السلسلة (Pedro *et al.*, 2008) ، يتتألف الجين الفيروسي (genome) من قطعتين (A-B) حيث القطعة (A) تُشفِّر أربعة بروتينات فيروسية (VP2 - VP3 - VP4 - VP5) ، والقطعة (B) تُشفِّر البروتين الفيروسي (VP1). ولفيروس مرض التهاب الجراب المعدي نمطين مصليين هما النمط المصلي 1 والنمط المصلي 2

(Jackwood *et al.*, 1984; McFerran *et al.*, 1980) ، إذ يصيب النمط المصلي الأول الدجاج الفقي (OIE, 2008) ، وتم الكشف عن الأضداد النوعية للنمط المصلي الأول في أنواع الطيور الأخرى مع عدم ظهور أعراض المرض عليها، وتستخدم لقاحات مرض التهاب الجراب المعدي ضد النمط المصلي الأول (Dormitorio *et al.*, 2007).

النمط المصلي الأول Serotype 1 ، يصيب الدجاج ويسبب تبليطاً للجهاز المناعي فيها ، ويضم ثلاث أنواع من العترات مختلفة في شدة الإمراضية (Patricia *et al.*, 2006).

آ. العترات الكلاسيكية Classic IBDV Strain: وتنتمي إليها العترة الكلاسيكية الضاربة Virulent Classic IBDV التي تنتشر في أنحاء مختلفة العالم (Lojkic *et al.*, 2008; OIE, 2008).

ب- عترات شديدة الضراوة Very Virulent IBDV Strain

ج- العترات المتغيرة Variant IBDV Strain

أما النمط المصلي الثاني Serotype 2 فيُعد مسبباً للمرض في الدجاج الرومي (Ismail *et al.*, 1988) ، وهو غير ممرض للدجاج. إذ يُمكن التفريق بين هذين النمطين المصليين باستخدام اختبار التعادل الفيروسي (Neutralization Test Virus).

ينتقل المرض بالالتامس المباشر بين الطيور ، وعن طريق الأدوات والمواد الملوثة والأشخاص والهواء والقمل وغيرها ، إلا أنه لا ينتقل من الأمات إلى الصيصان بشكل عمودي ، وبطريق الفيروس بعد ٢٤ ساعة من العدوى، أما فترة الحضانة فتتراوح ما بين ٤-٦ أيام. يحافظ الفيروس على حيويته عند درجة الحرارة ٦٥ °م لمنطقة خمس ساعات على الأقل، وعند درجة الحرارة ٣٠ °م لمدة ٦٠ دقيقة. كما أنه يقاوم الفينول ٥٪، ولا يتأثر بالائيثر والكلوروفورم ودرجة الباهاء عند ٢ pH=12، إلا أنه يتعطّل عند pH=12 (Benton *et al.*, 1967; Rosenberger *et al.*, 1989).

يُعد جراب فابريل شخص الهدف الرئيسي للفيروس Target Organ والذى يعتبر أحد الأعضاء اللمفاوية الأولية Primary lymphoid organ حيث يحدث فيه نضج وتمايز للخلايا الملفاوية البانية B ، والتي هي مصدر إنتاج الجلوبولينات المناعية والتي تساهم في المناعة الخلطية ، (Tanimura and Sharma, 1997).

إن خمج الطيور بعمر يوم واحد بـ IBDV يؤدي إلى قلة شديدة في IgG في المصل بشكل كامل ولكنه يزداد في الأسبوع الأول للخمج بينما تتحفظ مستويات IgM معنوياً وبغض النظر عن وقت الخمج (Hirai *et al.*, 1974).

إن التبليط المناعي الناتج عن الإصابة بفيروس IBD يكون مسؤولاً عن مضاعفات الإصابة بأحماق حلبية أخرى (Dohms and Saif, 1984).

يتم السيطرة على المرض عن طريق تطبيق إجراءات التحصين والأمن الحيوي وتأمين مناعة كافية عند الطيور وهناك طريقتان رئيسيتان للحصول على مناعة جيدة عند الطيور هما التمنيع الفاعل (Active immunization) والتمنيع المنفع (Passive immunization). (Tizard, 2004).

يوجد نوعان من هذه اللقاحات هما الأكثر توفرًا للسيطرة على المرض وهي إما لقاحات حية مضيفة Live attenuated vaccine أو لقاحات خاملة Oil-emulsion adjuvante vaccine . (OIE, 2008; Thornton and Pattison *et al.*, 1975).

تحضر اللقاحات الحية من عترات حلبية للفيروس مضيفة على المزارع الخلوية أو على أجنة بيض الدجاج وتختلف هذه اللقاحات فيما بينها تبعاً لضرارتها (درجة إضعاف العترة الحلبية) فيمكن أن تكون اللقاحات ضعيفة Mild Vaccines، أو لقاحات متوسطة Intermediate Vaccines . (OIE, 2008).

يتم اكتساب الأضداد الأممية (Brambell, 1970) ويتراوح نصف حياة الأضداد النوعية لفيروس الجمبورو ما بين ٥-٣ أيام في الصيصان وقد تبين أن MDA مقدرة على معادلة IBDV (Wyeth and Cullen, 1976) ولذلك فإنه يجب التأكد من أن مستوى MDA مرتفع بشكل كافي لتأمين حماية من الإصابة بـ IBD (Nunoya *et al.*, 1992) خصوصاً خلال الأسابيع ٣-٢ الأولى من العمر قبل التحصين للـ IBD وإلا فيجب القيام بالتحصين المبكر.

إن التحصين في اليوم الأول لصيصان لديها مستوى منخفض أو ليس لديها MDA باستخدام عترات لقاحات مضافة متوسطة أو مقواة للـ IBD بشكل خطيراً كبيراً كونه يؤدي لتبليط مناعي شديد نتيجة التدمير الشديد للجراب ، وعلى عكس ما سبق إن عدم قدرة فيروس اللقاح على معادلة MDA بشكل كامل يؤدي إلى فشل في تكاثر الفيروس في جراب فابريلشوس وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على تشكيل أضداد نوعية (Hair-Bejo *et al.*, 2004).

لقد وجد أنه هناك العديد من القطعان التي أصيبت بالـ IBD قد حصلت بلقاح الجمورو الحي عن طريق ماء الشرب وبأعمار تتراوح بين ٤-٧ يوم ، وربما يكون سبب الخمج هو فشل التحصين نتيجة لعدم تقدير العمر المناسب للتحصين، أو بسبب وجود مستوى مرتفع من الأضداد الأمية ، أو الخطأ في طريقة التحصين، أو فوعة اللقاح المستخدم (Eterradossi and Saif, 2008).

وقد وجد أنه إذا حصلت الطيور قبل الوقت المناسب للتحصين بأكثر من يوم واحد فإن الاستجابة المناعية الخلطية تتأخر أو لا تلاحظ مطلقاً (Block *et al.*, 2007).

ولرسم مخطط الأضداد للقطيع (flock profiling) يمكن مراقبة مستويات الأضداد في قطuan الأمات أو في صيصانها الفاقيحة حديثاً حيث أن ذلك يمكن أن يساعد في تحديد الوقت المناسب للتحصين (Eterradossi and Saif, 2008) ، مع الانتباه إلى أنه إذا أخذت عينات المصل من الصيصان الفاقيحة حديثاً عادةً يكون معدل الأضداد أقل بـ ٦٠-٨٠٪ مما هو عند الأمات (Eterradossi and Saif, 2008)

#### **الأهداف (Objectives):**

- ١- تقييم مصلي للتدخلات بين المناعة الأمية ولقاحات الجمورو المعطاة بعمر متاخر.
- ٢- دراسة تأثير تأخير إعطاء لقاح الجمورو لطيور الفروج.
- ٣- مراقبة الاستجابة المناعية الناتجة عن إعطاء اللقاح في اليوم ٢١ من العمر.

## **MATERIALS and METHODS**

### **مواد وطرق العمل**

#### **مواد البحث:**

تم تربية طيور التجربة في حظيرة كلية الطب البيطري لجامعة البعث وأنجزت الاختبارات أيضاً في مخابر الكلية.

#### **:Birds**

تم الحصول على صيصان بعمر يوم واحد من سلالة تجارية معروفة من مصدرين للأمات مختلفين في العمر.

المصدر الأول: **Group1** تتكون من ٧٥ صوص بعمر يوم واحد ، أخذت من أمات صغيرة العمر (عمر الأمات عند الحصول على صيصان التجربة ٣٧ أسبوع).

المصدر الثاني: **Group2** تتكون من ٧٥ صوص بعمر يوم واحد ، أخذت من أمات كبيرة العمر (عمر الأمات عند الحصول على صيصان التجربة ٥٥ أسبوع).

تم تربية الطيور لمدة ٤٢ يوم في مجموعات منفصلة ، مع مراعاة شروط التربية الصحية وتطبيق إجراءات الامن الحيوي ، وتمت تغذيتها على أعلاف تجارية دون إعطاء أي معالجات دوائية بالصادات الحيوية ودون إعطاء أي فيتامينات.

#### **:Vaccines**

استُخدم في هذه الدراسة :

- لقاح الجمورو الحي متوسط الضراوة intermediate vaccines

- لقاح الجمورو الحي المقوى Intermediate plus vaccines

#### **B-طرق**

بلغ عدد الطيور في بداية التجربة ١٥٠ صوص في اليوم الأول من العمر قسمت إلى مجموعات كما يلي :

#### **:Group1 المجموعة الأولى**

ربيت الطيور كمجموعة واحدة من اليوم ١ وحتى ٢١ من العمر واعتباراً من اليوم ٢١ قُسمت إلى ثلاثة مجموعات متساوية في العدد يتكون كل منها من ٢٥ طائر وهي:

مجموعة D1: حُصلت بلقاح متوسط في اليوم ٢١ من العمر.

مجموعة E1: حُصلت بلقاح مقوى في اليوم ٢١ من العمر .

مجموعة F1 : لم تُحصل وأقيمت كشاهد سلبي.

#### **:Group2 المجموعة الثانية**

ربيت الطيور كمجموعة واحدة من اليوم ١ وحتى ٢١ من العمر واعتباراً من اليوم ٢١ قُسمت إلى ثلاثة مجموعات متساوية في العدد كل منها يتكون من ٢٥ طائر وهي:

مجموعة D2: حُصلت بلقاح متوسط في اليوم ٢١ من العمر

مجموعة E2: حُصلت بلقاح مقوى في اليوم ٢١ من العمر .

مجموعة F2 : لم تُحصن و أبقيت كشاد سلي.

**- عينات الدم : Blood Samples**

جمعت ٢٠ عينة دم في اليوم الأول من العمر عن طريق الوريد الوداجي لصيchan كل من المجموعتين Group1 و Group2 وذلك للكشف عن المستوى الأضداد الأمية في اليوم الأول.

ومن ثم تم تتبع مستويات الأضداد وجمع عينات الدم أسبوعياً حيث تم جمع ٣٠ عينة دم في الأيام ١٤, ١١, ٧ من العمر من الوريد الوداجي لصيchan المجموعتين Group1 و Group2.

اعتباراً من اليوم ٢١ من العمر تم تقسيم الطيور إلى ٦ مجموعات هي (D1,E1,F1) و (E2,D2,F2) كما هو موضح سابقاً، وأعطيت اللقاحات وفق المواعيد المذكورة أعلاه ، وتم جمع ١٠ عينات دم من طيور كل مجموعة من المجموعات السابقة في الأيام (٤٢,٣٥,٢٨) للكشف عن الاستجابة المناعية الناتجة عن إعطاء اللقاح.

وضعت عينات الدم في أنابيب عقيدة بشكل مائل على سطح مستوى لتسريع عملية تجلط الدم والمساعدة في انفصال المصل ثم ثُفت العينات بسرعة ٢٠٠٠ د/د لمدة ١٠ دقائق.

حفظت عينات المصل في أنابيب ابندورف بدرجة حرارة -٢٠ درجة مئوية لتتم معالجة الأضداد لاحقاً.

**طريقة التحصين : Vaccination**

أعطيت اللقاح عن طريق القطرير بالعين حيث تمت إماهة محتويات المجدف بالمذيب الخاص به وذلك حسب تعليمات الشركة المصنعة.

**التقنيات المخبرية : Laboratory Techniques**

**:Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay**

استخدم اختبار الإليزا غير المباشرة للكشف عن مستوى الأضداد الموجودة في مصل دم الطيور حسب طريقة Marquardt (Marquardt et al., 1980; Rosenberger, 1989; OIE, 2008) وذلك باستخدام مجموعات تشخيصية من شركة IDEXX الأمريكية .(Serial No.:09260-EE206)

**:Preparation of serum samples**

تم تمييد عينات المصل بنسبة (١٪٥٠٠) حيث تم مزج عينة المصل جيداً وأضيف إليه ٥٠٠ ميكروليتر من محلول التمييد Dilution Buffer ومزجت جيداً قبل توزيعها على أطباق الإليزا.

**طريقة العمل :**

توضع الكواشف بدرجة حرارة الغرفة (٢٧-٢٠ م) ومزجت جيداً قبل الاستخدام.

١- وضعت ١٠٠ ميكرو ليتر من الشاهد السلبي غير الممدد في كل من الحفر A1 و A2.

٢- أضيف ١٠٠ ميكرو ليتر من الشاهد الإيجابي غير الممدد في كل من الحفر A3 و A4.

٣- أضيف ١٠٠ ميكرو ليتر من عينات المصل التي تم تمييدها إلى الحفر المخصصة لها.

٤- حضن الطبق لمدة ٣٠ دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.

٥- تم التخلص من محتويات الحفر وغسلت محتويات الحفر بمقدار ٣٠٠ ميكرو ليتر من الماء المقطر لكل حفرة وكررت العملية ثلاثة مرات.

٦- وزعت ١٠٠ ميكرو ليتر من المقترب Conjugate لكل الحفر بما فيها حفر الشاهد الإيجابي و السلبي.

٧- كررت الخطوتين ٤ و ٥ مرة أخرى.

٨- وزعت ١٠٠ ميكرو ليتر من محلول الركيزة TMB Substrate لجميع الحفر.

٩- حضن الطبق بدرجة حرارة الغرفة لمدة ١٥ دقيقة ابتداءً من لحظة إضافة Substrate إلى الصفيحة الأولى للطبق.

١٠- أضيفت ١٠٠ ميكرو ليتر من محلول إيقاف التفاعل Stop Solution إلى كل الحفر.

١١- تمت معالجة جهاز قارئ أطباق الإليزا (BIO-TEK) بواسطة الهواء Blank reader with air.

١٢- قراءة النتائج على موجة طولها ٦٥٠ نانومتر (650 nm).

**تقييم النتائج :**

يعطي اختبار ELISA لون تتناسب شدته مع معيار الأضداد النوعية لـ IBD والموجودة في عينة المصل المختبرة ، ويعبر عن ذلك بقياس شدة اللون بواسطة جهاز قارئ الإليزا (Micro plate reader) ويعبر عن ذلك بوحدة الكثافة البصرية (O.D) Optical Density ليتم إدخالها إلى الحاسوب حيث يقارن الحاسوب العينة المختبرة مع (الفرق بين O.D الشاهد الإيجابي و O.D الشاهد السلبي). هذه المقارنة يعبر عنها بتناسب العينة المختبرة إلى الشاهد الإيجابي (S/P) Sample to positive ratio.

وحتى تكون نتائج العمل صحيحة يجب أن يكون الفرق بين متوسط الشاهد الإيجابي و متوسط الشاهد السلبي ( $\bar{x}_{NC}$ ) أكبر من (0.057)، وأن يكون متوسط امتصاصية الشاهد السلبي أقل من (0.150).

وعندما تكون قيمة التناسب S/P للعينة المختبرة أقل أو يساوي (0.20) تعتبر العينة سلبية، وعندما تكون قيمة تناسب S/P للعينة المختبرة أكبر من (0.20) (معايير الأضداد أكبر من ٣٩٦) تعتبر العينة إيجابية وتشير للتحصين أو تعرض القطاع للعدوى بمرض IBD.

تم حساب معايير الأضداد بواسطة الحاسوب

Negative control mean ( $\bar{x}_{NC}$ )

$$\bar{x}_{NC} = \frac{Well\ A1\ A(650) + Well\ A2\ A(650)}{2}$$

Positive control mean ( $\bar{x}_{PC}$ )

$$\bar{x}_{PC} = \frac{Well\ A3\ A(650) + Well\ A4\ A(650)}{2}$$

$$S/p\ ratio = \frac{Sample\ Mean - NC\bar{x}}{PC\bar{x} - NC\bar{x}}$$

Titer – relates  $S/p$  at a 1:500 dilution to an endpoint titer:

$$\log_{10} Titer = 1.09(\log_{10} S/p) + 3.36$$

#### التحليل الإحصائي :Statistical analysis

تم تحليل مختلف المعلمات التي تم قياسها خلال فترة التربية إحصائياً بواسطة تحليل المتغيرات Analyse of Variance (ANOVA) اختصاراً Analysis OF Variance (ANOVA)، عندما تكون الفروق معنوية بين قيم المتوسطات الحسابية لمعايير الأضداد ، يتم إجراء اختبار نيومن كولس Newman-Keuls. جميع المعلمات تم تحليلها بواسطة البرنامج الإحصائي Statistica version8 (Stat Soft 2008, USA)

## RESULTS

### النتائج

- نتائج المانعة الأمية:  
المجموعة الأولى Group1: أظهرت النتائج أن متوسط معيار الأضداد في اليوم الأول من العمر (٥٦٩٤,٩) وقد تراوحت معايير الأضداد لهذه المجموعة من (٧٨٨٨) إلى (٢٢٧٦)، وقد لوحظ انخفاض معيار الأضداد تدريجياً حتى اليوم ٢١ من العمر الجدول رقم (١).

المجموعة الثانية Group2: أظهرت النتائج أن متوسط معيار الأضداد في اليوم الأول من العمر (٥٠٦٤,٢٥) وقد تراوحت معايير الأضداد لهذه المجموعة من (٣١٤٠) إلى (٨٧٦٠)، وقد لوحظ أيضاً انخفاض معيار الأضداد تدريجياً اعتبار من اليوم الأول حتى اليوم ٢١ من العمر الجدول رقم (٢).

- الاستجابات المانعة الناتجة عن التحصين:  
للحظة شكل استجابة مناعية لدى طيور المجموعات (D1,E1,D2,E2) والمجموعات (D1,D2) وقد أظهرت الدراسة الإحصائية عدم وجود فرق معنوي بين المجموعة D1 المحصنة بلقاح متوسط في اليوم ٢١ والمجموعة E1 المحصنة بلقاح مقوى في اليوم ٢١ - خلال الأيام ٢٨,٣٥ من العمر. ولكن لوحظ وجود فرق معنوي بين هذه المجموعات في اليوم ٤ من العمر، الجدول رقم (١).

وقد كانت نتائج الدراسة الإحصائية لدى المجموعة (D2,E2) مشابهة لما سبق الجدول رقم (٢).

جدول رقم ١: متوسط معايير الأضداد Group 1

العمر بالأيام	المجموعة		
	$X \pm SD$		
١		5694.9 $\pm$ 292.99 N=20	
٧		2338.12 $\pm$ 146.58 N=30	
١٤		651.68 $\pm$ 84.42 N=30	
٢١		234.57 $\pm$ 40.66 N=30	
٢٨	D1 المجموعة 57.5 $\pm$ 30.06 ns N=10	E1 المجموعة 21.40 $\pm$ 20.40 ns N=10	F1 المجموعة 55.50 $\pm$ 19.33 ns N=10
٣٥	D1 المجموعة 1250.60 $\pm$ 131.14 <sup>a</sup> N=10	E1 المجموعة 1390.10 $\pm$ 264.42 <sup>a</sup> N=10	F1 المجموعة 1.00 $\pm$ 0.00 <sup>b</sup> N=10
٤٢	D1 المجموعة 1514.66 $\pm$ 197.38 <sup>b</sup> N=10	E1 المجموعة 2601.10 $\pm$ 301.82 <sup>a</sup> N=10	F1 المجموعة 1.00 $\pm$ 0.00 <sup>b</sup> N=10

حيث أن:

$X \pm SD$  = المتوسط الحسابي  $\pm$  الانحراف المعياري لـ N عينة باختبار الإليزا غير المباشرة ، N = عدد العينات المختبرة  
الأحرف a,b,c تشير إلى المجموعات المتغيرة إحصائياً بمعنى a>b>c عند مستوى معنوية p<0.05 ، ns = الفروقات بين المتوسطات غير معنوية.

مجموعة D1 = حصنت بلقاح متوازن في اليوم الواحد والعشرين ، مجموعة E1 = حصنت بلقاح مقوى في اليوم الواحد والعشرون من العمر ، مجموعة F1 = أبقت كثاحد سلبي ولم تحصن .

جدول رقم ٢: متوسط معايير الأضداد Group 2

العمر بالأيام	المجموعة		
	$X \pm SD$		
١		5064.25 $\pm$ 336.71 N=20	
٧		1647.04 $\pm$ 130.32 N=30	
١٤		460.58 $\pm$ 66.07 ns N=30	
٢١		256.30 $\pm$ 57.76 ns N=30	
٢٨	D2 المجموعة 1.00 $\pm$ 0.00 ns N=10	E2 المجموعة 84.70 $\pm$ 62.47 ns N=10	F2 المجموعة 1.00 $\pm$ 0.00 ns N=10
٣٥	D2 المجموعة 1387.80 $\pm$ 256.50 <sup>a</sup> N=10	E2 المجموعة 1579.40 $\pm$ 174.44 <sup>a</sup> N=10	F2 المجموعة 1.00 $\pm$ 0.00 <sup>b</sup> N=10
٤٢	D2 المجموعة 1322.25 $\pm$ 123.67 <sup>b</sup> N=10	E2 المجموعة 1717.40 $\pm$ 312.85 <sup>a</sup> N=10	F2 المجموعة 1.00 $\pm$ 0.00 <sup>c</sup> N=10

حيث أن:

$X \pm SD$  = المتوسط الحسابي  $\pm$  الانحراف المعياري لـ N عينة باختبار الإليزا غير المباشرة ، N = عدد العينات المختبرة  
الأحرف a,b,c تشير إلى المجموعات المتغيرة إحصائياً بمعنى a>b>c عند مستوى معنوية p<0.05 ، ns = الفروقات بين المتوسطات غير معنوية.

مجموعة D2 = حصنت بلقاح متوازن في اليوم الواحد والعشرين ، مجموعة E2 = حصنت بلقاح مقوى في اليوم الواحد والعشرون من العمر ، مجموعة F2 = أبقت كثاحد سلبي ولم تحصن .

## **DISCUSSION**

### **المناقشة**

يتم التحصين ضد مرض التهاب الجراب المعدى IBD في سوريا بمواعيد مختلفة وبأعمار تتراوح من ٢١-٧ يوماً، إما لمرة واحدة أو لمرتين (تحصين أولي وداعم)، وإن موعد التحصين لمرض الجمبورو يرتبط بمعيار الأضداد الأمية لدى الصيصان.

ولتجنب تعارض اللقاح المعطى مع المناعة الأمية يلجأ بعض المربين لتأخير موعد التحصين حتى ٢١-١٩ يوم من العمر وقد تمكنت هذه الدراسة من تتبع استدامة الأضداد الأمية عند الصيصان ، ومن دراسة تأثير تأجيل إعطاء لقاح الجمبورو حتى اليوم ٢١ من العمر ، ومن دراسة الفروقات في الاستجابات المناعية الناتجة عن اختلاف عترة اللقاح المستخدم.

وقد أظهرت الدراسة الإحصائية عدم وجود فرق معنوي في مستوى الأضداد في اليوم الأول من العمر عند صيصان المجموعتين Group1 و Group2 بالرغم من اختلاف عمر الأمات التي أخذت منها هذه الصيصان (٣٧ أسبوع و ٥٥ أسبوع) على التنالي ، ويعتقد أن ذلك يعود إلى الفرق في كفاءة برنامج التحصين عند قطعان الأمات ، يشير ذلك إلى أنه لا يمكنه بالاعتماد على عمر الأمات لتقدير مستوى الأضداد عند الصيصان والتkenh باليوم الأنسب للتحصين وإنما يستدعي ذلك لزوم اختبار عينات الدم للصيصان في اليوم الأول للتربية لتحديد مستوى الأضداد وتقييم اليوم الأنسب للتحصين.

كما لوحظ أن مستوى الأضداد ينخفض بشكل تدريجي خلال ٢١ يوماً بعد الفقس (عند طيور كل من المجموعتين Group1,Group2 أي أنه من غير الممكن توفير حماية لجاج اللحم عن طريق المناعة المنفعة طيلة فترة التربية، وهذا يشير إلى ضرورة تحصين دجاج اللحم خلال فترة التربية وهذا ما يتوافق مع (Vanden Berg and Meulemans, 1991) ، وقد وجد أن معدل انخفاض الأضداد هو تقريباً النصف كل ٣.٥ يوم.

لدى مقارنة معيار الأضداد في اليوم ٤ من العمر وجد أن أعلى معيار للأضداد كان في تلك المجموعات المحصنة بلقاح مقوى في اليوم ٢١ من العمر وهذا يفسر بأن شدة الاستجابة المناعية للقاح ترتبط بمستوى الأضداد الأمية للصيصان عند التحصين إلا أنه من الممكن أن تتشكل فرصة لحمج الطيور في مجموعات التجربة التي حصلت في اليوم ٢١ (D1,D2,E1,E2) قبل يوم التحصين وذلك لأن معيار الأضداد انخفض إلى أدنى من المعدل الإيجابي خلال ٢١-٦ يوماً بعد الفقس في هذه المجموعات ، كما أن التحصين سيستغرق على الأقل حوالي ٧-٥ أيام لإنتاج الأضداد وعندئذ تكون الطيور عرضة للإصابة لمدة ١٤-١٠ يوماً وهذا يتوافق مع (Eterradossi and Saif, 2002) إذ إن العمر الأكثر قابلية للإصابة بمرض IBD هو بين ٦-٣ أسابيع وفقاً لهـ (Alam et al., 2002) .(2008)

## **CONCLUSIONS and RECOMMENDATION**

### **الاستنتاجات والتوصيات**

- . يرتبط موعد التحصين لمرض الجمبورو بشكل أساسي بمستوى الأضداد الأمية عند الصيصان وبنصف عمر هذه الأضداد.
- . ضرورة إجراء اختبار الاليزا في اليوم الأول من العمر للكشف عن مستوى الأضداد الأمية وعدم التkenh بموعد التحصين المناسب بالاعتماد على عمر الأمات فقط.
- . إن تأخير التحصين حتى اليوم ٢١ من العمر (دون دراسة الحالة المناعية للطيور) قد يجعل القطبيع معرض لخطر الإصابة بالمرض.
- . إن اللقاح المقوى قد يحفز استجابة مناعية أعلى من اللقاح المتوسط ولكن من المتوقع أن يحدث تدمير شديد لخلايا الجراب خصوصاً عند وجود مستوى متدني من الأضداد الأمية.
- . توقيت التحصين ، ونوع اللقاح المستخدم، ومستوى MDA عند الصيصان ، وتحدي وامراضية IBDV الحقلية هي عوامل هامة لتحديد فعالية وشكل برنامج التحصين لالتهاب الجراب المعدى.

## **REFERENCES**

### **المراجع**

عبد العزيز، فهيم (١٩٩٦): دراسة الواقع الوبائي لمرض التهاب جراب فابريشيوس في مزارع رعاية الفروج. مجلة جامعة تشرбин للدراسات والبحوث – سلسلة العلوم الزراعية – المجلد (١٨) – العدد (٦).

Alam, J.; Rahman, M.M.; Sil, B.K.; Khan, M.S.R. and Giasuddin Sarker, M.S.K. (2002): Effect of maternally derived antibody on vaccination against infectious bursal disease (Gumboro) with live vaccine in broiler, International Journal of Poultry Science, 1, 4, 98-101.

Benton, W.J.; Cover, M.S. and Rosenberger, J.K. (1967): Studies on the transmission of the infectious bursal agent (IBA) of chickens. Avian DIS 11: 430- 438.

- Block, Hermann, Meyer-Block, Karen, Rebeski, Dierk E.; Scharr, Heike, de Wit, Sjaak, Rohn, Karl and Rautenschlein, Silke' (2007): A field study on the significance of vaccination against infectious bursal disease virus (IBDV) at the optimal time point in broiler flocks with maternally derived IBDV antibodies'. Avian Pathology, 36: 5, 401-409.
- Brambell, F.W.R. (1970): The transmission of passive immunity from mother to young. Frontiers of Biology, 18: 20-41.
- Brown, F. (1986): The classification and nomenclature of viruses: Summary of results of meetings of the International Committee on Taxonomy of Viruses in Sendai. Intervirology 25: 141-143.
- Carter, G.R.; Wise, D.J. and Flores, E.F. (2005): Birnaviridae: In Virology. Cited by www.ivis.org.
- Cosgrove, A.S. (1962): An apparently new disease of chicken avian-nephrosis. Avian Dis.6:385-389.
- Dohms, JE. and Saif, YM. (1984): Criteria for evaluating immunosuppression. Avian Dis. 28:305-310.
- DormitorioA, T.V.; GiambroneAC, J.J.; GuoA, K. and JackwoodB, D.J. (2007): Molecular and Phenotypic Characterization of Infectious Bursal Disease Virus Isolates. Avian Diseases 51(2): 597-600.
- Eterradossi, N. and SAif, Y.M. (2008): Infectious Bursal Disease pp. 185-208 12 edition.
- Faragher, J.T. (1972): Infectious bursal disease of chicken. Vet. Bull. 142: 361-396.
- Hair-Bejo, M.; Ng, M.K. and Ng, H.Y. (2004): Day Old Vaccination Against Infectious Bursal Disease in Broiler Chickens Poultry Science 3 (2): 124-128, 2004.
- Hirai, K. and Shimakura, S. (1974): Structure of infection bursal disease virus. J. Virol 14:957 -964.
- Hirai, K., Shimakura, S.; Kawamoto, E.; Taguchi, F.; Kim, S.T.; Chang, C.N. and Iritani, Y. (1974): The immunodepressive effect of infectious bursal disease virus in chickens. Avian Dis 18: 50-57.
- Hubbo, Kh.; Alomar, A. and Fadel, M. (2008): Prevalence of IBD Virus in some areas of Syria. Journal of AL-BAATH University. Vol. 30- No: 8- pp 241-256.
- Ismail, N.; Saif, Y. and Moorhead, P. (1988): Lack of pathogenicity of five serotype 2 infectious bursal disease virusin chickens. Avian Dis. 32: 757-759.
- Jackwood, D.J.; Saif, Y.M.; Moorhead, P.D. and Bishop, G. (1984): Failure of two serotype II infectious bursal disease viruses to affect the humoral immune response of turkeys. Avian Dis 28: 100- 116.
- Lojkic, I.Z. Bidin, B. Pokrc. (2008): Sequence Analysis of both Genome Segments of Three Croatian Infectious Bursal Disease Field Viruses. Avian Diseases Digest 3(3): e25-e25.
- Lukert, P.D. and Saif, Y.M. (1997): Infectious bursal disease, p. 721-738. In B. W. Calnek, B. W. Barnes, C. W. Beard, L.R. McDougald, and Y.M. Saif (ed.), Diseases of poultry, 10th ed. Iowa State University Press, Ames.
- Marquardt, W.; Johnson, R.B.; Odenwald, W.F. and Schlotthober, B.A. (1980): An indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for measuring antibodies in chickens infected with infectious bursal disease virus. Avian Dis. 24: 375-385.
- McFerran, J.B.; McNulty, M.S.; McKillop, E.R.; Conner, T.J.; McCracken, R.M.; Collins, D.S. and Allan, G.M. (1980): Isolation and serological studies with infectious bursal disease viruses from fowl, turkey and duck: Demonstration of a second serotype. Avian Pathol 9: 395-404.
- Nunoya, T.; Otaki, Y.; Tajima, M.; Hiraga, M. and Saito, T. (1992): Occurrence of acute infectious bursal disease with high mortality in Japan and pathogenicity of field isolates in SPF chicken. Avian Dis. 36: 597-609.
- Office international des epizooties world organis animal health (2008): Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines.
- Patricia, R.; Calderón, M.G.; Aguirre, S.; Periolo, O.; Torre, J. and Mattion, N. (2006): Characterization of Infectious Bursal Disease Viruses from Argentina. Avian Diseases 50(2): 245-251.
- Pedro Villegas, A.; Hamoud, M.; Purvis, L.B. and Perozo, F. (2008): Infectious Bursal Disease Subunit Vaccination. Avian Diseases 52(4): 670-674.
- Rosenberger (1989): Infectious bursal disease viruses. In: Isolation and idenrification of Avian pathogens, 3rd ed (Editorial committee: Purchase, H.C., Arp L.H Domermuth, C.H. and pearson, J.E) Kendall/Hunt publishing Company, Dubuque, Iowa, PP.165-166.
- Tanimura, N. and Sharma, J.M. (1997): Appearance of T cells in the bursa of Fabricius and cecal tonsils during the acute phase of infectious bursal disease virus infection in chickens. Avian Dis. 41: 638-645.
- Thornton, D.T. and Pattison, M. (1975): Comparison of vaccines against IBD. J. Comp. Pathol. 85: 597-610.
- Tizard, I.R. (2004): Veterinary immunology (an introduction). Seventh Ed. Elsivier publishing company .Philadelphia. USA.
- Vanden Berg, T.P. and Meulemans, G. (1991): Acute infectious bursal disease in poultry; protection afforded y maternally- derived antibodies and interference with live vaccination. Avian Pathol. 20: 409-421.
- Wyeth, P.J. and Cullen, G.A. (1976): Maternally derived antibody effect on susceptibility of chicks to infectious bursal disease. Avian Pathol., 5: 253-260.