

## **SEROREVELATION OF ANTIBODIES OF EQUINE HERPESVIRUS (EHV1/EHV4) IN SYRIA**

(With One Table and Two Figures)

### **الكشف عن الأضداد النوعية للقوباء الخيلية النمطين المصلين 1 و 4 في سورية**

**حازم الطويل ، عبد الكريم قلب اللوز ، محمد زهير الأحمد\***

\* قسم الجراحة والولادة – كلية الطب البيطرى – جامعة البعث – حماه - سوريا

(Received at 18/3/2011)

الهدف من هذه الدراسة هو التقصي المصلي عن مرض الإجهاض الوبائي عند الخيل في سورية أو ما يسمى بالتهاب الأنف والرئة الفيروسي الخيلي أو إعتلال الدماغ والنخاع الشوكي الخيلي والمعروف عالمياً بالقوباء الخيلية النمطين المصلين (EHV1 و EHV4). ينتشر هذا المرض بشكل كبير في كل بلدان العالم التي تعنى بتربية الخيول. يعتبر النمط المصلي EHV1 من الأمراض المجهضة للخيول كما أنه يسبب اضطرابات تنفسية وعصبية في حين أن النمط EHV4 يكون مسؤولاً عن الاضطرابات التنفسية. تم في هذه الدراسة التقصي مصلياً عن إصابة الخيول في سورية بأحد نمطي الفيروس المصلين ( 1 و 4 ) وذلك في عينات دموية جمعت من 203 خيول (حصان – فرس – مهر) غير ملقحة ضد المرض موزعة على خمس مناطق رئيسية لتشمل كامل سورية وذلك باستخدام إختبار المقايسة المناعية الأنزيمية غير المباشرة (الإليزا غير المباشرة). تم العثور على الأضداد الخاصة بالنمط EHV1 في المناطق الخمس بواقع 7(3.5%) عينات إيجابية مصلياً كما تم العثور على الأضداد الخاصة بالنمط EHV4 في المناطق الخمس بواقع 195(96%) عينة إيجابية مصلياً. وهذه أول دراسة للتقصي عن هذا المرض في سوريا.

### **SUMMARY**

The objective of this study is, serological investigation of Epizootic Equine Abortion (EEA) or Equine Rhinopneumonitis (ER) Equine Herpesvirus Myeloencephalopathy (EHM) that know worldwide Equid herpesvirus (EHV type 1 and 4) in Syria. Equid

herpesvirus 1 and 4 are widespread in the domestic horses population worldwide. EHV1 is a major cause of abortion, respiratory and neurological disorders in horses. EHV4 is responsible of respiratory disease. In this study, Antibodies of EHV1 and 4 were investigated serologically in horses in Syria. A total of 203 *unvaccinated* horses in five regions in Syria were sampled and tested using indirect ELISA. EHV1-specific antibodies were found to be in fifth regions as 7(3.5%). EHV4-specific antibodies were found to be in fifth regions as 195(96%). This is the first serological investigation for EHV1 and EHV4 in Syria.

**Key words:** *Epizootic equine abortion, equine herpesvirus, serology, Syria.*

## INTRODUCTION

### المقدمة

إن مرض التهاب الأنف والرئة المعدي أو مرض الإجهاض الوبائي الخيلي (القوباء الخيلية النمطين EHV-1 و EHV-4) هو من الأمراض ال حموية الخطيرة التي تصيب الخيول كما يعد هذا المرض العامل الرئيسي لظهور التهابات رشحية للأغشية المخاطية في الرأس مصحوبة ب أعراض التنفسية وكذلك إجهاض الإناث الحوامل والاضطرابات العصبية والحمى ويسبب حدوث الالتهاب الرئوي الولادي عند الأمهار ونفوقها وكذلك حدوث الاعتلال الدماغي الشوكي عند الخيول في كل أنحاء العالم. وقد تم إثبات وجود هذا المرض منذ أكثر من 60 عاماً كمهدد لتربية الخيول العالمية (O'Callaghan *et al.*, 1983; Allen and Bryans, 1986 ; Bryans and allen, 1988; Allen *et al.*, 1999; Crabb and Studdert, 1995)

حتى عام 1981 كان يعتقد أن النمطين المصلين للحمة يشكلان نمطاً مصلياً واحداً والذي كان يعرف بالنمط المصلي 1 ويعرف كمرض باسم ( الإجهاض الحموي الوبائي أو التهاب الأنف والرئة المعدي عند الخيول) حيث وجدت قرابة مصلية شديدة جدا بين ( EHV-1) و(EHV-4) والطرق المصلية العادية المتبعة في الكشف عن الأضداد لا تستطيع الكشف إلا عن الأضداد المصلية للنمطين معاً ولا يتم التفريق بينهما إلا بطرق متقدمة مثل تقنية (تفاعل ال بلمرة المتسلسل - PCR) فهما يمتلكان تتابع متشابه للنكليوتيدات حيث تصل نسبة التشابه من 55% إلى 84% وكذلك تتابع

متشابه للأحمض الأمينية يصل من 55% إلى 96%. (Telford *et al.*, 1992 ;  
(1998). لكن بينت نتيجة الفحوصات لتحديد البنية الداخلية النكليوزيدية للدنا أنهما  
حمتان مختلفتان ومستضدياً ومورثياً و ينتميان إلى جنس ال حمات الحماقية  
(*Varicellovirus*) التي تنتمي لتحت عائلة حمات القوباء ألفا  
(*Alphaharpesvirina*) (Studdert 1974; Sabine *et al.*, 1981) والتي  
بدوره تنتمي إلى عائلة حمات القوباء (*Herpesviridae*) (Carter and  
Wise, 2006).

ينتشر المرض في معظم دول العالم ويعد كمشكلة عالمية تهدد تربية الخيول  
في جميع أنحاء العالم (Matumoto *et al.*, 1965). وتأتي أهمية هذا المرض من  
الصفة التي يمتلكها العامل المسبب من خلال مرحلة الكمون التي تقوم بها الحمة  
داخل جسم الحيوان المصاب وعودة الأعراض بعد فترة من الشفاء (Edington *et al.*,  
1994) يصيب المرض الخيول بالدرجة الأولى، ثم تأتي الحمير والبغال بالدرجة  
الثانية، بغض النظر عن العمر والجنس. ولكن لوحظ أن معظم الإصابات المبكرة تكون  
عند الخيول بعد إتمامها الشهر الثاني عشر من عمرها (Edington *et al.*, 1994).  
وهناك دراسات تدل على انتشار إصابات تنفسية كثيرة قبل سن الفطام عند الأمهار  
(Bryans, 1981)، كما بينت تقارير بحثية للتقصي عن المرض في أستراليا عن  
وجود أجسام مضادة للمرض عند أمهات من أمهات غير محصنة ضد المرض  
بعمر شهر واحد فقط (Gilkerson *et al.*, 1997).

ينتقل المرض عن طريق التماس المباشر بين الحيوانات المصابة والسليمة أو  
الحيوانات الحاملة للمرض. كما ينتقل عن طريق التماس غير المباشر بين الحيوانات  
المصابة أو الحاملة أو الناظفة والحيوانات غير المصابة وذلك عن طريق أدوات  
الحيوان والعلف والماء والتي تكون قد لوثت من قبل الحيوان المصاب. كما يمكن  
للعدي أن تنتقل عن طريق أدوات الطبيب البيطري، ينتقل العامل المسبب أيضاً عن  
طريق الإفرازات الأنفية والفموية (Doll and Bryans, 1963; Allen and  
Bryans, 1986). كما تعتبر الأجنة المجهضة والسوائل الجنينية الناتجة عن  
إجهاض الأفراس المصابة بالمرض مصدراً خطيراً للعدي (Ballagi *et al.*  
(1990).

وقد لوحظ أن العدوى الكامنة تعود للنشاط بعد تعرض الحيوان الذي يحمل الإصابة للإجهاد. والأفراس المصابة بعدوى كامنة تكون مصدراً لإصابة جنيته بالمرض وعدم ميلاده. وهذا المهر يصبح بغيره مصدراً للعدوى (Gilkerson *et al.*, 1997). كما أن الإجهاد والعلاج بالستيروئيدات القشرية يؤدي أيضاً إلى تنشيط الحمى وعودة العدوى من جديد (Welch *et al.*, 1992; Slater 2007).

كذلك تستطيع الذكور المصابة أن تنقل العدوى أيضاً عن طريق الجماع حيث يتم طرح الحمى عن طريق السائل المنوي ولمدة طويلة. ووجد أيضاً أن الحمى تتفاعل مع الكابسول الذي يوجد في البويضة الملقحة وبالتالي بقاء هذه الحمى في الجنين رغم اضمحلال الكابسول بعد 22-25 يوماً بعد التلقيح (Betteridge *et al.*, 1989; Carvalho *et al.*, 2000).

من أهم الأعراض التي تظهر على الحيوان الحمى حيث تصل درجة الحرارة إلى 40 م (Allen and Bryans, 1986) والقهم (فقدان الشهية) (Studdert, 1974) مع أعراض تنفسية بعد فترة حضانة تمتد من 3-6 أيام من التعرض لمصدر العدوى على شكل إفرازات أنفية مخاطية تتحول إلى قيحية نتيجة التهاب الأنف والرئة والتي تتطور نتيجة الإصابة الثانوية بالإضافة للسعال وزيادة الأضواء التنفسية والإفرازات العينية (Bryans and Allen, 1989). تحدث الإصابة التنفسية بشكل أكثر تكراراً ومصادفة لهذا المسبب في التجمعات التي تجرى للخيول بهدف التدريب والسباقات ومنافسات الفروسية الأخرى

(OIE Terrestrial Manual 2008) تكون الإصابة التنفسية ناتجة عن الإصابة بالنمط الفيروسي 4 عند الخيول بعمر فوق (2-3) سنة وتكون الأعراض متشابهة مع الإصابة التنفسية بالنمط 1 (Edington *et al.*, 1991). تحدث الإصابة التنفسية بالنمط (EHV-1) في الخيول اليافعة تحت 2 سنة وفي الإناث الحوامل والإناث الضعيفة والذكور كبيرة العمر والضعيفة (Allen *et al.*, 2004). إن الخطر التالي للإصابة التنفسية يكون من خلال إجهاد الإناث الحوامل والإصابات العصبية المركزية حيث يحدث الإجهاد بعد فترة حضانة تمتد من 7 أيام إلى عدة أشهر (Bryans and Allen, 1989). إن حمى القوباء الخيلية النمط 1 هي من أهم العوامل الممرضة واسعة الانتشار من خلال إثارته المعاصرة من الإجهادات أو الانتشار الفردي عند الأفراس الحوامل وكذلك إحداث موت المواليد المبكر والإصابات التنفسية في الخيول الفتية وكذلك إحداثه للإعتلال الدماغي الشوكي (Van Maanen, 2002; Reed and Toribio 2004; Patel and Heldens, 2005).

تجهض الأفراس الحوامل عادةً في الفترة بين 6 و 11 شهراً من الحمل حتى في حالة عدم وجود علامات سريرية أخرى للمرض وتحدث 95% تقريباً من حالات الإجهاض نتيجة للإصابة بالنمط 1 في الثلث الأخير من الحمل (Allen and Bryans, 1986). عندما تصاب الحوامل في الفترة الأخيرة من الحمل يلاحظ أنها تلد مواليد ميتة أو أمهارة حية ضعيفة مصابة بالمرض تظهر عليها الأعراض فيما بعد وتنفق خلال ثلاثة أيام (Van Maanen *et al.*, 2000).

يتم تشخيص المرض حقلياً عن طريق مشاهدة الأعراض والصفة التشريحية أما التشخيص المخبري فيتم من خلال الفحص النسيجي مع عزل الفيروس من الأعضاء المتضررة (الكبد-البنين المجهض-العقد البلغمية). يستخدم اختبار الـ PCR (Polymerase Chain Reaction) لتشخيص الإصابة من خلال إكثار الحمض النووي الفيروسي للنمطين 4/1 في العينات السريرية النسيجية حتى العينات المحفوظة بالبرافين أو المزروعة في الخلايا المعدة لتكاثر الفيروس (Borchers and Slater, 1993). أما التشخيص المصلي بطريقة الإليزا ELISA الكلاسيكية (Dutta *et al.*, 1983) واختبار تثبيط المتممة CFT وإختبار التآلق المناعي IFT (Thomson *et al.*, 1976). وهذه الطرق الاعتيادية المصلية للكشف عن مرض الإجهاض الوبائي أو التهاب الأنف والرئة الخيلي لا تفرق بين الإصابة بالنمط المصلي 1 والنمط المصلي 4 بسبب التفاعل المستضدي المتصالب للنمطين (Crabb and Studdert, 1993; Crabb and Studdert 1995; Hartley *et al.*, 2005). في أواسط التسعينات تم تطوير نوع خاص من الإليزا لتشخيص الإصابة بين النمطين 1 و 4 يعتمد على تقنية جديدة تعتمد على اختلاف الجزء الطرفي (سي) البروتيني من البروتين السكري (جي) لكلا النمطين (ELISA based on the C-terminal portion of glycoprotein G of both viruses) تعتمد الإليزا المطورة طريقة يعتمد عليها ومفضلة بسبب الفائدة التطبيقية لهذا الإختبار وحساسيته بالمقارنة مع الإختبارات المصلية الأخرى. (Crabb and Studdert, 1993; Crabb and Studdert *et al.*, 1995; Yasunaga *et al.*, 2000; Hartley *et al.*, 2005).

## OBJECTIVES

## أهداف البحث

- 1- تحديد وجود الحالات الإيجابية مصليا لمرض الإجهاض الوبائي عند الخيول والمعروف عالميا بالقوباء الخيلي (EHV-1 و EHV-4) في سورية.
- 2- تحديد نسبة هذه الحالات الإيجابية لتحديد انتشار المرض مصليا في المناطق المدروسة.

## MATERIALS and METHODS

### مواد وطرائق العمل

شمل البحث دراسة ناديين من أندية الخيول وعدد من المزارع الخاصة التي تعنى بتربية الخيل وقد بلغ مجموعها 22 مزرعة وقد تم الحصول أيضا على عينات من مزارع خاصة لمربين هواة تحوي رأس أو رأسين من الخيل ، وقد بلغ المجموع الكلي لعدد الحيوانات في هذه الأندية والمزارع 398 رأس خيل، حيث أخذت عينات دم باستخدام أنابيب مفرغة من الهواء، وخالية من أي مانع تخثر، وذلك من 203 رأس من الخيول (مهر – حصان – فرس حامل - غير حامل) وقد كانت الخيول التي أخذت منها العينات في هذا البحث غير م حصنة ضد مرض الإجهاض الوبائي عند الخيل (القوباء الخيلية النمطين EHV4/EHV1) وتتراوح أعمارها بين 1 شهر حتى 23 سنة، معظم الخيول لم تبتد أي أعراض مميزة للمرض عند جمع عينات الدم وأكدت القصة المرضية (تاريخ الحالة) لمعظم هذه الخيول وجود أعراض تنفسية شائعة عند كل خيول الدراسة وأعراض فردية إجهاضية سابقة عند عدد من الأفراس المدروسة وسجلت حالة عصبية وحيدة فقط. بعد جمع العينات، نقلت إلى المخابر المعنية حيث ثقلت وجني مصل الدم وأخضع لاختبار الأليزا الغير مباشرة.

عينات المنطقة الجنوبية									
رقم العينة	اسم الخيل	الجنس	العمر	ملاحظات	مكان جمع العينات	EHV1	النتيجة 1	EHV 4	النتيجة 4
1	مخفي	أنثى	2.5		دمشق	0.002	-	0.987	+
2	مخفي	أنثى	6		دمشق	0.136	-/+	0.804	+
3	مخفي	أنثى	3	حامل	دمشق	0.033	-	0.501	+
4	مخفي	أنثى	5		دمشق	0.089	-	0.861	+
5	مخفي	أنثى	11 شهر		دمشق	0.001	-	0.368	+
6	مخفي	أنثى	12	حامل	دمشق	0.015	-	0.829	+
7	مخفي	أنثى	4	حامل	دمشق	0.039	-	2.271	+
8	مخفي	ذكر	8		دمشق	0.022	-	0.86	+
9	مخفي	أنثى	23	جهاض 4 أشهر	دمشق	0.002	-	0.46	+
10	مخفي	أنثى	4	والدة	دمشق	0.039	-	0.759	+
11	مخفي	أنثى	3		دمشق	0.005	-	1.455	+
12	مخفي	ذكر	2		دمشق	0.037	-	1.157	+
13	مخفي	أنثى	3.5		دمشق	0.196	-/+	1.78	+
14	مخفي	أنثى	3		دمشق	0.239	+	1.532	+
15	مخفي	أنثى	4		دمشق	-0.019	-	1.245	+
16	مخفي	انثى (ابنة 17)	2		دمشق	0.004	-	0.03	-
17	مخفي	أنثى	5		دمشق	0.054	-	1.272	+
18	مخفي	أنثى	10	حامل ع الولادة	دمشق	0.022	-	1.299	+
19	مخفي	أنثى	2.5	التهاب صفائح	دمشق	-0.011	-	0.649	+
20	مخفي	أنثى	3.5	هولندي	دمشق	-0.017	-	1.37	+
21	مخفي	ذكر	4	بونى	دمشق	0.019	-	1.929	+
22	مخفي	أنثى	18	التهاب رحمية	دمشق	-0.004	-	1.392	+
23	مخفي	أنثى	7	حامل 9 أشهر	دمشق	0.067	-	1.127	+
24	مخفي	ذكر	16		دمشق	0.015	-	1.471	+
25	مخفي	أنثى	4	حامل	دمشق	0.017	-	0.432	+
26	مخفي	أنثى	4	حامل	دمشق	0.111	-/+	1.287	+
27	مخفي	أنثى	7	حامل	دمشق	0.055	-	1.633	+
28	مخفي	ذكر	6		دمشق	0.041	-	1.508	+

صورة لقاعدة البيانات التي جمعت أثناء جمع العينات من المزارع المختلفة تبين نوع جنس ورقم العينة والملاحظات قبل عملية أخذ عينة الدم.

## اختبار المقايسة المناعية المرتبط بالإنزيم ELISA للكشف عن الإجهاض الوبائي الخيلي:

استخدم كيت SVANOVIR® وهو عبارة عن اختبار مقايسة مناعية مرتبطة بالإنزيم (ELISA)، من أجل الكشف عن الأضداد النوعية لحمة القوباء الخيلية النمطين EHV4/EHV1 وذلك لتحديد وجود الإصابة أو عدمها وكذلك التفريق بين الإصابة بالنمط EHV1 والنمط EHV4. يتم الكشف عن هذه الأضداد النوعية في المصل والبلازما عند الخيول.

### مبدأ الاختبار:

يتكون الكيت من أطباق خاصة باختبار الإليزا يحتوي كل منها على 96 حفرة، مطلية من الداخل بالمستضدات الخاملة لحمة الإجهاض الوبائي - النمطين EHV1 و EHV4 حيث تتوزع الحفر في كل طبق على الشكل التالي:

- حفر الخطوط (10-7-4-1) تحتوي مستضدات خاصة بالنمط EHV1
- حفر الخطوط (11-8-5-2) تحتوي مستضدات خاصة بالنمط EHV4
- حفر الخطوط (12-9-6-3) تكون حفر شاهدة.

يتم توزيع كل عينة من عينات الدم المأخوذة من الخيول على الخطوط الثلاثة السابقة الذكر الخاصة بالنمط 1 و 4 والشاهد. بعد ذلك يتم الكشف عن هذه الأضداد النوعية المرتبطة بالحفر بواسطة أضداد ثانوية Anti-rabbit-HRP conjugated (IgG-horse) موسومة بالبيروكسيداز وجاهزة للاستعمال والتي تقوم بأكسدة الدائرة TMB (Substrate solution-TetraMethyl-Benzidine - TMB)، مما يؤدي إلى تشكل لون أزرق ثم أصفر عند إضافة محلول توقيف التفاعل (Stop Solution) الذي يحتوي على حمض السلفوريك. إن شدة اللون تتناسب طردياً مع كمية الأضداد النوعية للعينة الموجودة في الحفر، حيث يتم التشخيص عبر مقارنة الكثافة الضوئية الناتجة DO التي يتم الحصول عليها للعينات مع الشواهد.

### طريقة العمل

توضع جميع مكونات التفاعل مع العينات في درجة حرارة الغرفة قبل البدء بالاختبار، مع رج العيوات جيداً قبل الاستخدام، ويتم الاختبار وفق الخطوات التالية:

- 1- يتم تمديد عينات المصل باستخدام المحل الخاص بالعينات بنسبة 100/1.

- 
- SVANOVIR®- Equine Herpes Virus Type 1 and 4 Discriminating test (EHV1/EHV4-Ab)- SVANO



- 2- نقوم بعد ذلك بتوزيع 100 ميكروليتر من كل عينة على 3 حفر من حفر الطبق:  
حفرة للكشف عن الأضداد النوعية للنمط 1 وحفرة للكشف عن أضداد النمط 4  
وحفرة شاهد مستضدي (Control antigen)
- 3- نقوم بإضافة 100 ميكروليتر من محلول الشاهد الإيجابي والسليبي في الحفر  
الخاصة بهما في كل طبق ، كما نقوم بإضافة الشاهد الإيجابي للنمط 4 في الحفر  
الخاصة على الطبق أيضاً. وهنا لا بد من الإشارة أنه يمكن اختيار حفر الشاهد  
الإيجابي والسليبي ولكن من الأفضل التقيد بالتوصيات الخاصة بالشركة المصنعة.
- 4- يغطى الطبق بشريط لاصق ويحضن مع الرج المستمر بدرجة حرارة الغرفة لمدة  
ساعتين وذلك باستخدام رجاج بطيء السرعة.
- 5- تغسل كل حفرة 4 مرات بواسطة 300 ميكروليتر من محلول الغسيل PBS  
Tween buffer الممدد بالماء المقطر بنسبة 20/1. ثم نقوم بتفريغها في حوض  
المغسلة وإجراء عدة ضربات للطبق على ورق نشاف مع مراعاة عدم تشكيل  
فقاعات داخل الحفر وإخراج محلول الغسيل بشكل كامل من الحفر.
- 6- يضاف 100 ميكروليتر من محلول الأضداد النوعية الثانويّة HRP  
(conjugated rabbit–Anti-IgG-horse) الموسومة بالبيريوكسيداز.
- 7- يحضن الطبق بدرجة حرارة الغرفة مع الرج المستمر لمدة ساعة واحدة.
- 8- تكرر المرحلة رقم 5/ من أجل الغسيل.
- 9- يضاف 100 ميكروليتر من محلول الدائرة (-Substrate solution)  
(TetraMethyl-Benzidine, TMB) في كل حفرة ثم يحضن الطبق لمدة 10  
دقائق بدرجة حرارة الغرفة. نبدأ بالتوقيت من لحظة ملئ أول حفرة من حفر الطبق.  
نلاحظ خلال التحضين ظهور اللون الأزرق الغامق في الحفر الحاوية على الأضداد  
النوعية لنوع المستضد الملتصق بالحفرة وكذلك ظهور اللون الأزرق في حفر الشاهد  
الإيجابي للنمطين (A1,A2) وحفرة الشاهد الإيجابي للنمط 4 (C2).
- 10- يتم إيقاف التفاعل بإضافة 50 ميكروليتر من المحلول الموقف للتفاعل بنفس  
الترتيب عند إضافة الدائرة للحفر كلها. نلاحظ عند ذلك تحول اللون الأزرق إلى  
اللون الأصفر مباشرةً.
- 11- تقرأ النتيجة باستخدام مقياس الطيف الضوئي على موجة طولها 450 نانومتر.

**قراءة النتائج:**

بعد قراءة الجهاز للطبق نقوم بتصحيح أرقام القراءة للطبق باستخدام معادلة التصحيح الخاصة بالشركة الصانعة وفق التالي:  
الكثافة البصرية المصححة = الكثافة البصرية للحفرة الحاوية على المستضد  
الكثافة البصرية للحفرة الحاوية على الشاهد المستضدي

$$OD Corr = OD Antigen - OD Control antigen$$

الكثافة البصرية المصححة للحفرة الحاوية على محلول الشاهد الإيجابي يجب أن تكون أعلى من 0.6 والحفر الحاوية على الشاهد السلبي يجب أن تكون كثافتها البصرية المصححة أقل من 0.1.

#### تفسير النتيجة:

الكثافة البصرية < 0.2 : العينة المصلية إيجابية للحفرة.

الكثافة البصرية > 0.1 : العينة المصلية سلبية للحفرة.

الكثافة البصرية 0.1 – 0.2 : العينة المصلية مشتبهاة.

أما فيما يتعلق بالحساسية والنوعية لهذا الاختبار فقد درست من قبل كارفالو ورفاقه فكانت الحساسية 100% أما النوعية فكانت 94.7% (Carvalho et al., 2000).

## RESULTS


### النتائج

أظهرت نتائج اختبار الإليزا غير المباشرة (المقايسة المناعية الأنزيمية) المستخدمة بهذه الدراسة إكتشاف الأضداد النوعية ل حمى الإجهاض الوبائي النمط EHV1 في سبع حالات من مجموع الخيول التي أخذت منها العينات والبالغ عددها 203 خيلاً (203 / 7) بنسبة إصابة تشكل 3.5%. وقد لوحظ من النتائج عدم تسجيل أي حالة إيجابية للنمط EHV1 في كل من المنطقة الساحلية والشرقية بينما كانت نسب الإصابة في كل من المنطقة الشمالية (2.2%) والوسطى (8%) والجنوبية (4%). أما بالنسبة للنمط EHV4 فقد سجلت النتائج إصابة 195 خيلاً من أصل 203 وبنسبة إصابة وصلت إلى 96%. كما لوحظ أن عدد الخيول التي أكتشفت فيها الأضداد النوعية للنمطين هي (7) حالات فقط من مجموع الحالات المدروسة في هذا البحث (الجدول رقم 1).

الجدول رقم 1: يبين توزع العينات الإيجابية مصلياً والنسب المنوية للإصابة لكلا نمطي المرض (EHV4/EHV1) في المناطق المختلفة من سورية.

النمط EHV4		النمط EHV1		عدد العينات	اسم المنطقة
نسبة الإصابة %	العينات الإيجابية	نسبة الإصابة %	العينات الإيجابية		
98	49	4	2	50	المنطقة الجنوبية
90	47	8	4	50	المنطقة الوسطى
93,3	42	2,2	1	45	المنطقة الشمالية
97,5	39	0	0	40	المنطقة الشرقية
100	18	0	0	18	المنطقة الساحلية
96	195	3,5	7	203	المجموع الكلي

### للمنظين الإيجابية العينات توزع EHV4/EHV1



- عدد العينات
- العينات الإيجابية للنمط 4
- العينات الإيجابية للنمط 1

	المنطقة الجنوبية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشمالية	المنطقة الشرقية	المنطقة الساحلية
■ عدد العينات	50	50	45	40	18
■ العينات الإيجابية للنمط 4	49	47	42	39	18

التحليل الإحصائي للنتائج :

استخدمنا في التحلي ل الإحصائي له ذا المس-ح توزيع المعاينة للنسبة The  
:Sampling Distribution of the Proportion


إن مفهوم توزيع المعاينة للنسبة هو نفس ذلك التوزيع المتعلق بمعدلات العينات المدروسة فهو توزيع افتراضي لخصائص مشاهدات تكون فيها الفوائد مقدرة عندما نريد أن نحصل على استنتاج إحصائي للنسب المئوية لقطع من القطعان أو مزرعة من المزارع أو مجموعات من حيوانات نريد دراستها.  
وبالتالي فإن النتائج تكون كالتالي :

$$(SE_{p1}=0.14) (0.013-0.07, CI 95\%)$$

ثقتنا (95%) للنسبة الحقيقية للخيول التي تحمل أعداد إيجابية لمرض الإجهاض الوبائي عند الخيل (القوباء الخيلية النمط EHV1 ) ما بين (0.07 – 0.013)

$$(SE_{p4}=0.014) (0.93-0.98 , CI 95\%)$$

ثقتنا (95%) للنسبة الحقيقية للخيول التي تحمل أعداد إيجابية لمرض الإجهاض الوبائي عند الخيل (القوباء الخيلية النمط EHV4 ) ما بين (0.98 – 0.93)



## DISCUSSION

### المناقشة

إن الغاية من هذه الدراسة هي الكشف عن الأضداد الخاصة بالحمية المسببة لمرض الإجهاض الوبائي عند الخيول (النمطين EHV1 و EHV4) وحساب نسبة الإصابة الحقلية والكشف عن خطورة انتقال وتكاثر لحمية المسبب للمرض بين المناطق المدروسة.

فقد أكد الباحثون على أهمية هذا المرض من حيث كمون الإصابة وعودته في أي لحظة وسرعة انتشار هذا المرض وصعوبة الوقاية منه وعلاجه فهو مرض حموي يصيب الخيل يتصف بالحمى والتهاب رئوي للأغشية المخاطية للرأس والمجاري التنفسية العليا وإجهاض الإناث الحوامل وظهور الأعراض العصبية وبالتالي الخسائر الفادحة التي تصيب هذا القطاع عند انتشار هذا المرض

(O'Callaghan *et al.*, 1983 ; Allen and Bryans, 1986 ; Bryans and Allen, 1988 ; Matsumura *et al.*, 1992 ; Crabb and Studdert, 1995 ; Allen *et al.*, 1999)

فقد أثبت وجود المرض في مناطق عديدة من العالم والتي تهتم بتربية الخيول وهي تعاني من المرض ولم تجد له حلاً مجدياً حتى الآن رغم التطور الذي رافق تربية هذه الحيوانات في الآونة الأخيرة والمبالغ الطائلة التي تصرف على هذه التربية فقد أثبت وجود المرض في بريطانيا (Powell *et al.*, 1976) وأمريكا

(Carman *et al.*, 1963; Mumford *et al.*, 1998) وكندا (Doll and Bryans, 1963; Mumford *et al.*, 1998)

(Bagust and Pascoe, 1968 ; Duxbury and Oxer, 1997) وأستراليا (*al.*, 1997) Crabb and Studdert, 1968 ; Studdert *et al.*, 1974 ; Gilkerson *et al.*, 1999) 1995; Gilkerson *et al.*, 1997 ;

ونيو زيلندا (Jolly *et al.*, 1986) واليابان (Kawakami *et al.*, 1962) وتركيا Ataseven (Gürs and Yapici., 2008; *et al.*, 2009)

والإمارات (OIE, 2010) وجنوب إفريقيا (Mason *et al.*, 1989).

إن المسوحات السابقة للكشف عن المرض والتي استعانت بالاختبارات المصلية مثل إختبار تثبيط المتممة واختبار التعادل المصلي لم تفلح في تحديد نمط الإصابة الحموي ولم تفرق بين الأضداد النوعية لكل نمط بسبب التفاعل التصالبي المستضدي للحميتين. وفي أواسط التسعينات تم تطوير نوع خاص من الإليزا لتشخيص الإصابة بين النمطين EHV1 و EHV4 يعتمد على تقنية جديدة تعتمد على اختلاف

الجزء الطرفي (C) البروتيني من البروتين السكري (G) (C-terminal portion of )

(glycoprotein G) لكلا النمطين الحمويين. وتعد الإليزا المطورة طريقة مفضلة يعتمد عليها بسبب الفائدة التطبيقية لهذا الإختبار وحساسيته بالمقارنة مع الإختبارات المصلية الأخرى (Crabb and Studdert 1993 ; Crabb *et al.*, 1997 ;

.Yasunaga *et al.*, 2000 ; Hartley *et al.*, 2005)

كما أكد (Van Maanen *et al.*, 2000) أن الإليزا أكثر حساسية من إختبار التعادل المصلي حيث وجد تقارب شديد بين الإختبارين، غير أن الإليزا أكثر حساسية فإين المعايير القليلة كانت تظهر نتيجة إيجابية في إختبار التحدي لجرعة ضعيفة من المرض في الحيوانات الخالية من المرض كما أن الإليزا تحسست لارتفاع الأضداد النسبي عند التطعيم الثانوي في إختبار التحدي نفسه كما أن الإليزا أسهل وأسرع من إختبار التعادل وهو يعتبر أداة ثمينة في تشخيص المرض بالطرق المصلية.

وقد قام (Yasunaga *et al.*, 1998) بإجراء مسح للنقصي عن المرض في اليابان بإستخدام طريقة الإليزا غير المباشرة المطورة التي تعتمد على الغليكوبروتين (glycoprotein Gs (gGs)) للنمط الحموي 1 والنمط 4 وبإستخدام هذه الطريقة تم التفريق بين الإصابتين وهذه التقنية هي نفس التقنية التي استخدمت في هذا البحث وهي نفسها التي تم اعتمادها في الكشف عن المرض في تركيا (Gür, 2008; Ataseven *et al.*, 2009).

في دراستنا هذه تم أخذ العينات من مزارع خيول متخصصة بتربية أفراس التكاثر ونوادي الخيل المتخصصة بتربية خيول القفز والرياضة المختلفت وخيول فردية في مزارع خاصة منتشرة على كافة منطقة الدراسة حيث بلغ عدد العينات 203 عينة. أظهرت الإختبارات المصلية نسب إصابة متقاربة بالنمط 4 بين المناطق المدروسة، وقد سجلت أعلى نسبة للحالات الإيجابية مصليا للنمط 1 في المنطقة الوسطى حيث بلغت 8% وسجلت أقل نسبة من الحالات الإيجابية مصليا في المنطقة الشمالية حيث بلغت 2,2% وبالمقابل سجلت أعلى نسبة حالات إيجابية للنمط 4 في المنطقة الساحلية حيث بلغت 100%.

لقد كانت نتائج الإختبار مماثلة لتلك التي سجلت في الأبحاث التي جرت مسبقاً في دول مجاورة كذلك التي سجلت في مناطق قريبة من منطقتنا لتركيا فقد سيطرت الإصابة بالنمط 4 على معظم النتائج الإيجابية مصلياً حيث بلغت نسبة الإصابة الكلية في هذا البلد بهذا النمط 57% من مجموع خيول التجربة البالغ 188 عينة أما نسبة الإصابة بالنمط 1 فقد بلغت 3,7% من مجموع 188 عينة (Gür, 2008).

وفي دراسة أخرى قام بها Ataseven (2009) ، وجد أن نسبة الإصابة بالنمط 4 وصلت إلى 81% عام 2009 في تركيا. أما في اليابان فقد بينت الدراسات أن النتائج الإيجابية مصلياً كانت كالتالي : 80/30 عينة إيجابية مصلياً بالنمط 1 و 80/9 عينة إيجابية مصلياً للنمط 4 وذلك عام 1995-1996 وذلك حسب (Yasunaga, 1988)

وحسب تقارير مكتب الأوبئة الدولي للعينات الواردة إلى المخابر كانت النتائج في الإمارات العربية المتحدة تم الاشتباه بثلاث حالات إصابة بمرض الإجهاض الوبائي تبين وجود حالة إيجابية واحدة بعد عمليات عزل الفيروس (OIE, 2010) أما في جنوب إفريقيا فقد وصلت نسبة الإصابة بالمرض 6.77% من مجموع عينات مشتبه قدرها 325 عينة مشتبه بالمرض (OIE, 2009) كما بنت تقارير مكتب الأوبئة الدولي نشر في موقع السيفر وجود حالات إيجابية في فلسطين المحتلة فقد تم إثبات أربع حالات إيجابية بالمرض من بين عشرين حالة مشتبه جمعت من عدة مناطق (Crabb *et al.*, 1997) أنه في إحدى الدراسات للتقصي باستخدام الإليزا المطورة عن القوباء الخيلية النمطين المصليين 4/1 كانت كل العينات إيجابية للنمط المصلي 4 وهذا ما يتوافق مع النتائج التي حصلنا عليها في هذه الدراسة.

وحسب دراسات أخرى قام بها (Crabb and Studdert, 1993 ; Gilkerson *et al.*, 1994 ; Van Maanen *et al.*, 2000) فإن النمط 1 يسبب إصابات مرضية أكثر خطورة من الإصابات التي يسببها النمط 4 . يستنتج من هذه الدراسة إن مرض الإجهاض الوبائي هو تطور للإصابة بحمة القوباء الخيلية النمط 1 الذي يترافق بإصابة تنفسية بداية ثم يتطور للإجهاض وقد يتطور للإصابة العصبية . وأن انتشار مرض الإجهاض الوبائي في سورية لا يزال محدوداً ولم تتعد نسبة الإصابة الكلية في جميع مناطق الدراسة الـ 3.5%. إن انتشار الشكل التنفسي غير الخطير كان مرتفعاً فقد وصلت نسبة الإصابة في بعض المناطق حتى 100%. وإن انتشار الشكل التنفسي للمرض كان نتيجة الصفات الخاصة التي يتمتع بها فيروس القوباء من حيث الإصابة الكامنة وسرعة الانتشار. وقد توفرت بعض العوامل التي ساعدت على انتشار الشكل التنفسي ألا وهي انعدام إجراءات الأمن الحيوي في أغلب الإسطبلات التي تمت زيارتها والإفراط من قبل مربّي الخيول في الاعتماد على الكلافين في إعطاء الأدوية بصورة عشوائية دون الاستعانة بالطبيب البيطري. وقد لوحظ عدم جدوى استخدام اللقاح ضد مرض الإجهاض الوبائي حتى تاريخ كتابة هذا البحث.

## REFERENCES

- Allwn, G.P.; Kydd, J.H.; Slater, J.D. and Smith, K.C. (1999):  
Recent advances in understanding the pathogenesis,  
epidemiology, and immunological control of equid

- herpesvirus-1 (EHV-1) abortion. *Equine Infect. Dis.*, 8: 129–146.
- Allen, G.P.; Kydd, J.H. and Slater, J.D. (2004):* Equid herpesvirus 1 and equid herpesvirus 4 infections. In: Coetzer JAW, Tustin RC, eds. *Infectious Diseases of Livestock*, 1<sup>st</sup> ed. Newmarket: Oxford University Press., 829–859.
- Allen, G.P. and Bryans, J.T. (1986):* Molecular epizootiology, pathogenesis, and prophylaxis of equine herpesvirus-1 infection. in *Veterinary Microbiology and Immunology*, 2: 78–144.
- Ataseven, V.S.; Dagalp, S.B.; Güzelm, Basaran, Z.; Tan, M.T. and Geraghty, B. (2009):* Prevalence of equine herpesvirus-1 and equine herpesvirus-4 infections in equidae species in Turkey as determined by ELISA and multiplex nested PCR. *Res. Vet. Sci.*, 86(2): 339-44.
- Bagust, T.J. and Pascoe, R.R. (1968):* Isolation of equine rhinopneumonitis virus from acute respiratory disease in a horse in Queensland. *Aust. Vet. J.*, 44: 296.
- Ballagi, A.; Klingeborn, B.; Flensburg, J. and Belak, S. (1990):* Equine herpesvirus type 1: detection of viral DNA sequences in aborted fetuses with the polymerase chain reaction. *Vet. Microbiol.*, 22: 373–381.
- Betteridge, K.J. (1989):* The structure and function of equine capsule in relation to embryo manipulation and transfer. *Equine Vet. J.*, 8: 92–100.
- Borchers, K. and Slater, J. (1993):* A nested PCR for the detection and differentiation of EHV-1 and EHV-4. *J. Virol. Methods*, 45: 331–336.
- Bryans, J.T. and Allen, G.P. (1988):* Herpesviral diseases of the horse. In: *Herpesvirus Diseases of Animals*, Wittman G., ed. Kluwer, Boston, USA, 176–229.
- Bryans, J.T. and Allen, G.P. (1989):* Herpesviral diseases of the horse. In: *Herpesvirus Diseases of Cattle, Horses and Pigs*, Ed: G. Wittmann, Kluwer, Boston, pp. 176-229.
- Bryans, J.T. (1981):* Application of management procedures and prophylactic immunization to the control of equine



- rhinopneumonitis. In: Proc. Am. Ass. Equine Practnrs, Anaheim, pp. 259-272.
- Carman, S.; Rosendal, S.; Huber, L.; Gyles, C.; Mckee, S.; Willoughby, R.A.; Dubovi, E.; Thorsen, J. and Lein, D. (1997):* Infectious agents in acute respiratory disease in horses in Ontario. *J. Vet. Diagn. Invest.*, 9: 17–23.
- Carter, G.R. and Wise, D.J. (2006):* A Concise Review of Veterinary Virology, International Veterinary Information Service, Ithaca NY ([www.ivis.org](http://www.ivis.org)), Last updated: 9-May-2006; A3411.0506.
- Carvalho, R.; Passos, LMF.; Gouvea, A.M.G.; Resende, M.; Martins, A.S. and Franco, G.C. (2000):* Use of an ELISA system for detection of equine herpesvirus 1 (EHV-1) antibodies in non-symptomatic pregnant mares and neonatal foals. *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.*, 52, 3.
- Carvalho, R.; Passos, LMF.; Oliveira, AM.; Henry, M. and Martins, A.S. (2000):* Detection of equine herpesvirus 1 DNA in a single embryo and in horse semen by polymerase chain reaction. *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.*, 4–52.
- Crabb, B.S. and Studdert, M.J. (1995):* Equine herpesviruses 4 (equine rhinopneumonitis virus) and 1 (equine abortion virus). *Adv. Virus Res.*, 45: 153–190.
- Crabb, B.S. and Studdert, M.J. (1993):* Epitopes of glycoprotein G of equine herpesviruses 4 and 1 located near the c-termini elicit type-specific antibody responses in the natural host. *J. Virol.*, 67: 6332-6338.
- Crabb, B.S. and Studdert, M.J. (1994):* Equine herpesviruses 4 (equine rhinopneumonitis virus) and 1 (equine abortion virus). *Adv. Virus Res.*, 45: 153-190.
- Crabb, B.S.; Macpherson, C.M.; Reubel, G.H.; Browning, G.F.; Studdert, M.J. and Drummer, H.E. (1997):* Archives of Virology, 140(2): 245-258.
- Doll, E.R. and Bryans, J.T. (1963):* A planned infection program for immunizing mares against viral rhinopneumonitis. *Cornell. Vet.*, 53: 249-262.
- Dutta, S.K.; Talbot, N.C. and Myrup, A.C. (1983):* Detection of equine herpesvirus-1 antigen and the specific antibody by

- enzyme-linked immunosorbent assay. *Am. J. Vet. Res.*, 44: 1930-1934.
- Duxbury, A.E. and Oxer, D.T. (1968):* Isolation of equine rhinopneumonitis virus from an epidemic of acute respiratory disease in horses. *Aust. Vet. J.*, 44: 58–63.
- Edington, N.; Smith, B. and Griffiths, L. (1991):* The role of endothelial cell infection in the endometrium, placenta and fetus of equid herpesvirus 1 (EHV-1) abortions. *J. Comp. Pathol.*, 104: 379-387.
- Edington, N.; Welch, H.M. and Griffiths, L. (1994):* The prevalence of latent equid herpesviruses in the tissues of abattoir horses. *Equine Vet. J.*, 26: 140-142.
- Gilkerson, J.R.; Jorm, L.R.; Love, D.N.; Lawrence, G.L. and Whalley, J.M. (1994):* Epidemiologic investigation of equid herpesvirus 4 (EHV 4) excretion assessed by nasal swabs taken from Thoroughbred foals. *Vet. Microbiol.*, 39: 275-283.
- Gilkerson, J.R.; Love, D.N. and Whalley, J.M. (1997):* Serological evidence of equine herpesvirus 1 (EHV-1) infection in Thoroughbred foals 30–120 days of age. *Aust. Equine Vet.*, 15: 128–134.
- Gilkerson, J.R.; Teague, N.; Whalley, J.M. and Love, D.N (1999):* Aprospective cohort study of upper respiratory tract disease in one and two-year old racehorses. Serological evaluation of the roleof equine herpesviruses 1 and 4 (EHV-1 and EHV-4) in respiratory disease. *Aust. Equine Vet. J.* 17: 76–81.
- Gür, S. and Yapici, O. (2008):* Equine herpesvirus type 1 and 4 in individually reared horses in central and western Turkey. *Acta Vet. Brno.*, 77: 609-613.
- Hartley, C.A.; Wilks, C.R.; Studdert, M.J. and Gilkerson, J.R. (2005).* Comparison of antibody detection assays for the diagnosis of equine herpesvirus 1 and 4 infections in horses. *Am. J. Vet. Res.*, 66: 921-928.
- Jolly, P.D.; FU, Z.F. and Rorbinson, A.J. (1986):* Viruses associated with respiratory disease of horses in New Zealand: an update. *N. Z.Vet. J.*, 34: 46–50.

- Kawakami, Y.; Kaji, T.; Ishizaki, R.; Shimizu, T. and Matumoto, M. (1962):* Etiologic study on an outbreak of acute respiratory disease among colts due to equine rhinopneumonitis virus. *Jpn. J. Exp.Med.*, 32: 211–229
- Mason, D.K.; Watkins, K.L. and Luk, C.M. (1989):* Haematological changes in two Thoroughbred horses in training with confirmed equine herpesvirus 1 infections. *Vet. Rec.*, 124: 503–504.
- Matsumura, T.; Sugiura, T.; Imagawa, H.; Fujanaga, Y. and Kamada, M. (1992):* Epizootiological aspects of type 1 and type 4 equine herpesvirus infections among horse populations. *J. Vet. Med. Sci.*, 54(2): 207-211.
- Matumoto, M.; Ishizaki, R. and Shimizu, T. (1965):* Serological survey of equine rhinopneumonitis virus infection among horses in various countries. *Arch. Ges. Virusforsch.*, 50: 609–623.
- Mumford, J.A.; Traub Dargatz, J.L.; Salman, M.D.; Collins, J.K.; Getzy, D.M. and Carman, J. (1998):* Monitoring and detection of acute viral respiratory tract disease in horses. *J. Am. Vet. Med. Assoc.*, 213: 385–390.
- O’callaghan, D.J.; Gentry, G.A. and Randall, C.C. (1983):* The equine herpesviruses. In: Roizman B, editor. *The Herpesviruses*. New York: Plenum Press., p. 215–318.
- OIE Terrestrial Manual, (2008):* Chapter 2.5.9. - Equine rhinopneumonitis 849, 903.
- OIE, WWW.oie.int, Information received on (2009):* from Mr Bothle Michael Modisane, Chief Director Food and Veterinary Services, Department of Agriculture, Food Safety and Biosecurity: Department of Agriculture, PRETORIA, South Africa.
- OIE, WWW.oie.int, Information received on (2010):* from Eng Sumaia Al Rais, Head of Animal and Plant Health, Animal and Plant Health Department, Ministry of Environment and Water, Dubai, United Arab Emirates.
- Patel, J.R. and Heldens, J. (2005):* Equine herpesviruses 1 (EHV-1) and 4 (EHV-4) – epidemiology, disease and

- immunoprophylaxis: a brief review. *The Veterinary Journal*, 170: 14–23.
- Powell, D.G.; Burrows, R.; Spooner, P.R.; Goodridge, D.; Thomson, G.R. and Mumford, J. (1976):* A study of infectious respiratory disease among horses in Great Britain, 1971 to 1976. In: Bryans, J., Gerber, H. (Eds.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Equine Infectious Diseases*, Veterinary Publications, New Jersey, pp. 451–459.
- Reed, S.M. and Toribio, R.T. (2004):* Equine herpesvirus 1 and 4. *Veterinary Clinics of North America Equine Practice*, 20: 631–642.
- Sabine, M.; Robertson, G.R. and Whalley, J.M. (1981):* Differentiation of sub-types of equine herpesvirus 1 by restriction endonuclease analysis. *Aust. Vet. J.*, 57: 148-149.
- Slater, J. (2007):* Equine herpesviruses. In: Sellon, D., Long, M. (Eds.), *Equine Infectious Diseases*. Saunders Elsevier, St. Louis, USA, pp. 134–153.
- Studdert, M.J. (1974):* Comparative aspects of equine herpesviruses. *Cornell. Vet.*, 64: 94-122.
- Telford, E.A.R.; Watson, M.S.; McBride, K. and Davison, A.J. (1992):* The DNA sequence of equine herpesvirus-1. *Virology*, 189: 304–316.
- Telford, E.A.R.; Watson, M.S.; Perry, J.; Cullinane, A.A. and Davison, A.J. (1998):* The DNA sequence of equine herpesvirus 4. *J. Gen. Virol.*, 79: 1197–1203.
- Thomson, G.R.; Mumford, J.A.; Campbell, J.; Griffiths, L. and Clapham, P. (1976):* Serological detection of equid herpesvirus 1 infections of the respiratory tract. *Equine Vet. J.*, 8: 58–65.
- Van Maanen, C. (2002):* Equine herpesvirus 1 and 4 infections: an update. *Veterinary Quarterly*, 24: 58–78.
- Van Maanen, C.; Vreeswijk, J.; Moonen, P.; Brinkhof, J.; De Boer-Luijtz, E. and Terpstra, C. (2000):* Differentiation and genomic and antigenic variation among fetal, respiratory and neurological isolates from EHV 1 and EHV 4 infections in the Netherlands. *Vet. Q.*, 22: 88-93.

- Welch, H.M.; Bridges, C.G.; Lyon, A.M.; Griffiths, L. and Edington, N. (1992): Latent equid herpesviruses 1 and 4: detection and distinction using the polymerase chain reaction and co-cultivation from lymphoid tissues. *J. Gen. Virol.*, 73: 261-268.
- Yasunaga, S.; Maeda, K.; Matsumara, T.; Kondo, T. and Kai, K. (2000): Application of a type specific enzymelinked immunosorbent assay for equine herpesvirus types 1 and 4 (EHV-1 and -4) to horse populations inoculated with inactivated EHV-1 vaccine. *J. Vet. Med. Sci.*, 62: 687-691.
- Yasunaga, S.; Maeda, K.; Matsumara, T.; Kai, K.; Iwata, H. and Inoue, T. (1998): Department of Veterinary Microbiology, Faculty of Agriculture, Yamaguchi University, Japan. Diagnosis and sero-epizootiology of equine herpesvirus type 1 and type 4 infections in Japan using a type-specific ELISA. *J. Vet. Med. Sci.*, 60(10): 1133-1137.