

EFFECT OF PLANTING DATES ON GROWTH , YIELD AND QUALITY OF SOME SOYBEAN CULTIVERS AT AL - GABAL AL - AKHADAR AREA – LIBYA

Husein, T. F.; G. A. Darweish and M. M. Rattiba

Dept. of Agronomy, Fac. of Agric., Univ. of Omar AL–Mukhtar, Libya

تأثير مواعيد الزراعة على نمو ومحصول وجودة بعض أصناف فول الصويا بمنطقة الجبل الأخضر – ليبيا.

طيب فرج حسين، جلال عبد الرحمن درويش و محي الدين محمود رطيه
قسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة عمر المختار – ليبيا .

الملخص

أجريت تجربتان حقليتان بزرعة قنفذورة بمنطقة الوسيطة بالجبل الأخضر – ليبيا خلال الموسمين 2004 و 2005 لدراسة تأثير 3 مواعيد للزراعة (15 مارس و 15 ابريل و 15 مايو) على نمو ومحصول وجودة 3 أصناف من فول الصويا (جيزة 22 وجيزة 21 و جيزة 111) وقد استخدم تصميم القطاعات الكاملة العشوائية لعامل 3 X 3 في 4 قطاعات ويمكن إيجاز أهم النتائج المتحصل عليها فيما يلي:
1- أظهرت الأصناف تأثيرا معنويا على كل من وزن الأوراق الجاف في الموسم الأول وارتفاع النبات في الموسم الثاني بينما لم يكن هذا التأثير مؤكدا على باقي صفات النمو . كما أظهرت الأصناف تأثيرا معنويا على معظم مكونات المحصول فيما عدا نسبة العقد في موسم الزراعة وقد احتل الصنف جيزة 22 المركز الأول حيث أعطى أعلى القيم لمعظم مكونات المحصول . وقد أظهرت الأصناف تأثيرا معنويا على محصول البذور / هكتار حيث أعطى الصنف جيزة 21 أعلى محصول متفوقا في ذلك على الصنفين الآخرين بنسبة 64 % و 151 % في الموسم الأول و 26 % و 128 % في الموسم الثاني . وقد تأثر معامل الانكسار معنويا بالتغير في الأصناف في الموسم الأول فقط .
2- أعطت الزراعة في 15 مايو أعلى القيم لمعظم من صفات النمو وكل مكونات المحصول ومحصول البذور / هكتار في موسم الزراعة وقد بلغ محصول البذور 0.88 و 1.94 و 2.94 طن / هكتار في الموسم الأول و 0.43 و 1.69 و 2.12 طن / هكتار في الموسم الثاني عند الزراعة في 15 مارس و 15 ابريل و 15 مايو على الترتيب . وعلى العكس من ذلك لم يظهر التغير في مواعيد الزراعة تأثيرا معنويا على الخصائص الكيميائية للبذور .
3- أظهر التفاعل بين عامل الزراعة تأثيرا معنويا على كل من محتوى البذور من الزيت (في الموسم الأول) والوزن الحاف للأوراق ونسبة وزن الأوراق الجاف الى الوزن الكلي / نبات (في الموسم الثاني) ووزن البذرة في موسم الزراعة .

المقدمة INTRODUCTION

في عصرنا الراهن يعتبر فول الصويا محصولا هاما وحلا ناجحا لنا يعانيه العالم من نمو كبير في مصادر البروتين والدهن ويستدل على ذلك بزيادة المساحة المنزرعة به عالميا حيث بلغت في عام 2000 حوالي 79.4 مليون هكتار انتجت 79.9 مليون طن (F A O , 2000) . ويرجع سبب ذلك الى الأهمية الكبيرة بفوائده العديدة والتي منها على سبيل الذكر احتواء بذوره على نسبة عالية من البروتينات (34 - 45 %) والزيت بنسبة 15 - 27 % إضافة الى الكثير من المعادن كالفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات (A , B , C , D , E) ، كما وتعتبر الأحماض الأمينية المكونة لبروتينه ضرورية للإنسان . وتدخل زيوت فول الصويا في العديد من الصناعات ، كما يحضر من بروتينه لحما صناعيا يستعمل في صناعة الجبن والمرتبلا ، كما يخلط دقيق الصويا بدقيق القمح لدعم الخبز بالبروتينات وتحسين مواصفات الخبز . كما يعتبر فول الصويا من المحاصيل المحسنة للتربة وقليلة التطلب للعناصر الغذائية حيث اشار Nimeh (2002) بأن زراعة هكتار واحد من فول الصويا تغني التربة بمقدار 6 طن من الجذور و 1374 كجم من العقد البكتيرية التي تم تربية بالأزوت العضوي .

وتستورد الجماهيرية العظمى أكثر من 20 ألف طن سنويا لاستخدامها في صناعة اعلاف الدواجن المركزة وفي اغراض اخرى (الشركة العامة للمطاحن 2000) ومن ثم هناك محاولات عديدة لإدخال محصول فول الصويا ضمن التراكيب المحصولية في الجماهيرية ، وحيث يتأثر محصول فول الصويا بالعديد من العوامل الزراعية مثل زراعة الأصناف العالية الانتاجية في المواعيد المناسبة حيث تبين ذلك من الدراسة التي اجراها العنيت من الباحثين (Tuncer and Moor et al. ,1991 ; Nagy,1990 ; Arioglu,1991 ; Padilla et al. , 1992 ; Hartwig, 1993 ; Hallmark et al. , 1998 ; Q-Dell et al. ,2000 ; Asim et al. , 2004 ; Schoffel et al. , 2003 ; Khan et al. , 2003) كما تبين من الدراسات التي اجراها كل من Sojka وآخرون ان الاصناف (1989) و Zhang and Wang (1999) و Taira وآخرون (2004) وجود اختلافات في محتوى البذور من الزيت والبروتين نتيجة للتغير في مواعيد الزراعة ، كما وجد Asim وآخرون (2003) و Barros وآخرون (1997) و Kenig وآخرون (2003) و Shafshak وآخرون (2003) ان الاصناف قد اختلفت فيما بينها من حيث كمية محصول البذور ومكوناته .

أهمية البحث وأهدافه :

لا يزال الكثير من الغموض يكتنف زراعة هذا المحصول الهام وخاصة فيما يتعلق باختيار الأصناف ومعرفة أفضل ميعاد لزراعتها كذلك يمتلك هذا البحث أهمية كبيرة من الناحية التطبيقية لذلك كان الهدف الرئيسي للبحث هو دراسة تأثير مواعيد الزراعة على نمو محصول وجوده بعض أصناف فول الصويا تحت ظروف منطقة الوسيطة بالجبل الأخضر بليبيا .

المواد وطرق البحث MATERIALS AND METHODS

أجريت تجربتان حقليتان بمزرعة قندفورة بمنطقة الوسيطة بالجبل الأخضر - الجماهيرية العظمى حيث كانت التربة طينية سلتية (جدول 1) وذلك في عامي 2004 ، 2005 لدراسة تأثير 3 مواعيد للزراعة (15 مارس و 15 ابريل و 15 مايو) على نمو ومحصول وجوده 3 أصناف من فول الصويا التابعة لمجموعة النضج IV وهي (جيزة 22 وجيزة 21 وجيزة 111) التي تم استجلابها من مركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية وقد استخدم تصميم القطاعات الكاملة العشوائية لعاملي 3 X 3 في 4قطاعات وبلغت مساحة القطعة التجريبية 9.6 م²

جدول (1) متوسط الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة موسمي 2004 ، 2005

الخاصية	2004	2005
توزيع حجم الحبيبات		
حصى	1.1	1.76
رمل	8.64	8.51
سنت	39.09	38.06
طين	45.11	47.05
القوام	طينية سلتية	طينية سلتية
الخواص الكيميائية		
المادة العضوية %	3.06	3.01
كربونات الكالسيوم	1.37	1.23
التوصيل الكهربى (ملليموز / سم) على 25 م°	1.38	1.3
درجة الحموضة	7.12	7.24
النيتروجين الكلى (جزء / مليون) *	2155	2180
الفوسفور المتيسر (جزء / مليون) **	11.25	10
البوتاسيوم المتيسر (جزء / مليون) +	268.75	268.5

* = N according to Jacson (1958) ,
+ = K according to Pipper (1950) ,

** = P according to Olsen et al. (1954) .

تمت زراعة البنور بمعدل 50 كجم / هكتار في القطع التجريبية التي احتوت كل منها على 4 خطوط بطول 4 م ومسافة 60 سم بين الخطوط و 20 سم بين الجور . وسمنت المعاملات عند الزراعة بمعدل 60 كجم / هكتار من سماد فوسفات ثنائي الامونيوم (46 : 18) وأجريت عملية الخف على نباتين في الجورة بعد 21 يوم من الزراعة ، كما أضيف 40 كجم أزوت / هكتار على دفعتين الأولى بعد الخف والثانية بعد أسبوعين من الأولى .
الصفات والخصائص المدروسة :

- أولا :- خصائص النمو : قدرت من عينة مكونة من 5 نباتات أخذت عشوائيا من كل قطعة تجريبية
- 1- الوزن الجاف للنبات (جم)
 - 2- الوزن الجاف للأوراق (جم)
 - 3- نسبة الأوراق للوزن الكلي (L . W . R) من المعادلة
متوسط الوزن الجاف للأوراق / نبات

متوسط الوزن الجاف للنبات

- 4- ارتفاع النبات عن سطح التربة عند الحصاد (سم)
- 5- عدد السلاميات / نبات
- 6- طول السلامة : (سم)
- 7- عدد العقد نباتات

ثانيا : الخصائص المحصولية :

- 1- عدد الأزهار / نبات
- 2- نسبة العقد (%) وحسبت بقسمة عدد القرون / نبات على عدد الأزهار / نبات .
- 3- وزن القرون / نبات .
- 4- وزن البنور / نبات .
- 5- وزن 100 بذرة (جم)
- 6- محصول البنور (طن/هكتار) حيث قدر من الخططين الوسطيين من كل قطعة تجريبية تم عمل للطن/هكتار

ثالثا الخصائص الكيميائية للبنور :

- 1- محتوى البنور من الزيت
- 2- معامل الانكسار Refractive Index
- 3- رقم الحموضة
- 4- رقم التصبن
- 5- الرقم اليودي
- 6- محتوى البنور من البروتين
- 7- محتوى البنور من حامض اللينين

وقد قدرت الخصائص الستة الأولى طبقا لـ (A . O . A . C , 1997) ، بينما قدرت الصفة السابعة في عينة من البروتين مقدارها 10 ملجم تم تجهيزها طبقا لطريقة Moore and Stein (1958) وذلك باستخدام جهاز Amino acid analyzer .
التحليل الاحصالي :-

أجرى التحليل الاحصالي باستخدام برنامج (SAS . 1994) واعتمد في تقييم معنوية النتائج طريقة اقل فرق معنوي (L . S . D) عند مستوى معنوية 5 % (Steel and Torrie , 1960) .

النتائج والمناقشة RESULTS AND DISCUSSION

أولا : تأثير الأصناف على خصائص النمو

يتضح من النتائج المدونة بالجدول رقم (2) ان الأصناف قد اظهرت تأثيرا معنويا على كل من وزن الأوراق الجاف في الموسم الأول وارتفاع النبات في الموسم الثاني بينما لم يكن هذا التأثير مؤكدا على باقي الصفات . وقد اظهر الصنف جيزة 111 تفوقا على الصنفين الآخرين جيزة 22 وجيزة 21 في كل من الوزن الجاف / نبات ونسبة الأوراق الى الوزن الكلي وارتفاع النبات في حين تفوق الصنف جيزة 21 في صفتي عدد السلاميات وعدد العقد / نبات وذلك في الموسم الثاني . كما تفوق نفس الصنف في كل من وزن الأوراق الجاف والوزن الجاف / نبات في الموسم الأول . هذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه Kenig وآخرون (1993) حيث وجدوا ان التغير في كمية المادة الجافة اثناء نمو فول الصويا كان راجعا الى التغير في الأصناف المزروعة او الظروف الجوية ، كما اشار Barros وآخرون (2003) .
الى ان الأصناف قد اختلفت فيما بينها من حيث النمو الخضري خاصة ارتفاع النبات

جدول (2): تأثير الأصناف على بعض خصائص النمو في موسمي الزراعة 2004 و 2005م

صفات	الموسم الزراعي 2004				الموسم الزراعي 2005			
	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 21	جيزة 111	L.S.D _{0.5}	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 111
وزن الأوراق الجاف (جم)	0.38	0.54	0.31	0.16	NS	2.99	2.67	3.18
وزن النبات الجاف (جم)	0.49	0.69	0.53	NS	NS	7.22	6.49	7.16
نسبة الأوراق للوزن الكلي (%) LWR	74.33	69.67	61.79	NS	NS	48.47	44.73	42.98
ارتفاع النبات (سم)	52.08	44.51	52.54	NS	8.68	69.68	56.97	57.53
عدد السلاميات / نبات	16.30	15.75	18.51	NS	NS	16.38	17.04	15.99
طول السلاميات (سم)	4.06	5.94	4.17	NS	NS	4.26	3.34	3.67
عدد العقد / نبات	16.97	21.82	17.42	NS	NS	17.73	18.04	17.05

ثانيا : تأثير الأصناف على المحصول ومكوناته :

يبين الجدول رقم (3) ان الأصناف قد أظهرت تأثيرا معنويا على معظم مكونات المحصول فيما عدا نسبة العقد في موسمي الزراعة. وقد اعطى الصنف جيزة 21 أقل البذور في موسمي الزراعة حيث بلغ وزن الـ 100 بذرة 15.94 و 24.47 جم في موسمي الزراعة على الترتيب. كما احتل الصنف جيزة 22 المركز الاول حيث أعطى أعلى القيم في معظم الصفات في موسمي الزراعة عدا وزن القسرون في الموسم الأول ونسبة العقد في الموسم الثاني ووزن الـ 100 بذرة الذي تفوق فيه الصنف جيزة 21. اما من حيث محصول البذور الناتج من وحدة المساحة فقد اظهرت الأصناف تأثير معنويا عليه حيث أعطى الصنف جيزة 21 أعلى محصول 2.67 و 2.15 طن / هكتار في موسمي الزراعة على الترتيب وكانت الزيادة عن محصول الصنفين جيزة 22 وجيزة 111 بنسبة 64 % و 151 % في الموسم الأول و 26 % و 128 % في الموسم الثاني على الترتيب. وهذا يتفق مع النتائج التي توصل إليها كل من وجد Asim واخرون (2003) Barros واخرون (2003) Kenig واخرون (2003) و Schoffel واخرون (2003) حيث أشاروا إلى ان الأصناف قد اختلفت فيما بينها من حيث المحصول ومكوناته .

جدول (3): تأثير الأصناف على المحصول ومكوناته في موسمي الزراعة 2004 و 2005 م

صفات	الموسم الزراعي 2004				الموسم الزراعي 2005			
	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 111	L.S.D _{0.5}	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 111	
عدد الأزهار / نبات	191.27	192.76	112.78	75.79	27.54	91.98	120.49	
عدد القرون / نبات	160.98	160.62	94.97	62.69	22.09	77.37	100.20	
نسبة العقد (%)	84.16	83.30	84.12	NS	NS	84.12	83.16	
وزن القرون / نبات (جم)	90.64	101.58	79.33	20.67	17.98	56.48	79.79	
وزن البذور / نبات (جم)	68.30	64.60	50.07	16.34	12.78	34.79	53.13	
وزن الـ 100 بذرة (جم)	14.06	15.94	14.17	1.64	1.07	22.88	24.47	
محصول البذور (طن / هكتار)	1.68	2.77	1.10	0.34	0.39	0.94	2.15	

ثالثا: تأثير الأصناف على الخصائص الكيميائية للبذور :

أظهرت الأصناف تأثير معنويا على صفة معامل الانتكاس في الموسم الأول فقط ، بينما كان التأثير غير مؤكدا على باقي الخصائص الكيميائية للبذور في موسمي الزراعة (جدول 4) . وبأخذ متوسط الموسمين تبين ان نسبة الزيت في البذور تراوحت بين 19.2 % (الصنف جيزة 22) - 20.0 % (الصنف جيزة 111) ونسبة البروتين بين 30.5 % (الصنف جيزة 22) - 30.9 % (الصنف جيزة 21) وهذه النتائج تتفق مع ما تحصل عليه Zhang and Wang (1991) و Taira واخرون (2004) من ان الأصناف قد اختلفت فيما بينها من حيث محتوى البذور من كل من البروتين والزيت .

جدول (4): تأثير الأصناف على الخصائص الكيميائية للبذور في موسمي الزراعة 2004 و 2005 م

صفات	الموسم الزراعي 2004				الموسم الزراعي 2005			
	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 111	L.S.D _{0.5}	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 111	
نسبة الزيت (%)	17.97	17.31	17.78	NS	NS	22.18	21.16	
رقم الحموضة	0.429	0.492	0.488	NS	NS	0.463	0.452	
رقم التصين	189.77	187.95	187.83	NS	NS	188.24	188.37	
الرقم البودي	133.33	144.04	142.66	NS	NS	143.69	144.49	
معامل الانتكاس	1.467	1.447	1.453	0.017	NS	1.408	1.408	
نسبة البروتين (%)	30.13	30.32	30.31	NS	NS	31.13	31.48	
نسبة حامض الليسين (%)	2.38	2.37	2.30	NS	NS	2.44	2.55	

رابعاً: تأثير مواعيد الزراعة على خصائص النمو :-

أظهر الجدول رقم (5) ان التغيير في مواعيد الزراعة قد أدى إلى وجود اختلافات معنوية في كل الصفات المدروسة في موسمي الزراعة فيما عدا نسبة الأوراق إلى الوزن الكلي في الموسم الأول وعدد السلاميات والعقد / نبات في الموسم الثاني . وبصفة عامة أعطت الزراعة في 15 مايو أعلى القيم لجميع الصفات في موسمي الزراعة فيما عدا نسبة الأوراق إلى الوزن الكلي وعدد العقد / نبات في موسمي الزراعة والموسم الأول على الترتيب . وقد أشار كل من Padilla واخرون (1992) و Khan واخرون (2004) إلى ان الزراعة خلال شهر مايو قد أدت إلى الحصول على أطول النباتات .

جدول (5): تأثير مواعيد الزراعة على خصائص النمو في موسمي الزراعة 2004 و2005 م

الصفات	الموسم الزراعي 2004					الموسم الزراعي 2005				
	L.S.D _{0.5}	5 / 15	4 / 15	3 / 15	15 / 15	L.S.D _{0.5}	5 / 15	4 / 15	3 / 15	15 / 15
وزن الأوراق الجاف (جم)	0.16	0.57	0.24	0.42	0.95	6.04	2.23	0.57	0.16	0.95
وزن النبات الجاف (جم)	0.30	0.62	0.36	0.37	3.42	14.97	4.85	1.05	0.30	3.42
نسبة الأوراق للوزن الكلي (%) LWR	NS	71.58	73.38	60.83	8.69	42.56	38.39	55.23	NS	8.69
ارتفاع النبات (سم)	11.78	69.84	57.48	21.83	8.68	70.14	61.47	52.58	11.78	8.68
عدد السلاميات نبات	2.91	20.93	19.70	9.94	NS	16.98	16.50	15.93	2.91	NS
طول السلاميات (سم)	0.76	3.10	3.01	2.21	0.41	4.14	3.74	3.40	0.76	0.41
عدد العقد / نبات	20.65	24.66	10.90		NS	18.33	17.55	16.94	20.65	NS

خامساً : تأثير مواعيد الزراعة على المحصول ومكوناته

يتضح من النتائج المدونة في جدول رقم (6) ان التغيير في مواعيد الزراعة قد أدى إلى وجود اختلافات معنوية على كل من المحصول ومكوناته عدا نسبة العقد وذلك في موسمي الزراعة . وقد أعطت الزراعة في 15 مايو أعلى القيم المتحصل عليها من جميع مكونات المحصول ، كما أعطت الزراعة في نفس الموعد أعلى محصول من البذور مقارنة بالزراعة في المواعدين الآخرين حيث تفوق بنسبة 234 % و 151 % في الموسم الأول و 116 % و 25 % في الموسم الثاني مقارنة بالزراعة في كل من 15 مارس و 15 أبريل على الترتيب حيث كان المحصول الناتج من الزراعة في 15 مارس و 15 أبريل و 15 مايو 0.88 و 1.94 و 2.94 طن / هكتار في الموسم الأول و 0.34 و 1.69 و 2.12 طن / هكتار في الموسم الثاني . وهذه النتائج تتفق مع ماتوصل اليه Nagy (1990) و Tuncer and Arioglu (1991) و Hartwig (1993) و Kane واخرون (1997) و Hallmark واخرون (1998) و Q-Dell واخرون (2000) حيث اشاروا إلى ان افضل ميعاد لزراعة فول الصويا هو خلال شهر مايو . وعلى العكس من ذلك اشار Moore واخرون (1991) انه لا يوجد اختلاف في محصول البذور عند الزراعة في كل من 18 أبريل و 23 مايو .

جدول (6): تأثير مواعيد الزراعة على المحصول ومكوناته في موسمي الزراعة 2004 و2005 م

الصفات	الموسم الزراعي 2004					الموسم الزراعي 2005				
	L.S.D _{0.5}	5 / 15	4 / 15	3 / 15	15 / 15	L.S.D _{0.5}	5 / 15	4 / 15	3 / 15	15 / 15
عدد الأزهار / نبات	75.79	274.77	224.18	47.87	27.54	182.72	84.83	77.18	75.79	27.54
عدد القرون / نبات	62.69	122.98	189.66	39.89	22.09	152.27	71.35	64.48	62.69	22.09
نسبة العقد (%)	NS	83.65	84.60	83.33	NS	83.34	84.11	83.55	NS	NS
وزن القرون / نبات (جم)	20.67	131.23	114.79	25.53	17.98	119.53	50.09	49.02	20.67	17.98
وزن البذور / نبات (جم)	16.34	91.28	74.59	17.10	12.78	78.19	33.17	31.78	16.34	12.78
وزن البذور 100 بذرة (جم)	1.64	15.68	15.30	13.18	1.07	23.39	20.72	23.18	1.64	1.07
محصول البذور (طن / هكتار)	0.43	2.94	1.94	0.88	0.39	2.12	1.69	0.98	0.43	0.39

سادساً: تأثير مواعيد الزراعة على الخصائص الكيميائية للبذور

يبين الجدول (7) ان التغيير في مواعيد الزراعة لم يظهر أي تأثير معنوي على كل من خصائص البذور الكيميائية المدروسة في موسمي الزراعة . وهذا يتفق مع كل من Sojka واخرون (1989) و Shafshak واخرون (1997) و Zhang and Wang (1999) حيث وجدوا اختلافات طفيفة في محتوى البذور في كل من الزيت والبروتين نتيجة للتغير في مواعيد الزراعة .

جدول (7): تأثير مواعيد الزراعة على الخصائص الكيميائية للبيذور خلال موسمي الزراعة 2004 و 2005 م

الصفات	الموسم الزراعي 2004			الموسم الزراعي 2005				
	L.S.D _{0.5}	5 / 15	4 / 15	3 / 15	L.S.D _{0.5}	5 / 15	4 / 15	3 / 15
نسبة الزيت (%)	NS	17.31	18.17	17.58	NS	21.51	21.38	21.83
رقم الحموضة	NS	0.463	0.502	0.53	NS	0.453	0.451	0.469
رقم التصين	NS	188.73	188.53	188.29	NS	188.35	188.13	188.43
الرقم اليودي	NS	144.43	132.72	142.87	NS	143.87	144.38	144.64
معامل الانكسار	NS	1.450	1.456	1.461	NS	1.390	1.415	1.446
نسبة البروتين (%)	NS	30.04	30.36	30.36	NS	31.15	31.45	31.03
نسبة حامض الليسين (%)	NS	2.43	2.31	2.30	NS	2.56	2.52	2.48

سابعاً : تأثير التفاعل بين مواعيد الزراعة والأصناف

يبين الجدول (8) ان التفاعل بين عاملي الدراسة قد اظهر تأثيراً معنوياً على بعض الصفات التي تم دراستها وهي محتوى البذور من الزيت في الموسم الأول وكل من الوزن الجاف للأوراق والنسبة بين وزن الأوراق الجاف للوزن الكلي / نبات في الموسم الثاني ووزن البذرة في موسمي الزراعة حيث تبين ان اقل البذور كان ناتجاً عن زراعة الصنف جيزة 21 في اى من 15 ابريل او 15 مايو . ومن النتائج التي امكن الحصول عليها من هذه الدراسة يمكن القول انه يمكن الحصول على اعلى محصول من البذور بزراعة الصنف جيزة 21 كما ان النسب موعد لزراعة هذا المحصول بهذه المنطقة هو 15 مايو.

جدول (8): الصفات التي تأثرت بالتفاعل بين الأصناف ومواعيد الزراعة خلال موسمي الزراعة 2004 و 2005 م

الصفات	3 / 15			4 / 15			5 / 15		
	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 111	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 111	جيزة 22	جيزة 21	جيزة 111
الوزن الجاف للأوراق (جم) 2005	0.49	0.46	0.76	0.35	2.93	3.40	8.70	4.63	0.76
نسبة الأوراق للوزن الكلي (%) 2004	61.73	50.58	53.38	21.23	40.43	53.53	45.98	43.20	53.38
وزن البذرة (جم) 2004	12.75	14.18	12.63	13.88	15.10	16.93	15.55	18.55	12.63
2005	20.90	25.33	23.33	18.90	28.60	19.65	20.05	19.48	23.33
نسبة الزيت (%) 2004	17.94	16.37	18.38	16.95	18.89	18.89	18.98	16.89	18.38

المراجع REFERENCES

- A.O.A.C. (1997). Association of official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis 16 th Ed. , Washington D. C. U. S. A. , II , Chapter 41 .
- Asim, Muhammad and Paigham. (2003). Comparative yield and yield components of land races and improved varieties of soybean. Sarhad Journal of Agriculture, 19(4): 459-461.
- Barros, H.B. ; Peluzio,J.M. ; Santos,M.M.dos; Brito,E.L. and Almeida,R.D. (2003) . Effect of the sowing season on the behavior of soybean cultivars, in Southern Tocantins. Revista Ceres, 50(291): 565-572.
- F A O (2002). Food and Agriculture Organization . Production Yearbook, Vol.56.
- Hallmark,W.B. ; Brown,L.F. and Paxton, K.W. (1999) . Planting dates for early maturing soybeans in South Louisiana's sugarcane fields . Louisiana Agriculture, 41 (3) : 19-20.
- Hartwig,E.E. (1993). Registration of 'Vernal' soybean.Crop Science, 33 (5):1101p.

- Jakson ,M.L.(1958). Soil chemical analysis . prentice Hall . Inc .Englewood . Cliffs , N. J.
- Khan, A.Z. ; Shah, P ; Khalil, S.K . and Fazli-Karim (2004). Influence of planting date and plant density on morphological traits of determinate and indeterminate soybean cultivars under temperate environment. *Sarhad Journal of Agriculture*, 20 (2) 191-198.
- Kenig,A. ; Mishoe, J.W. ; Boote, K.J. ; Cook,P.W.: Reicosky,D.C ; Pettigrew,W.T. and Hodges,H.F. (1993). Development of soybean fresh and dry weight relationships for real time model calibration. *Agronomy Journal*, 85 (1):140-146.
- Moore, S.H. ; Hartwing, E.E. and Robertson,C.A. (1991). Increasing soybean yeilds at early and late planting dates by delayed flowering. *Louisiana Agricultural*, 34 (3): 4-5.
- Nagy,B. (1990). Evaluating the ecological sensitivity of soyabean cultivars in sowing date trials. *Novenytermeles*, 4: 495-502.
- Nimeh , M.Z. (2002) Evalution of the productivity of soybean (CV.Asgrow A – 3803) under nitrogen fertilizer andbacterialinocoultion . *Recent Technologies in Agric.*, vol. 4 : 1071 – 1084 .
- Olsen , G.R ; Cole , O.V . ; Waston , F . S . and Dean , L .A . (1954) . Esstimation of available in soil by extraction with Na₃ . M . S Dept . Agric . Cire . 939 .
- Padilla-Valenzuela, I. ; Montoya- Coronado,L. and Castillo-Torres,N. (1992) . Yield and agronomic characteristics of soybean sown on three dates in the Yaqui Valley , Sonora . *Revista Fitotecnnia Mexicana.*, 15 (2) :125-133 .
- Piper , C . S . (1950). Soil and Analysis . The university of Adelaide (U S A) .
- Ó-Dell, A. ; Scarisbrick,D.H. and Akbari,G.H.A. (2000).. The effect of sowing date on vegetative development and flowering of Belarussian soybean in the UK. *Annals of Applied Biology*, 136 (3) :259-265.
- SAS(1994) . SAS user Guide Statistics , 6 th ed . Cary , NE:SAS Institute Inc.
- Schoffel, E.R. ;Volpe,C.A. ; Athayde,M.L.F.and Pavani,L.C. (2003). Stability of yield components of soybean cultivars as a function of sowing date and irrigation. *Cientifica Jaboticabal*, 31(2): 167-178.
- Shafshak,S.E. ; EL-Din,G.M.S. ;Hassan,M.Z. and Mohamed,M.S.A. (1997) . Evaluation of six soybean geno types under different population densities and sowing dates . *Annals of Agricultural Science* . 35 (1) : 115-130.
- Sojka,R.E. ;Anold,F.B Morrison,W.H.and Busscher,W.J. (1989). Effect of early and late planting on sunflower performance in the southeastern United States. *Applied Agricultural Research*, 1, 37-46.
- Steel,R .G .D. and Torrie, J.H.Z. (1960). Principoles and procedures of statistics. MC Graw-Hill Book Company ,Inc . U . S . A .
- Taira, H. ; Nakamura,S. ; Isoya,N. and Kawazu,M. (2004). Effect of drained paddy field and late-seeding time culture on dietary fiber, protein, and oil contents of soybeans. *Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi- Journal of Japanese Society for Food Science and Technoloty*, 51(1): 38-46.

- Tuncer, S. and Arioglu, H. H. (1991). Factors determining seed yield and important plant characteristics of some soybean cultivars belonging to different maturity groups at different sowing dates. *Doga, Turk Tarim Ve Ormancilik Dergisi*, 15 (4): 987-998.
- Zhang, G. and Wang, J. (1991). Effect of planting date on amino acid composition of soybean seeds. *Soybean Genet News 1 U-S-Dep-Agric-Agric-Res-Serv. Ames, Iowa: The service. Apr.18: 96-98.*

EFFECT OF PLANTING DATES ON GROWTH , YIELD AND QUALITY OF SOME SOYBEAN CULTIVARS AT AL - GABAL AL - AKHADAR AREA – LIBYA

Husein, T. F.; G. A. Darweish and M. M. Rattiba

Dept. of Agronomy, Fac. of Agric., Univ. of Omar AL–Mukhtar, Libya

ABSTRACT

Two field experiments were carried out during the growing season 2004 and 2005 to study the effect of three planting dates. (15 March, 15 April and 15 May) on growth, yield and quality of some soybean varieties (Giza 22, Giza 21 and Giza 111) under Al-Gabal Al-Akhadar, Libya. Main results could be summarized as follows:

- 1- Soybean varieties had a significant effect on leaves dry weight in the first season and plant height in the second one. On the contrary, it had insignificant effect on other growth traits. Moreover, varieties had a significant effect on most of yield component except setting % in both seasons. Giza 22 variety surpassed other two varieties concerning the most of yield components. However, Giza 21 variety outyielded. Giza 22, and Giza 111 by 64%, 151% in the first season and 26%, 128% in the second one. Therefore, varieties had a significant effect on refractive index in the first season.
- 2- Planting in 15 May produced the highest values for most growth traits and all yield components as well as seed yield/ ha in both seasons. Seed yield /ha was 0.88, 1.94 and 2.94 t/ha in the first season and 0.43, 1.69 and 2.21 t/ha in the second one for the 1st, 2nd and 3rd planting date, respectively.
- 3- Planting date X varieties interaction had a significant effect on seed oil content (in the first season), leaves dry weight and LWR (in the second season) and 100-seed weight in both seasons.