

EFFECT OF VARYING DEPTH OF WATER COLUMN IN CONCRETE HATCHING PONDS ON PRODUCTIVITY OF NILE TILAPIA BROOD STOCK.

Salem, M. F. I.¹; A. I. M. Mehrim² and M. Z. Baromh³

1- Central Laboratory of Fish Research, Abbasa-Sakha Unit of Fish research, Kafr El- Sheikh.

2- Animal Production Department, Fac. Agric., Mansoura Univ.

3- Moasaset El-Shraky, Tolombat-7, Kafr El- Sheikh.

تأثير الاختلاف فى عمق عمود المياه فى أحواض التفريخ الخرسانية على إنتاجية الأمهات من البلطى النيلي

- محمود فؤاد إسماعيل سالم^١ ، أحمد إسماعيل محمد محرم^٢ و محمد زغلول بارومه^٣
- ١- عمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة شرقية- وحدة بحوث الثروة السمكية بسخا
 - ٢- قسم إنتاج الحيوان بكلية الزراعة ، جامعة المنصورة
 - ٣- مؤسسة الشراكى بظلمبات-٧ ، كفر الشيخ

ملخص

فى محاولة لتحسين إنتاجية مفرخات البلطى النيلي تم المقارنة بين عمقين لعمود المياه فى أحواض التفريخ الخرسانية وهما ٧١ سم (المعتاد) و ٩٥ سم (المقترح للمقارنة) . أدت زيادة عمق عمود المياه إلى زيادة معنوية فى عدد الزريعة الناتجة عمر يوم وفى أوزان الزريعة عمر يوم وعمر ٢١ يوماً ، كما أدت إلى انخفاض تكلفة إنتاج كل ألف زريعة وزيادة فى العائد من بيع الإنتاج بمعدل ٢٥٠ جنيهاً مصرياً للحوض الواحد فى ٣٦ يوماً ، وعليه ينصح بزيادة عمق عمود الماء فى أحواض التفريخ الخرسانية للبلطى النيلي إلى ٩٥ سم بدلاً من ٧١ سم.

المقدمة

من الملاحظ أنه فى الآونة الأخيرة قد انتشر إنشاء المفرخات السمكية انتشاراً ملحوظاً، وهذا لما تحققة هذه المفرخات و الإنتاج السمكى من أرباح، حيث تشير المؤشرات عام ٢٠٠٠م أن كل ٧٧ جنيهاً منصرف مستلزمات إنتاج تحقق ١٠٠٠ جنية من قيمة الإنتاج السمكى (أى أن كل ٨٣ جنيهاً منصرف مستلزمات إنتاج تحقق ١٠٠٠ جنية من صافى الدخل السمكى، متميزاً عن الإنتاج الحيوانى حيث أن كل ٥٧٧ جنية مصرى مستلزمات إنتاج تحقق ١٠٠٠ جنيهاً من قيمة الإنتاج الحيوانى (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - ٢٠٠٢م). وبما أنه فى عام ٢٠٠١م امتلكت محافظة كفر الشيخ مزارع أهلية مساحتها ١٦٠٠٠ فداناً ملك و ٣٢٠٠ فداناً إيجار و ٤٢٠٠ فداناً مزارع أهلية مؤقتة مقابل ٣ مزارع (٣٠٠٠ فدان) حكومية و ٦٠ مفرخاً ومركزاً لتجميع الزريعة ، وأنتجت محافظة كفر الشيخ ٦٧٠١٧ طن سمك من المصايد الطبيعية و ١٥٦٨٣٢ طن من الاستزراع السمكى (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - ٢٠٠٢م) ، وتشكل الأسماك ٤٩% من جملة أنشطة الاستزراع المائى بينما الباقى (٥١%) استزراع نباتات مائية ومحاريات وقشريات (Becker and Focken, 1998).

ونظراً إلى أنه فى المستقبل القريب جدا سيصبح الاستزراع السمكى مصدراً أكثر أهمية من المصايد السمكية ، لذا يسعى الانسان للتكامل بين الزراعة المائية والزراعة النباتية والحيوانية والأمن الغذائى للتعرف على المخاطر والتحكم فيها ، لأن أمان الاستهلاك الأدمى من الاستزراع المائى سيكون ذو أهمية للصحة العامة ، اذ ستحل المزارع محل الصيد البحرى (Anon, 1999) ، لذلك يجب العمل على توفير الزريعة اللازمة للاستزراع من ناحية عددها وجودتها. بالإضافة إلى أن الاستزراع المائى للأسماك كان يشكل ٣٠% من الإنتاج العالمى عام ١٩٩٦م ، والوضع المحلى أعجب إذ زاد الاستزراع السمكى باضطراد من ٣٦% عام ١٩٩٤م إلى ٤٧% من إنتاج مصر السمكى عام ٢٠٠٠م (عيد الحميد محمد ٢٠٠٢م) و ٤٤% من إنتاج مصر السمكى عام ٢٠٠١م (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ٢٠٠٢م) ، و يدفعنا هذا إلى الاهتمام بالإبداع فى عمل المفرخات السمكية وذلك لتوفير الزريعة المناسبة. ونظراً إلى ما نشرته المنظمة العربية

للتتمية الزراعية (١٩٩٩م) عن معوقات الاستزراع السمكي في الوطن العربي ، وكان من أهم هذه المعوقات هو عجز المصادر الطبيعية والمفرخات عن سد الاحتياجات المتزايدة للزريعة ، لذا يجب التقدم في تصميم وتكنيك العمل بالمفرخات وذلك للحصول على حل لمشكلة عدم توافر الأعداد الكافية من الزريعة المناسبة.

إن سمكة البلطي لها القدرة على التناسل بيسر وسهولة (El-Sayed and Teshima, 1991) ، ونظرا الى أنها سمكة جيدة التسويق فهي الأكثر اقتصاديا في مصر (حلمى ميخائيل ، مجدى توفيق ١٩٩٧م) ، وينتج منها اسماك وحيدة الجنس ذكور وذلك بالتجنيس اليدوى أو بالتهجين (Shiau, 2002) ، لذلك كان العمل في هذا البحث على هذه السمكة المتميزة. ونظرا لأهمية الأعلاف الطافية المحببة لدى الأسماك نتيجة للمزايا التي تتمتع بها ، لذا تم استخدامها كمصدر للتغذية في هذا البحث ، حيث يطفو العلف يمكن ملاحظة الأسماك أثناء تغذيتها ، وعند انتهاء استهلاك كل العلف (New, 1987) يتم التحقق من النسبة بينهما - وعموماً فالعلف الطافي (باليثق أو التمدد أى الناتج بضغط بخار منخفض أو ضغط بخار عالى - على الترتيب) أكثر استساغاه للسمك ، وإن كان عالى التكلفة ولكنه يسهل مراقبة الاسماك ورعايتها (Jauncey and Ross, 1982) ، فثبات العلف فى الماء أحد الخواص الطبيعية الهامة لأعلاف البلطي المحببة (NRC, 1993).

وحيث أن الاتجاهات الحالية تركز على إنشاء وتطوير المفرخات ، لذلك تم إجراء هذا البحث للتعرف على أحسن عمق للمياه فى أحواض التفريخ الخرسانية والذي يمكن أن يؤثر بالإيجاب فى زيادة الإنتاجية من حيث أعداد وأحجام وجودة الزريعة المنتجة ، لكى يمكن التخلص من مشكلة عدم توافر الزريعة وبأقل التكاليف الممكنة.

المواد والطرق

مكان وزمان إجراء البحث:

تم إجراء هذا البحث بالتعاون مع قسم إنتاج الحيوان- كلية الزراعة جامعة المنصورة ، وتم إجراءه بأحد المفرخات الخاصة بمؤسسة الشراكي للأسماك بمنطقة ظلمات-٧ ، محافظة كفر الشيخ ، خلال موسم تفريخ عام ٢٠٠٤م ، وبالتحديد خلال شهر يوليو.

وتتكون صوبة التفريخ من مجموعة من الأحواض الخرسانية وهى كالتالى:

(١) عدد ٦ أحواض خرسانية أبعاد كل حوض طول ٨ م × عرض ٣ م × ارتفاع ١م.

(٢) يزود كل حوض بفتحة للرى (٢بوصة) ذات حجم مساو لفتحة الصرف.

(٣) يزود كل حوض بسكارية من البلور (قطر الخرطوم ١سم) لامداد المياه فى الحوض بالأكسجين.

تقسيم أحواض التفريخ على المعاملات:

١- أحواض الكنترول (A) وهى أحواض خرسانية أرقام (٩ ، ١٠ ، ١١) ومنسوب المياه بها ٧١ سم .

٢- أحواض المعاملة (B) وهى أحواض خرسانية أرقام (١٢ ، ١٣ ، ١٤) ومنسوب المياه بها ٩٥ سم.

جدول (١): مكونات وتركيب العليقة

المكونات	الكمية %	البروتين %
١- مسحوق سمك (٧٢%)	٦	٤,٣٢
٢- مسحوق لحم (٥٥%)	٥	٢,٧٢
٣- كسب فول صويا (٤٤%)	٤٥	١٩,٨
٤- فول صويا ميثوقة (٣٨%)	١٨,٥	٧,٠٣
٥- ذرة صفراء (٨,٧%)	٨	٠,٦٩
٦- ردة	٦	٠,٧٢
٧- رجيع كون	٦	٠,٧٢
٨- كربونات كالسيوم	١,٥	-
٩- زيت عباد الشمس	٣	-
١٠- فوسفات كالسيوم	٠,٦	-
١١- مخلوط املاح معدنية وفيتامينات	٠,٤	-
المجموع	١٠٠	٣٦,٠٠

استخدم فى هذا البحث مجموعة من الأمهات ذات الأحجام المتقاربة ، وتحت ظروف بيئية متقاربة أيضاً ، ولكن الاختلاف فقط فى العامل محل الدراسة وهو استخدام عمقين من المياه (٧١ ، ٩٥سم) . وتم إضافة بعض الإضافات الغذائية للعلائق المستخدمة وذلك لدفع الأمهات وتنشيطها وحثها على الإسراع من

عمليات التزاوج والتفريخ. تم استخدام كل عمق من هذه الأعماق في ثلاثة مكررات (3 أحواض خرسانية) ، وفي نهاية التجربة تم أخذ أوزان وعدد الزريعة الناتجة من الأحواض (A) ، (B).

التغذية المقدمة أثناء فترة التزاوج:

قدمت العليقة المحتوية على نسبة بروتين (36%) للأمهات خلال الـ (8) أيام الأولى من التزاوج بمعدل (1,5% من وزن الجسم) نظرا لإقبال الأمهات على الغذاء في هذه الفترة، ثم يقل هذا المعدل نظرا لتحصين الأمهات للبيض بالفم ، فتقل هذه النسبة إلى أقل من ذلك ، العليقة طاقية إنتاج أغسطس 2004 (شركة جوبتريد - شركة مساهمة مصرية) ، رقم التشغيل 293 ، ومكوناتها موضحة بجدول (1). ولقد احتوى مخلوط الأملاح المعدنية والفيتامينات على أهم الإضافات المقدمة مع العلائق والمنشطة للمبايض والمزودة لحيوية الأمهات أثناء فترة التفريخ ، ومنها:

- 1- بيوتين ويضاف مع العلائق المقدمة بمعدل 1 جم/كجم ، حيث يقوم بتنشيط المبايض وحثها على النضج أثناء فترة التزاوج ، إنتاج شركة China Way العالمية بتايوان.
- 2- بيوجين ويضاف بمعدل 5 جم/كجم لعلائق الأمهات لزيادة المناعة والنمو ومقاومة الظروف البيئية المختلفة ، ويتركب من خلاصة الثوم والجنسنج وخلايا بكتيرية وإنزيمات شركة (China Way).
- 3- فيتامين ج (Inter Farm Stress) تركيز 20% يضاف بمعدل (3 جم/كجم)
- 4- فيتامينات ب/ك وتضاف بمعدل 3 جم/كجم (إنتاج شركة الوطنية).
- 5- مخلوط أملاح معدنية (اسكومكس) يضاف بمعدل 3 جم/كجم علف

خصائص المياه المستخدمة :

استخدمت بالأحواض مياه صرف من مصرف طرد طلبات نمرة 7 ، وكان يتم تغير مياه الأحواض من 10 صباحاً حتى 4 مساءً بمعدل من 9240 إلى 22800 لتر /اليوم للمعاملة ذات ارتفاع عمود المياه 95 سم ، وبمعدل من 9240 إلى 17040 لتر /يوم للمعاملة ذات ارتفاع عمود المياه 71 سم. وتم قياس جودة المياه من حيث درجة الحرارة باستخدام ترمومتر مئوى ، والملوحة باستخدام جهاز التوصيل الكهربائي (Model 470 Conductivity TDS Meter, Janway, England) وقياس الأس السالب لتريز أيون الأيدروجين (pH) باستخدام جهاز (Model 370 pH meter, Jenway, England) ، وقياس الأكسجين الذائب باستخدام جهاز (Model 970 Oxygen Meter, Janway,) (England).

جدول (2): نتائج تحليل المياه المستخدمة في تفريخ الاسماك لبعض العناصر (بالميكروجرام/مليتر) والمقدرة بطريقة الانبعاث الذرى من مصدر البلازما الحثية.

العنصر	كميته في مياه الصرف (بالميكروجرام/مليتر)
الفوسفور	0,406
الماغنسيوم	97,3
الكالسيوم	75,8
الصوديوم	459,5
البوتاسيوم	7,5
الزنك	0,063
الرصاص	-
الكاديوم	-
الحديد	2,04
الالمونيوم	1,63

وتم قياس صفات جودة المياه خلال فترة التفريخ وحتى يوم الكشف على الزريعة فى الصباح. نتائج قياسات جودة مياه أحواض التفريخ خلال 15 يوماً (7/3-7/17/2004م) كمتوسطات ± الخطأ القياسى هي 0,9±4,0 جزء / ألف ملوحة ، 7,93 ± 0,10 للأس السالب لتريز أيون الأيدروجين (pH) ، 29±0,09م درجة الحرارة ، 0,08±7,57 مجم/لتر أكسجين ذائب ، بينما تحليل العناصر المعدنية للمياه يوضحها جدول

رقم (٢). كان يتم تشغيل مضخة الهواء (٥ حصان-٣٠٠٠ لفة-٥٠ هرتز) طوال الـ ٢٤ ساعة لاجتثاث التهوية داخل الأحواض .

الأمهات المستخدمة :

تم استخدام أسماك البلطي النيلي ، حيث وضعت الأسماك بالأحواض الخرسانية المستخدمة بمعدل ١٥ سمكة ذكر : ٣٥ سمكة أنثى ، بمتوسط وزن الأسماك بالحوض الواحد حوالي ١٤,٩ كجم ، ومتوسط أوزان الأسماك الأمهات المستخدمة في التفريخ كان يتراوح بين ٤٧٠ و ٥١٠ جم / ذكر ، ٢٠٠-٢٤٠ جم / أنثى .

التحليل الاحصائي :

تم التحليل الاحصائي للنتائج المتحصل عليها باستخدام إجراءات النموذج الخطي العام (SAS, 1987).

النتائج

أولاً : أعداد الزريعة عمر يوم :

الجدول رقم (٣) يوضح كمية الزريعة المنتجة في كل من الأحواض ذات العمق ٧١ سم والعمق ٩٥ سم عند عمر يوم واحد.

جدول رقم (٣): أعداد الزريعة المنتجة عمر يوم واحد (متوسطات±الخطأ القياسي).

عمق مياه الحوض (سم)	زريعة صغيرة ^(١)	زريعة كبيرة ^(٢)	بيض ^(٣)	يرقات ^(٤)	بيض+يرقات ^(٥)
٧١	١٠٠,٠±٢١٠٠٠	١٤,٥±٢٢٦٧	٢٠,٨٢±٤٠٠٠	-	١٦,٦٧±١٦٦٧
٩٥	٥٧,٧±٢٦٠٠٠	٠,٤٤±٨٣	٢٦,٦٧±٢٦٦٧	٣,٠٠±٣٠٠٠	٣,٣٣±٣٣٣

أ ، ب متوسطات في نفس العمود عليها حروف مختلف تتباين معنوياً على مستوى ٠,٠٥ .

(١) زريعة صغيرة : وهي عبارة عن زريعة تنزل من فتحات فلتر الزريعة ١٤ / بوصة ، وهي زريعة مرغوبة من حيث الحجم ، وهي قابلة للمعاملة نظراً لصغر عمرها وحجمها.

(٢) زريعة كبيرة : وهي زريعة لا تنزل من فتحات الفلتر المستخدم ، وهي تعتبر زريعة مخالفة للخطة الإنتاجية للمفرخ نظراً لكبر حجمها على المعاملة.

(٣) البيض: وهو بيض مخصب ولكن لم يحدث به تطور وهو يعتبر غير مفيد ومرهق.

(٤) يرقات: وهو شكل اليرقة بكيس المح وهو أيضاً غير مرغوب عند الحصاد

(٥) بيض + يرقات : وهي بويضات ومعها كيس المح ، وهي مجهددة أيضاً وحساسة للظروف المحيطة وللتعامل معها.

والشكل المرغوب عند الحصاد والذي تم أخذه والتعامل معه بالمفرخ بصورة سليمة هو صورة الزريعة الصغيرة ، وهي الأكثر في العدد في العمق ٩٥ سم بالمقارنة بالعمق ٧١ سم.

ثانياً: متوسطات الأوزان للزريعة من عمر يوم واحد حتى ٢١ يوماً:

نظراً إلى أن رفع عمود المياه من ٧١ سم إلى ٩٥ سم بحوض التفريخ قد أعطى راحة للأمهات واتساع في مجال الحركة بما يخفف الضغط والإجهاد على الأمهات ، فقد أدى ذلك إلى زيادة في نمو الزريعة المنتجة من المعاملة ٩٥ سم (جدول رقم ٤).

جدول (٤): يوضح الاختلافات في متوسط أوزان الزريعة المنتجة في عمر يوم واحد وعمر ٢١ يوماً بالجرام (متوسطات±خطأ قياسي)

عمق الحوض	١٠ حياية عمر يوم واحد	١٠ حياية عمر ٢١ يوماً
٧١ سم	٠,٠٢±٠,١٢٤٥	٠,٠٤±٠,٤٥٦٤
٩٥ سم	٠,٠١±٠,١٤١٥	٠,٠٨±٠,٢١٦٧

أ ، ب متوسطات في نفس العمود عليها حروف مختلف تتباين معنوياً على مستوى ٠,٠٥ .

ثالثاً: التكلفة الاقتصادية:

تكلفة إنتاج الزريعة في دورة المعاملة (3 أحواض تفريخ) $\times 10$ يوم = $45 + 21$ يوم تحضين زريعة = 66 يوم ، ويوضح ذلك جدول رقم (5) و جدول رقم (6) ، إذ يتضح أن تكلفة إنتاج الألف زريعة من الأحواض التي عمق مائها 71 سم كانت 21,86 جنيهاً ، وتكلفة إنتاج الألف زريعة من الأحواض التي عمق مائها 95 سم كان 18,16 جنيهاً. لذلك وجد أن الفرق في تكلفة الألف زريعة كبير بين المعاملتين ، ولصالح الإنتاج من الأحواض الأعمق (95 سم).

جدول (5): تكاليف إنتاج الزريعة بالجنية المصري مع اختلاف عمق ماء أحواض التفريخ

العمق 95 سم	العمق 71 سم	أوجه التكلفة
عمالة 66 يوم/حوض	1 جنية للحوض = 66 جنية	عمالة 66 يوم/حوض
هامش سعر الأمهات	هامش سعر للدورة = 0,5 جنية \times 50 سمكة = 25 جنية \times 3 أحواض = 75 جنية	هامش سعر للدورة = 0,5 جنية \times 50 سمكة = 25 جنية \times 3 أحواض = 75 جنية
تغذية أمهات في الحضان + حوض التفريخ	21 يوم \times 110 جم = 2310 جم \times 3 أحواض = 6,930 جم \times 3 جنية = 20,79 جنية	21 يوم \times 110 جم = 2310 جم \times 3 أحواض = 6,930 جم \times 3 جنية = 20,79 جنية
علف زريعة + إضافات	20 كجم \times 3 جنية = 60 جنية	20 كجم \times 3 جنية = 60 جنية
تكاليف إهلاك (وقود + كهرباء + إهلاك ماكينات رى + إهلاك أحواض خرسانية + إهلاك بلورات هواء + غلايات + بلورات إشعال)	104,6 جنية	104,6 جنية
إيجار أرض + ضرائب + خدمات + نقل + إدارة + إشراف	110	110
مجموع التكلفة	1376,79 جنية	1416,39 جنية

جدول رقم (6) : العائد من عملية رفع عمود المياه من 71 سم إلى 95 سم.

اجمالي الإيراد من الثلاث أحواض	ثمن ال 1000 زريعة المباعة ب 50 جنية \times عدد الزريعة (اجمالي ثمن الزريعة)	عدد الزريعة الصغيرة	المعاملة	
			رقم الحوض	عمق عمود المياه
3150 جنية	50 \times 23000 = 1150 جنية	23000	9	71 سم
		20000	10	
		20000	11	
3900 جنية	50 \times 26000 = 1300 جنية	26000	12	95 سم
		25000	13	
		27000	14	

رابعاً : العائد:

ويتم حساب العائد عن طريق معرفة ثمن بيع الـ ١٠٠٠ زريعة ، والمهم في الزريعة المنتجة هو عدد الزريعة في صورة زريعة صغيرة. من الجدول رقم (٦) يتضح العائد نتيجة لبيع الألف زريعة بعد الـ ٢١ يوم تحضين وسعر الألف ٥٠ جنيهاً ، حيث كان العائد نتيجة رفع منسوب المياه من ٧١ سم إلى ٩٥ سم كان ٧٥٠ جنيهاً للثلاث أحواض.

يستخلص من هذا البحث نتيجة هامة وهي أنه يجب رفع منسوب المياه في أحواض التفريخ لإعطاء راحة للآم وإعطاء مجال للحركة وهذا سينعكس على الإنتاجية والعائد منها (رغم أن السائد في المفرخات الحكومية والخاصة هو خفض عمود المياه).

المناقشة

مياه الصرف المستخدمة في المفرخ زاد بها تركيز الحديد والزنك والصوديوم والمغنسيوم عن التركيز في مياه المزارع السمكية ، ورغم أن مياه التفريخ قد خلت من كل من عنصرى الرصاص والكاديوم ، كما أن باقي العناصر العشرة التي تم تحليلها كانت أقل كثيراً من المسموح به في القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م ولانحته التنفيذية (الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٩٨م) ، وإن كان عنصر الحديد أعلى قليلاً من المسموح به في قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م ، وأيضاً الزنك تركيزه أعلى قليلاً من المسموح به للاستزراع السمكى (٠,٠١ جزء / مليون) وكذلك الحديد (١ جزء / مليون) طبقاً لما ذكره (عبد الحميد محمد ٢٠٠٣م) ، وفيما عدا هذا فكانت متوسطات قيم الملوحة (٤ جزء/ألف) وتركيز أيون الهيدروجين (٧,٩٣) وتركيز الأكسجين الذائب (٧,٥٧ مجم/لتر) في المدى المثالي لصفات المياه القياسية اللازمة للمزارع السمكية (أقل من ٥ جزء /ألف ، ولا يقل عن ٥ مجم/لتر ، على الترتيب) ، كما ورد في (نبيل فهمي وآخرين - ٢٠٠٢م ، عبد الحميد محمد - ٢٠٠٣م) ، كما أن درجة حرارة المياه كذلك ملائمة للبلطى النيلى (عادل أحمد - ٢٠٠٠م ، عبد الحميد محمد - ٢٠٠٣م) ، فهي سمكة مياه دافئة وتحتل الماء الشراب (Huet, 1992). وعموماً فإن ماء صرف ظلمبات-٧ هذه مستخدمة بنجاح في تفريخ البلطى النيلى (عبد الحميد محمد وصلاح محمد-٢٠٠٣م).

وتعد سمكة البلطى النيلى (الأبيض-السلطاني) ذات خصائص متميزة في النمو والتحويل الغذائي ، والاستفادة من العلف الصناعي ، ومقاومة الأمراض ، والتناسل ، والمذاق بما جعلها من أشهر أنواع الأسماك استزرعاً في العالم (حلمى ميخائيل ومجدى توفيق - ١٩٩٧م ، عبد الحميد محمد وصلاح محمد-٢٠٠٣م) ، ولواجهة الطلب المتزايد على الأسماك لقيمتها الغذائية المرتفعة ، أدى ذلك نمو مستلزمات الاستزراع السمكى ، ومن بينها المفرخات لتوفير الزريعة اللازمة لإمداد المزارع السمكية المتزايدة الانتشار والتكثيف ، خاصة في القطاع الأهلى غير الحكومى كما هو ملاحظ في محافظتى كفر الشيخ ودمياط (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - ٢٠٠٢م).

وفى المستقبل القريب سيصبح الاستزراع السمكى مصدراً أكثر أهمية من السمك المصاد من المصايد الطبيعية ، لذا وجب توجيه البحوث العلمية لحل المشاكل المعوقة للاستزراع السمكى ، ومن بينها عجز المفرخات وندرة الزريعة وعشوائية الاستزراع السمكى (عبد الحميد محمد-٢٠٠٢م ، ٢٠٠٣م-ب). ومن المؤشرات الهامة في مجال الاستزراع السمكى أن زادت مساهمة الاستزراع الى ٥٠,٨% من جملة الإنتاج السمكى المصرى عام ٢٠٠٤م (طلعت نصر الدين-٢٠٠٤م) ، مما يدعو لزيادة الاهتمام بالمفرخات المدعمة للمزارع السمكية بالزريعة ، وقد استنتج من هذه التجربة أن زيادة عمق الماء بالأحواض الخرسانية من ٧١ سم الى ٩٥ سم قد زادت من أعداد الزريعة وأوزانها. وهذا التحسن فى الأداء التناسلى للأمهات راجع لزيادة حجم الماء مع ثبات عدد الأمهات مما يعنى انخفاض الكثافة التجميلية للأسماك (عادل أحمد - ٢٠٠٠م) ، مما يؤثر ايجابياً على خواص المياه الطبيعية والكيميائية من حيث وفرة الأكسجين الذائب وانخفاض تركيز الأمونيا وتحسن الاستفادة الغذائية وذلك بزيادة عمق وحجم الماء، مما أدى لانخفاض تكلفة إنتاج الألف زريعة وزاد من العائد نتيجة بيع الألف زريعة بزيادة عمق عمود الماء وزيادة تهوية الماء وبالتالي زيادة تركيز الأكسجين الذائب كما أن زيادة حجم الماء التى تحسن من درجة حرارة مياه أحواض التفريخ ، ونظراً للتأثير الأموى فتزيد الأوزان الأولية للزريعة (عبد الحميد محمد وصلاح محمد - ٢٠٠٣م) فى الأحواض الأعمق لعمود الماء وعلى ذلك نوصى بزيادة عمق عمود الماء فى أحواض التفريخ للبلطى النيلى إلى ٩٥ سم فى أوقات ارتفاع درجات الحرارة لمردود ذلك الايجابى على إنتاج ونمو الزريعة والعائد منها.

المراجع

- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٩٩م). اللقاء العربي السادس للاتحاد العربي لمنتجات الأسماك- القاهرة (٨-١٠ نوفمبر).
- الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية (٢٠٠٢م). إحصائيات الإنتاج السمكي عام ٢٠٠١م ، وزارة الزراعة المصرية
- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (١٩٩٨م). القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.
- أ.د. حلمى ميخائيل بشاى ، أ.د. مجدى توفيق خليل (١٩٩٧م). اسماك المياه العذبة فى مصر - مطبوعات وحدة التنوع البيولوجى (العدد ٩) ، جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء.
- د. طلعت نصر الدين (٢٠٠٤م). طرح إنتاج المزارع السمكية للجمهور بأسعار الجملة . الأهرام - ١٦ أكتوبر.
- د. عادل أحمد ثروت (٢٠٠٠م). أساسيات إنتاج واستزراع الأسماك . (بدون) رقم إيداع ٥٣٤٢/٢٠٠٠م.
- أ.د. عبد الحميد محمد عبد الحميد (٢٠٠٢م). الوضع الراهن للإنتاج السمكى فى مصر ، ندوة الواقع والتطلعات وكيفية بلوغ المأمول فى إنتاجنا السمكى ، جامعة المنصورة (١١ فبراير) الصفحات ١-٣.
- أ.د. عبد الحميد محمد عبد الحميد (٢٠٠٣م-أ). الأسس العلمية لإنتاج الأسماك ورعايتها. الطبعة الثانية مكررة - مطبعة جامعة المنصورة . رقم إيداع : ١٥٧٣٣/٢٠٠٣م.
- أ.د. عبد الحميد محمد عبد الحميد (٢٠٠٣م-ب). التشريعات المصرية المنظمة للسمكة فى مصر من منظور بيئى - إدارى - إنتاجى. المؤتمر الدولى "الثروة السمكية ، والأمن الغذائى فى الدول العربية والإسلامية" ، ٢٢-٢٤ أكتوبر - ١٤ صفحة - جامعة الأزهر.
- أ.د. عبد الحميد محمد عبد الحميد ، م. صلاح محمد ابراهيم (٢٠٠٣م). مقارنة ماء الأبار والماء المخلوط وماء الصرف فى أحد مفرخات البلطى النيلى الخاصة لإنتاج وحيد الجنس تحت فترتين تهوية فى محافظة كفر الشيخ - مصر . المؤتمر الدولى "الثروة السمكية والأمن الغذائى فى الدول العربية والإسلامية" ، ٢٢-٢٤ أكتوبر - ١٦ صفحة - جامعة الأزهر.
- أ.د. نبيل فهمى عبد الحكيم ، د. محمد نجيب بكير ، د. مجدى عبد الحميد سلطان (٢٠٠٢م). البيئة المائية للمزارع السمكية (بدون). رقم إيداع ٤٧٧٤/٢٠٠٢م.
- Anon. (1999). World Health Organization. Tech. Rep. Ser., 883: i-vii, 55pp.
- Becker, K. and Focken U. (1998). Animal Research and Development, 48: 84.
- El-Sayed, A. M. and Teshima S. (1991). Reviews in Aquatic Sciences, 5: 247.
- Huet, M. (1972). Textbook of fish culture, Breeding and cultivation of fish. Fishing News (Book) Ltd., London.
- Jauncey, K. and Ross, J. (1982). A-Guide to Tilapia Feeds and Feeding. Institute of Aquaculture Univ. Sterling-Scotland.
- New, M. B. (1987). Feed and Feeding of Fish and Shrimp. FAO, Rome.
- NRC (1993). Nutrient Requirements of Fish National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C.
- SAS (1987). SAS User's Guide. Statistical Analysis System. Institute, Inc., Cary. NC.
- Shaiu, S. Y. (2002) *Tilapia oreochromis ssp.* Fish Nutrition (eds) C. D. Webster and C. Lim, CAB International, pp. 273-292.

EFFECT OF VARYING DEPTH OF WATER COLUMN IN CONCRETE HATCHING PONDS ON PRODUCTIVITY OF NILE TILAPIA BROOD STOCK.

Salem, M. F. I.¹; A. I. M. Mehrim² and M. Z. Baromh³

1- Central Laboratory of Fish Research, Abbasa-Sakha Unit of Fish research, Kafr El-Sheikh.

2- Animal Production Department, Fac. Agric., Mansoura Univ.

3- Moasaset El-Shraky, Tolombat-7, Kafr El-Sheikh.

ABSTRACT

In an attempt for improving productivity of Nile tilapia hatcheries, a comparison was made between two water column depths in concrete hatching ponds, namely 71 cm (the common used) and 95 cm (the suggested for comparison). The increased depth of water column led to significant increases in number of one day old fry and in weights of one and 21 days old fry. Also, it reduced production costs of each thousand fry and increased economic return of selling the produced fry by 250 LE per pond throughout 36 days. So, it is recommended to increase water column depth in concrete hatching ponds of Nile tilapia to 95 cm instead of 71 cm.

Keywords: Nile tilapia–Concrete hatcheries–Water column- Fry – Return.