

حديقة الازهار

تجمع الآن بذور الحوليات الشتوية فيجب الاعتناء بانتقاها من الازهار الكبيرة الحجم التامة النمو - ثم تجفف جيدا قبل تخزينها والا كانت عرضة للاصابة بمرض البياض - ويمكن اطالة مدة ازهار هذه الحوليات اذا روى قطف الازهار قبل تكوين البذور اذ تحفظ العصاره في النباتات فتستمر في تكوين زهور جديدة

أما الحوليات التي تم جمع بذورها فتتلعق وتعزق الحياض التي خلت جيدا وتترك معرضة للشمس عدة أيام ثم تسمد جيدا بسماد الاصطبلات المتمفن وتعزق ثانية وبذا تصير معدة لزراعتها بالحوليات الصيفية التي زرعت في شهر فبراير والتي تكون قد بلغت حجما تصلح معه للنقل

وإذا تيسر تخصيص حياض صغيرة في جانب من الحديقة تزرع فيها بذور الحوليات الصيفية ثم تنقل فيما بعد لمحللتها المستديمة يكون ذلك أفضل من زرعها في قصارى ثم تنريدها بعد ذلك في قصارى أخرى نمرة ٥ - وفي هذه الحالة تروى الحياض قبل نقل الشتلة خوفا عليها من الذبول وكذا بمجرد زرعها

ويحسن زراعة الحوليات الصيفية مرة بعد أخرى في فترات قصيرة حتى يكون من المتيسر الحصول على نباتات يستعاض بها عن تلك التي تم تزهيرها وابتدأت في الاصفرار

ويجب الاعتناء بزى الحوليات الصيفية فلا تترك حتى تجف تربتها فأن ذلك يسرع بها الى الازهار ثم الى تكوين البذور قبل مياعها كما راعي

تطف الزهور من وقت لآخر قبل ذبولها حتى تطول مدة التزهير
أما النبات الوتدية الجذور كالبسم فلا يصح زرعها في حياض ثم نقلها
لحلمها المستديم إذ أنها تتأثر كثيرا من النقل وإنما تزرع مباشرة في قصار
صغيرة وتوضع في القصيرة الواحدة بزرتان أو ثلاثة ثم تنقل فيما بعد إلى
الحياض المعدة لها

ومن النباتات التي يجب أن تأخذ مكانا ضمن الأزهار الصيفية الحورا
لندهير أي فأن زهرتها البيضاء الجميلة تستحق العناية بها وهي من النباتات
المعمرة ويمكن إذا لم تكن زرعت الآن المبادرة بزرعها وكذلك الكوفيا
والاوترا - ومن الأنواع التي يمكن زرعها ضمن الحوليات الصيفية مع
أنها تجود شتاء الكور يوبس كوروناتا ذات الأزهار الصفراء البهيجة
وتحتاج بعض الحوليات الصيفية التي تم نموها إلى دعائم تسند عليها
لكبر حجم أزهارها كعباد الشمس وخلافه

وتحتاج نباتات الاراولة إلى عناية خاصة فتنقل إلى قصارى كبيرة
الحجم مرة ٢٠ - ٢٥ والأخيرة أفضل - إن لم يكن قد تم نقلها للآن ويجب
أن تكون التربة التي تملأ بها القصارى غنية من المواد الغذائية وذلك بأن
يكون نصفها من طمي النيل والنصف الآخر من سماد الاصطبلات المتعفن
جيذا - ويراعى عند النقل ملء الفراغ الذي بين الصلاية وجدران القصيرية
جيذا وأن لا تملأ القصارى حتى حافتها بل يترك منها نحو سنتيمترين أو
ثلاثة على الأقل وعند الرى تملأ القصارى بالماء حتى يصل إلى أسفل التربة -
والاراولة من النباتات التي تحتاج لغذاء وافر فتسمد أما بمنقوع السبله
في كل أسبوع أو بسماد البودرت وهذا يحتاج لعناية خاصة والاتسبب

عنه احراق الجذور اذا زاد مقداره والعادة أن يضاف لكل قصيرية ملء
ملعقة كبيرة بعد اثاره سطحها بالشقرف ثم تروى جيدا

وإذا أصيبت نباتات الاراولا بالمن فترش بمحلول الصابون الرخو
ويراعى رش النباتات في الصباح مبكرا أو عند الغروب لان رشها وقت
اشتداد الحرارة يتسبب عنه احتراق كثير من الاوراق — وفضلا عن ذلك
فان المحلول يتبخر بسرعة فلا يتنفع به كثيرا

وإذا أريد الحصول على أزهار كبيرة الحجم من الاراولا تقص جميع
فروع النباتات عداساقين لا يترك على كل منهما أكثر من زهرتين

وتزرع العروة الاولى من الحوليات الشتوية في أواخر شهر يونيه
وتنثر البذور نثرا خفيفا في قصار عمرة ١٥ وعمرة ٢٠ أو في شوال أو صناديق
توضع في الصوبة أو تحت ظل الأشجار ويوالى ريهها برشاش ذى ثقب
ذقيقة اذ من الخطأ البين استعمال رشاش ذى ثقب متسعة لانه يرى البذور
ويكسحها فتتجمع في جانبيين من القصيرية

وتزرع السنراريا والبرميولا ملاكويدس في ذلك الوقت أيضا —
ولكنهما يتأثران كثيرا من النقل فتنثر بذورهما نثرا خفيفا جدا حتى يمكن نقلها
مع قليل من الطين حول الجذور ثم توضع القصارى في مكان كثير الظل
وأشجار الورد ما زالت في كمال نضارتها في شهر مايو وان يكن قل
تزهيرها نوعا عن شهر ابريل ويمكن اطالة مدة التزهير بقطف الأزهار
بمجرد تفتحها وتقليم الافرخ وإذا أصيبت شجيرات الورد بالمن فترش
بمحلول صابون أو الكاتكلا وإذا ظهرت خنفساء الورد تنقى باليد في

الصباح أو قبل غروب الشمس اذ يسهل جمع الحشرة في ذلك الوقت
وتبتدىء مسطحات الجازوز في الاصفار فيجب اذالتها في شهر أغسطس
وتعزق الارض جيدا وتترك معرضة للشمس حتى شهر سبتمبر فتعاد زراعتها
أما مسطحات الليميا والنجيل فأخذة في الاخضرار بحلول فصل
الصيف فيجب تسميدها جيدا بالسبلة المتعفنة ويكثر من ريها وترقع الفراغات
وتنقى الحشائش منها باستمرار حتى لا تفقد شيئا من رونقها ويعتنى بقصها
من وقت لآخر والافضل أن تروى عند الغروب حتى تستمر الارض رطبة
الى الصباح م

