

## تقويم حقيقة الأزهار

(يناير)

التزهير — يصادف هذا الشهر ابتداء تفتح الأزهار في أغلب الحوليات الشتوية كالمشمسج والشمشور وبق السبع والسنراويا والفلكس والكلاركيا والليناريا والابرس الخ وتزهرف فيه أبصال النرجس والفريزيا والليليوم والبنكراسيوم البدرية وتكثر أزهار الورد وتكسى البيجنونيا فستنا بأزهارها المشمشية وزهر الكروبولاريا مديونس وكرونالجلوكا وشجرة سسترم ايليجانز

التكاثر . يبدأ بفرس عقل الاراولة والقرنفل في الثالث الاخير منه وبعض العقل الطرفية تحت الزجاج كذلك كما تفرس عقل الورد النسر للتطعيم عليها في انطريف التالي وتزرع بصيالات الليليوم متأخرة وكورمات الجلاديولي والتيوبيروز النقل — يبدأ في نقل الاشجار والشجيرات من اواسط شهر يناير الدائمة الخضرة بصلاية حول جذورها والمتجردة ملشا

المروج — يقف نمو حشائش المروج « النجيل واللبيا » ويتأثر كلاهما من البرد والصقيع فتحدث بالمروج بقع حمراء كبيرة او صغيرة بحسب تعرض المسطحات لتلك المؤثرات ويجب الاقلال من الري واذا رويت يكون ذلك في طقس دافئ نوعاً ، ولوقاية المسطحات من ضرر الصقيع تفرش عليها طبقة من السماد البلدى العتيق لعمق سنتيمتر واحد . أما مروج «الجازون» فتكون يانعة جداً وفي حاجة دائمة لقصها وكبسها ورشها .

الاصابات — يبتدي ظهور المن في اواسط الشهر على قمم النباتات فيجب التيقظ لابادته بمجرد ظهوره ضغطاً بالأصابع او يرش بمحلول الغاز والصابون مراراً بنسبة ١ على ١٥ او ١ على ٢٠ في الصباح او المساء وايس وقت اشتداد الحرارة ويلزم التيقظ لابادة جعران الورد كذلك

عموميات — تكون الاشجار والشجيرات في حالة سكون وهذا وقت مناسب

لتقليصها اذا رغب في ذلك ، وتقلع درنات الداليا وتخزن في الرمل الجلف حتى شهر مارس لتزرع من جديد ، ويقلم الورد في النصف الثاني منه .

( فبراير )

التزهير—تكون كل الحوليات الشتوية في أول دور تزهيرها وهنا يبادر الى قطف الازهار القديمة متى ظهرت عليها علامات الذبول أو تكوين البذور لأن تركها تثمر أو تدبل على النبات مما يدعو لقصر عمره وقلة تزهيره . ويفزر زهر البنفسج ويزهر الانيمون والرنكيل والبدايا والابصال الشتوية

التكاثر— تفرس عقل الاراولة في القصاري وعقل القرنفل الاميركاني في مواجير التربية . والعقل الطرفية والمدينة للنباتات الزخرفية تحت الزجاج—وعقل الاشجار كالحور والتيكوما والمستكة واللبخ والصفصاف — وعقل الشجيرات والمستلقات مثل تيكوما كبنسوز وبتسبوروم والا كليفيا والدرنتا والهيمسكس والياسمين ولبايب النباتات الزخرفية في العراء او الصوبة مثل الكروتون والسكليوس والمنذلية والجرونية والسنكيز . وقطع النباتات الشحمية من فصيلة الصبارات بعد تعريضها للجو زمناً يكفي لضورها نوعاً . وفي اواخر هذا الشهر تفرس درنات الداليا مبكر وتفحص الكنا كذلك وتثر بذور الحوليات في المواجير ومنها الزينيا والونكا والسكتلة ورجلة الزهور وعباد الشمس وعرف الديك والقطفية والبزيمينا والعنبر الكشميري وبذور الداليا والسكاسيا . وتزرع بذور الاشجار كالبوھينيا واللبخ والبوينسيانا والجازورينا والسرور والسنوبر والكافور والجريفليا والخرنوب والجسكروندا ، والزرنخت الخ . في مواجير التربية والكبير منها في الارض مباشرة النقل — يمكن الاستمرار في نقل الاشجار والشجيرات كما ذكر في يناير

**الاصابات** — يكثر جعوان الورد وهذا يستلزم فحص الازهار كل صباح ويظهر مرض البياض وتكثر الاصابات بالبق الدقيقي وتعالج النباتات المصابة بمحلول الغاز والصابون مخففاً بنسبة ١ الى ١٥ ويكرر الرش بحذر

عموميات . يبتدىء دفء الطقس وعنه آخر الشهر تتحرك المعصرة النباتية في الاشجار والشجيرات الساكنة وتبتدىء أوراق الورد تتساقط حتى يقل ربه واستمرار تقليم الورد وتسميده جيداً

محمد بيروسي علي