

## **An Economic Study of the Efficiency of the Usage of Chemical Fertilizers in the Production of the Most Important Summer Crops in Beheira Governorate**

Rania A. Elshaer

Senior Res. Agricultural Economics Res. Instit., Agric.Res.Center

### **دراسة اقتصادية لكفاءة استخدام الأسمدة الكيماوية في إنتاج أهم المحاصيل الصيفية في محافظة البحيرة**

رانيا عبد الفتاح الشاعر

معهد بحوث الاقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية

#### **المخلص**

يستهدف البحث دراسة تأثير كفاءة استخدام الأسمدة الكيماوية على إنتاجية محصول الأرز في محافظة البحيرة ، و تأثير مشاكل الصرف بالأراضي الزراعية بالمحافظة على كفاءة استخدام هذه الأسمدة و على إنتاجية هذا المحصول ، بالإضافة إلى تحديد مقدار الإسراف في الأسمدة الكيماوية عن الاستخدام الأمثل ، تحديد المرحلة الاقتصادية لإنتاج هذه الأسمدة من محصول الأرز بمحافظة البحيرة . فضلاً عن التعرف على المشاكل و المعوقات التي تواجه المزارعين في استخدامهم للأسمدة الكيماوية حتى يمكن التوصل إلى سياسات واضحة لزيادة كفاءة توزيع و استخدام هذا المورد الهام في الزراعة المصرية ، و كذلك التعرف على مدى معرفتهم و استخدامهم للأسمدة العضوية و الحيوية . و يتضح من البحث أن كمية وحدات السماد الأزوتية المعظمة لإنتاجية الأرز في الأراضي جيدة و سبية الصرف بمحافظة البحيرة تزيد بنسبة زيادة تتراوح بين حوالي ٤٤,٥% - ٤٤,٣% عن المقرر السمادي المقرر من معهد بحوث الأراضي و الذي يبلغ حوالي ٦٠ كجم وحدة أزوت ، و نسبة زيادة تتراوح بين حوالي ١٩١,٧% - ٧٢,٥% عن المقرر السمادي المسلم للمزارعين من وزارة الزراعة و الذي يبلغ حوالي ٥٠,٢٥ كجم وحدة أزوت . و يتزايد مقدار السماد الفوسفاتي المعظم لإنتاجية الأرز في تلك الأراضي بنسبة تتراوح بين حوالي ١٠٨ - ١٣٦% عن المقرر السمادي المقرر من معهد بحوث الأراضي و الذي يبلغ حوالي ١٥ كجم وحدة فوسفات . و يتضح كذلك من البحث أن إنتاج عنصرى السماد الأزوتي و الفوسفاتي من الأرز في الأراضي جيدة الصرف يقع في المرحلة الإنتاجية الثالثة أى أن الإنتاج يتناقص لسبب السلبية الإنتاجية الحديثة لهذه العناصر . أما إنتاج عنصرى السماد الأزوتي و الفوسفاتي من الأرز في الأراضي سبية الصرف فيقع في المرحلة في المرحلة الثانية للإنتاج (المنطقة الرشيدة للإنتاج) ، و يعزى ذلك رغم زيادة كمية السماد المستخدمة في تلك الأراضي عن الأراضي جيدة الصرف إلى احتياج الأراضي سبية الصرف إلى كميات أكبر من الأسمدة حتى تحقق إنتاجية جيدة . و يبين مما سبق في البحث أن مقدار الإسراف في الأسمدة الكيماوية المستخدمة في عينة الدراسة في الأراضي جيدة الصرف يتراوح بين حوالي ٣٢,٢٦ - ٣٦,٦٦ كجم وحدة أزوت ، و حوالي ٩,٤١ - ١١,٣٤ كجم وحدة فوسفات ، بينما يتراوح مقدار الإسراف في الأراضي سبية الصرف بين حوالي ١٢,٨١ - ١٤,٢٣ كجم وحدة أزوت ، و حوالي ٥,١٩ - ٦,١١ كجم وحدة فوسفات ، وأن مزارعي الأرز في الأراضي جيدة الصرف يمكنهم زيادة إنتاجهم بنسبة تتراوح بين حوالي ٣٢ - ٣٩,٩% ، كما أن مزارعي الأرز في الأراضي سبية الصرف يمكنهم زيادة إنتاجهم بنسبة تتراوح بين حوالي ١٠,٧ - ١٣,٨% دون أي زيادة في كمية الأسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم ، و يعنى ذلك وجود إهدار في استخدام الأسمدة الكيماوية مما يؤدي ذلك لانخفاض إنتاجية وحدة الأزوت و الفوسفات من الأرز في تلك الأراضي فضلاً عن زيادة غير مبررة لتكاليف الإنتاج . و يبين كذلك أن مزارعي الأرز في محافظة البحيرة لم يحققوا كفاءة السعة المثلى و يمكنهم الوصول إليها من خلال زيادة إنتاجهم بنسبة تبلغ حوالي ١١,٣% ، و حوالي ٣,٤% في الأراضي جيدة و سبية الصرف على التوالي حتى يتحقق الحجم الأمثل للإنتاج . و يوصى البحث بضرورة القضاء على مشاكل الصرف الزراعي ، بالإضافة إلى ضرورة الرقابة المشددة على تجارة الأسمدة ، و تذليل كل العقبات أمام المزارعين عند استلام المحاصيل الزراعية و تحديد أسعار مناسبة لها . فضلاً عن توفير مكابس لقص الأرز ليم كسبه و أخذ من الفلاح بدون مقابل حتى لا يمثل عبء على الفلاح ، و يوصى البحث كذلك بضرورة تنظيم دورات إرشادية دورية لتوعية المزارعين و الاستماع لمشاكلهم و توجيههم بصفة مستمرة ، و قيام المرشدين الزراعيين بمعاينة دورية للأراضي الزراعية للتعرف على مشاكل المزارعين على الطبيعة ، و توفير الأسمدة المركبة و العضوية و الحيوية بالجمعيات الزراعية ، و عمل حقول إرشادية لبيان تأثير استخدامها و إتقان الفلاحين باستخدامها

#### **المقدمة**

#### **مشكلة الدراسة : يعد السماد الكيماوي من أهم عناصر الإنتاج التي تحقق**

زيادة ملموسة في إنتاجية مختلف المحاصيل ؛ لذلك يتجه المزارعون إلى إضافة كميات زائدة من الأسمدة الكيماوية دون الالتزام بكميات وأوقات وطرق الإضافة الصحيحة طبقاً للتوصيات الفنية الصادرة من مركز البحوث الزراعية بهذا الشأن . و بالرغم من أن الاستخدام الصحيح للأسمدة الكيماوية يؤدي إلى الحصول على إنتاج كبير وبنوعية جيدة ، إلا أن الإسراف في استخدام هذه الأسمدة يؤدي للإضرار بالمحصول و ترك آثاراً سلبية على التربة و البيئة ، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من زيادة تكاليف الإنتاج دون مبرر ، و تلوث المياه الجوفية و مياه الصرف الزراعي التي غالباً ما تصل إلى نهر النيل بما يشكل خطراً شديداً على صحة الإنسان و الحيوان . و قد تفاقمت مشاكل الأسمدة الكيماوية في الزراعة المصرية في السنوات الماضية إذ يشكو الكثير من الزراع من عدم توافر الأسمدة الكيماوية اللازمة لزراعتهم في الأوقات المناسبة و بالكميات المطلوبة ، و يتطلب ذلك دراسة كفاءة استخدام مثل هذه الموارد السمادية حتى يمكن التوصل إلى سياسات واضحة لزيادة كفاءة توزيع و استخدام هذا المورد الهام في الزراعة المصرية .

#### **الهدف من البحث : يستهدف البحث دراسة تأثير كفاءة استخدام الأسمدة**

الكيماوية على إنتاجية محصول الأرز في محافظة البحيرة ، و تأثير مشاكل الصرف بالأراضي الزراعية بالمحافظة على كفاءة استخدام هذه الأسمدة و على إنتاجية هذا المحصول ، بالإضافة إلى تحديد مقدار الإسراف في الأسمدة الكيماوية عن الاستخدام الأمثل ، تحديد المرحلة الاقتصادية لإنتاج هذه الأسمدة من محصول الأرز بمحافظة البحيرة . فضلاً عن التعرف على المشاكل و المعوقات التي تواجه المزارعين في استخدامهم للأسمدة الكيماوية ، و كذلك التعرف على مدى معرفتهم و استخدامهم للأسمدة العضوية و الحيوية .

#### **أسلوب البحث و مصادر البيانات**

يعتمد البحث في تحقيق أهدافه على أسلوب التحليل الوصفي و الكمي إذ تعتمد الدراسة على استخدام أسلوب الانحدار بصورة البسيطة والمتعددة

تمهيد : يرتبط أي تغير في معدلات التنمية الاقتصادية في مصر ارتباطاً كبيراً بمعدلات التنمية في القطاع الزراعي ؛ لذلك لابد من تحقيق التنمية الزراعية التي تتركز على محورين رئيسين الأول يتمثل في التوسع الزراعي الأفقي و يقصد به زيادة رصيد المجتمع من الموارد الاقتصادية الزراعية من خلال استصلاح و استزراع أراضي جديدة ، أما الثاني فيتمثل في التوسع الزراعي الرأسي و يقصد به العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية ، و نظراً لضيق الرقعة الزراعية الحالية و المشاكل و الصعوبات التي تواجه عمليات استصلاح و استزراع الأراضي ، فضلاً عما ترتب من إنشاء السد العالي من انخفاض كميات الطمي الأمر الذي أدى إلى حدوث نقص كبير في المحتويات الغذائية للتربة الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية المصرية . و يعكس ذلك أهمية التكثيف الزراعي كأحد الوسائل الرئيسية لزيادة الإنتاج الزراعي المصري ، و يعتبر عنصر السماد أهم عناصر مستلزمات الإنتاج الزراعي لذلك فالاهتمام به و دراسة مدى كفاءة استخدامه في ظل ظروف الزراعة المصرية يعد من أهم وسائل زيادة الإنتاج الزراعي في الوقت الحالي . و يعتبر الأرز من أهم محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر ، و يأتي في المرتبة الثانية بعد القمح كغذاء رئيسي للشعب المصري ، و يعتبر كذلك أهم المحاصيل الصيفية المنزعة في مصر إذ يستحوذ على قرابة ٢٧,٦% من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية المنزعة في مصر و التي تبلغ قرابة ٥ مليون فدان لموسم الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥ . و تسعى الدولة في السنوات الأخيرة إلى تقليص المساحة المنزعة بالأرز للحد من استهلاك المياه في ظل التحديات التي تواجهها مصر في مواردها المائية ، و تسعى كذلك إلى زيادة إنتاجية محصول الأرز من خلال التكثيف الزراعي و استنباط أصناف مقاومة للجفاف و الملوحة . و يتطلب ذلك دراسة مختلف العوامل التي تؤثر سلباً على إنتاجية الأرز حتى يمكن معالجة أسبابها و القضاء عليها .

المنتجة للآرز في جمهورية مصر العربية إذ يبلغ إنتاج هذه المحافظات حوالي ١٢,٥ مليون طن ليمثل بذلك حوالي ٩٢,٨ % من إجمالي إنتاج الآرز على مستوى الجمهورية والذي يبلغ قرابة ٥,٥٢ مليون طن لمتوسط الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥. وتأتي محافظة البحيرة في المرتبة الرابعة بين محافظات الجمهورية من حيث إنتاج الآرز إذ يبلغ إنتاجها بها حوالي ٧٧٣,٢٣ ألف طن ليستحوذ بذلك على حوالي ١٤% من إجمالي إنتاج الآرز على مستوى الجمهورية لمتوسط الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥ - (جدول ٣ بالملحق) .

**الأهمية النسبية للآرز و تطور إنتاجه في محافظة البحيرة :** يمثل الآرز و الذرة الشامية الصيفي و القطن أهم المحاصيل الصيفية التي تزرع في محافظة البحيرة إذ تبلغ مساحة هذه المحاصيل قرابة ٤٦٠ ألف فدان لتمثل بذلك حوالي ٨٥,٨ % من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية المنزرعة بمحافظة البحيرة و التي تبلغ قرابة ٥٣٥,٩ ألف فدان لمتوسط الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥. ويعتبر الآرز أعلى هذه المحاصيل من حيث المساحة المزروعة، فضلاً عن أهميته الاستراتيجية في الأمن الغذائي المصري، و يأتي الآرز في المرتبة الأولى بين المحاصيل الصيفية المنزرعة بمحافظة البحيرة إذ تبلغ مساحته قرابة ١٨٧,٨ ألف فدان ليستحوذ بذلك على حوالي ٣٥% من إجمالي مساحة هذه المحاصيل لمتوسط الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥ - (جدول ٤ بالملحق) .

و يتبين باستعراض تطور المساحة السنوية المنزرعة بالآرز في محافظة البحيرة خلال الفترة ٢٠٠٦ - ٢٠١٥ أنها تتجه إلى التغير بمعدل نمو سنوي سالب يبلغ حوالي ١١,٢% مترواحاً بين حوالي ١٥٤,٨٣ ألف فدان كحد أدنى عام ٢٠١٠، و قرابة ٢٤٧,٨٩ ألف فدان كحد أقصى عام ٢٠٠٧. و يتبين كذلك باستعراض تطور كمية الإنتاج السنوي من الآرز بمحافظة خلال نفس الفترة أنها تتجه إلى التغير بمعدل نمو سنوي سالب يبلغ حوالي ١٣,٧% مترواحاً بين قرابة ٦٢٣,٠٨ ألف طن كحد أدنى عام ٢٠١٥، و حوالي ١,٠ مليون طن كحد أقصى عام ٢٠٠٧. و يشير تناقص إنتاج الآرز بمحافظة البحيرة بمعدل أعلى من نظيره للمساحة إلى تناقص الغلة الفدانية الأرزية بمحافظة خلال هذه الفترة الأمر الذي يتطلب تحديد المراكز التي تنخفض فيها الإنتاجية، و التعرف على أسباب تناقصها و العمل على توجيه المزارعين لاختيار الأصناف الأكثر ملائمة لأراضيهم و التي تحقق إنتاجية أعلى و تحديد سعر مناسب لاستلام المحصول للقضاء على احتكار كبار التجار للمحصول و التحكم في تواجه و أسعاره بالأسواق، فضلاً عن مساعدة المزارعين على حل المشاكل التي يعانون منها لتحقيق زيادة إنتاجية هذا المحصول الذي يعد من أهم السلع الأساسية الاستراتيجية اقتصادياً و التي يعتمد عليها الشعب المصري بشكل أساسي في غذائه، و خاصة في إطار تحديد و تقليص المساحات المنزرعة بالآرز كنتيجة لأزمة نقص المياه في مصر، و ذلك حتى لا تتحول من دولة مصدرة للآرز إلى دولة مستوردة له .

#### الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الأسمدة الأزوتية و الفوسفاتية في إنتاج محصول الآرز في محافظة البحيرة

**تمهيد :** تعتبر الأسمدة الكيماوية من أهم عناصر الإنتاج المتغيرة، و يتركز استخدام الأسمدة في مصر على الأسمدة الأزوتية و الفوسفاتية لانخفاض الوعي لدى المزارعين بأهمية الأسمدة الأخرى و خاصة الأسمدة العضوية و الحيوية. و لقد تكررت أزمات الأسمدة في السنوات

$$* \text{لوص}^{\text{ه}} = ٥,٤٦٢ - ٠,١١٢ \text{لوس}^{\text{ه}} \text{ ف} = ١٦,٩٣٦$$

$$= ٠,٨٢٤ \text{ر} - (١٢٠,٤٨٩) \text{ف} = ٠,٦٣٩$$

حيث ص<sup>ه</sup> القيمة التقديرية للمساحة المنزرعة بالآرز في محافظة البحيرة بالألف فدان في السنة ه، س ه متغير الزمن. و قد تبين معنوية معدل النمو ومعنوية النموذج عند مستوي ٠,٠٠٥. وتشير الأرقام بين القوسين إلى قيم ت المحسوبة، و ف إلى معنوية النموذج .

$$** \text{لوص}^{\text{ه}} = ٦,٩٢٩ - ٠,١٢٧ \text{لوس}^{\text{ه}} \text{ ف} = ١٠,٥٩٤$$

$$= ٠,٧٥٥ \text{ر} - (٩٩,١٩٨) \text{ف} = ٠,٥١٦$$

حيث ص<sup>ه</sup> القيمة التقديرية لإنتاج الآرز في محافظة البحيرة بالألف طن في السنة ه، س ه متغير الزمن. و قد تبين معنوية معدل النمو عند مستوي ٠,٠٠١، بينما ثبتت معنوية النموذج عند مستوي ٠,٠٠٥. وتشير الأرقام بين القوسين إلى قيم ت المحسوبة، و ف إلى معنوية النموذج .

♦ جمعت و حسبت من بيانات نشرات قطاع الشؤون الاقتصادية - وزارة الزراعة - أعداد مختلفة .

لتقدير الاتجاهات الزمنية العامة لتطور متغيرات الدراسة، و لتقدير دالة إنتاج فيزيقية تبين تأثير الكميات المختلفة المستخدمة من الأسمدة على إنتاجية محصول الآرز في الأراضي القديمة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى تقدير الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الأسمدة الكيماوية في محافظة البحيرة باستخدام برنامج (Data Envelopment Analysis) DEA وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة (CRS) Constant Returns to Scale، و العائد المتغير للسعة (VRS) Variable Returns to Scale، و كفاءة السعة (Scale Efficiency) لمدخلات و مخرجات الإنتاج، فضلاً عن استخدام اختبار ت (T-Test) للفرق بين متوسطين للتعرف على مدى وجود فرق معنوي بين استخدام الأسمدة الأزوتية و الفوسفاتية في الأراضي جيدة و سيئة الصرف بمحافظة البحيرة، و كذلك مدى وجود اختلاف معنوي بين إنتاجية الآرز في هذه الأراضي. و تعتمد الدراسة بصفة أساسية في الحصول على بياناتها على البيانات الثانوية المنشورة و الغير منشورة بواسطة العديد من الجهات و الأجهزة و المصادر المختلفة، و التي يمكن حصرها في قطاع الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الزراعة، و مديرية الزراعة بالبحيرة، و الغرفة التجارية، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية القطاعية التي يتم الحصول عليها من خلال استمارات الاستبيان لعينة عشوائية من مزارعي محافظة البحيرة .

**اختيار عينة الدراسة :-** لقد تم إجراء عينة الدراسة خلال الموسم الزراعي (٢٠١٤ - ٢٠١٥) بمحافظة البحيرة، و لقد تم اختيار خمس مراكز من مراكز المحافظة، و ذلك إذ تستحوذ الخمس مراكز على قرابة ٦٢% من إجمالي المساحة المحصولية بالمحافظة لمتوسط الفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٥. و يأتي مركز أبو الحمص في المرتبة الأولى إذ تبلغ المساحة المحصولية بالمركز حوالي ٢٦٦ ألف فدان بنسبة تبلغ حوالي ٢٠,٤% من إجمالي المساحة المحصولية لمحافظة البحيرة و التي تبلغ حوالي ١,٣ مليون فدان لمتوسط الفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٥، بينما يأتي مركز كفر الدوار في المرتبة الثانية إذ تبلغ المساحة المحصولية بالمركز حوالي ١٤٩,٧ ألف فدان بنسبة تبلغ حوالي ١١,٥% من إجمالي المساحة المحصولية بالمحافظة لمتوسط تلك الفترة. أما مركز الدلنجات فيأتي في المرتبة الثالثة بنسبة تبلغ قرابة ١١%، ثم مركز كوم حمادة في المرتبة الرابعة بنسبة تبلغ حوالي ٩,٦%، يليه مركز دمنهور في المرتبة الخامسة بنسبة تبلغ قرابة ٩,٥% . و قد تم تحديد عدد أفراد العينة و توزيعها على الخمس مراكز من خلال المتوسط الهندسي لعدد الحائزين و المساحة المزروعة ليبلغ عدد أفراد العينة ١٢٤ مزارع . و قد تم اختيار خمس جمعيات عشوائية من الخمس مراكز إذ تم اختيار جمعية نديبة من مركز دمنهور، و جمعية بريم من مركز كوم حمادة، و جمعية المسين من مركز الدلنجات، و جمعية سحالي مركز أبو حمص، و جمعية بردلة مركز كفر الدوار. و يتراوح معدل الخطأ المسموح به عند تحديد حجم العينة بين (٥% - ١٠%)، و يراعى عند تحديد عدد أفراد العينة عدة معايير من أهمها أسلوب البحث المستخدم، و درجة الدقة المطلوبة، فضلاً عن تجانس أو تباين المجتمع فكلما زاد التجانس بين أفراد المجتمع كان العدد اللازم لتمثيل المجتمع أقل و العكس صحيح - (جدول ١ بالملحق) .

ويوضح من بيانات (جدول ٢ بالملحق) توزيع عينة الدراسة على المراكز المختارة بمحافظة البحيرة، و يتضح أن عدد الحائزين بمركز أبو حمص يبلغ قرابة ٤٦,٣ ألف حائز، و تبلغ مساحة حيازتهم المنزرعة قرابة ٨٢,١ ألف فدان، و قد تم اختيار عدد ٢٩ مزارع من مزارعي هذا المركز. و يتضح كذلك من البيانات أن عدد الحائزين بمركز كفر الدوار يبلغ حوالي ٣٥,٨ ألف حائز، و تبلغ مساحة حيازتهم المنزرعة قرابة ٧١,٣ ألف فدان، و قد تم اختيار عدد ٢٣ مزارع من مزارعي هذا المركز، أما مركز الدلنجات فيبلغ عدد الحائزين به حوالي ٣٢ ألف حائز، و تبلغ مساحة حيازتهم المنزرعة حوالي ٦٩,٤ ألف فدان، و قد تم اختيار عدد ٢٢ مزارع من مزارعي هذا المركز. و يبلغ عدد الحائزين بمركز كوم حمادة حوالي ٤٤,٦ ألف حائز، و تبلغ مساحة حيازتهم المنزرعة حوالي ٦٠,٦ ألف فدان، و قد تم اختيار عدد ٢٢ مزارع من مزارعي هذا المركز، بينما يبلغ عدد الحائزين بمركز دمنهور قرابة ٥٠,٦ ألف حائز، و تبلغ مساحة حيازتهم المنزرعة قرابة ٦٠,٢ ألف فدان، و قد تم اختيار عدد ٢٦ مزارع من مزارعي هذا المركز، و بذلك يصبح العدد النهائي لعدد المزارعين بالعينة ١٢٤ مزارع تم اختيارهم عشوائياً .

**الأهمية النسبية لمحافظة البحيرة في إنتاج الآرز :** تمثل محافظات الدقهلية و كفر الشيخ و الشرقية و البحيرة و الغربية أهم المحافظات

الزراعة قرابة ٢٥,٥٠ كجم وحدة أزوت، ويزداد بذلك مقدار السماد الأزوتي الذي يحقق تدنية التكاليف عن المقرر السمادي المقدر من معهد بحوث الأراضي بنسبة تبلغ حوالي ٥٥%، وعن المقرر السمادي المسلم للمزارعين من وزارة الزراعة بحوالي ٨٥%، بينما يزيد مقدار السماد الفوسفاتي الذي يحقق تدنية التكاليف عن المقرر السمادي المقدر بنسبة تبلغ قرابة ١٤٦,٧%.

ويتبين كذلك أن كمية وحدات السماد الأزوتية المعظمة لإنتاجية الأرز في الأراضي جيدة الصرف بمحافظة البحيرة تبلغ حوالي ٨٦,٧ كجم وحدة أزوت أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي ٤٤,٥% عن المقرر السمادي المقدر من معهد بحوث الأراضي، ونسبة زيادة تبلغ حوالي ٧٢,٥% عن المقرر السمادي المسلم للمزارعين من وزارة الزراعة. ويبلغ مقدار السماد الفوسفاتي المعظم لإنتاج القمح في تلك الأراضي قرابة ٣٥,٤ كجم وحدة فوسفات أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي ١٣٦% عن المقرر السمادي المقدر من معهد بحوث الأراضي.

**تحديد المرحلة الاقتصادية لإنتاج عنصرى السماد الأزوتي والفوسفاتي من الأرز في الأراضي جيدة الصرف:** لقد تبين من تقدير المعدل الحدى للاستبدال التكنولوجي لعنصرى السماد الأزوتي والفوسفاتي أنه متزايد يبلغ حوالي ٠,٢٤. مما يعكس أن إنتاج الأرز في الأراضي جيدة الصرف بمحافظة البحيرة يقع في منطقة الإنتاج غير الرشيدة. وتقدير المرونة الإنتاجية لعنصرى السماد الأزوتي والفوسفاتي تبين أنها أقل من الصفر وتبلغ حوالي -٠,٠٤، وقرابة -٠,٥٦ لكل منهما على التوالي بمعنى أن إنتاج هذه العناصر من الأرز يقع في المرحلة الإنتاجية الثالثة أي أن الإنتاج يتناقص لسلبية الإنتاجية الحدية لهذا العنصر.

وتقدير الكفاءة الاقتصادية الإنتاجية لعنصر السماد الأزوتي تبين أنها أقل من الواحد إذ أن قيمة الإنتاجية الحدية لهذا المورد تبلغ حوالي ٣,٩ جنيه و هي تقل بذلك عن تكلفة استخدام الوحدة من هذا المورد وتبلغ قرابة ٥,٨ جنيه. ويعكس ذلك وجود إسراف في استخدام هذا المورد مما يتطلب ترشيد استخدام هذا المورد لأن زيادة الكمية المستخدمة منه تؤدي لمزيد من الانخفاض في إنتاجيته الحدية وكفاءته الإنتاجية. وقد تم كذلك تقدير الكفاءة الاقتصادية الإنتاجية لعنصر السماد الفوسفاتي وتبين أنها أكبر من الواحد إذ أن قيمة الإنتاجية الحدية لهذا المورد تبلغ حوالي ١٨٧,٥ جنيه و هي تزيد بذلك عن تكلفة استخدام الوحدة من هذا المورد وتبلغ قرابة ٥,٩ جنيه، ولذلك يجب تقليص الكميات المستخدمة من هذا المورد حتى تتساوى قيمة إنتاجيته الحدية مع سعر الوحدة المستخدمة منه.

**تقدير الكفاءة الاقتصادية لإنتاج الأرز في الأراضي جيدة الصرف وفقاً لمفهوم الإنتاج لعائد السعة الثابت والمتغير وكفاءة السعة باستخدام تحليل مغلف البيانات (DEA):** لقد تبين من تقدير الكفاءة الفنية لإنتاج الأرز في الأراضي جيدة الصرف بمحافظة البحيرة في ظل ثبات العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة ٠,٣، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٦ لعينة الدراسة. ويعنى ذلك أن مزارعى الأرز في هذه الأراضي يمكنهم زيادة الإنتاج من الأرز بنسبة تبلغ حوالي ٣٩,٩% دون أي زيادة في كمية الأسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم، و يعكس ذلك وجود فارق كبير في الأسمدة الكيماوية محل الدراسة الأمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف إنتاج الأرز لهؤلاء المزارعين بنفس النسبة.

ويتبين باستعراض الكفاءة التوزيعية لإنتاج الأرز في الأراضي جيدة الصرف بمحافظة البحيرة في ظل ثبات العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة ٠,٦١، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٨ لعينة الدراسة. ويعنى ذلك أن إعادة توليف كميات السماد الكيماوى المستخدمة لدى مزارعى الأرز في هذه الأراضي يوفر حوالي ١٩,٨% من تكاليف الإنتاج لديهم. ويتبين كذلك باستعراض الكفاءة السعرية لإنتاج الأرز في هذه الأراضي في ظل ثبات العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة ٠,٢٣، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ قرابة ٠,٤٨ لعينة الدراسة. ويعنى ذلك أن مزارعى القمح في هذه الأراضي يمكنهم تحقيق نفس المستوى من إنتاج الأرز مع تقليل التكاليف المنفقة على السماد الكيماوى بنسبة تبلغ حوالي ٥٢,١% من التكاليف الحالية، ويوضح ذلك أن تكاليف إنتاج الأرز في هذه المزارع تزيد عن أدنى نقطة على منحنى التكاليف المتوسطة.

ويتبين من نتائج التحليل أن الكفاءة الفنية لإنتاج الأرز في الأراضي جيدة الصرف بمحافظة البحيرة في ظل تغير العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالي ٠,٣٧، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٦٨ لعينة الدراسة. ويعنى ذلك أن مزارعى

الماضية سواء تمثل ذلك في نقص المتوافر بالأسواق أو الارتفاعات المستمرة في أسعارها. وتتصاعد شكاوى المزارعين بعدم كفاية المقررات السمادية من الأسمدة الكيماوية وعدم توافرها في المواعيد المناسبة للزراعة، ويتطلب ذلك دراسة مدى كفاءة استخدام المزارعين للأسمدة الأزوتية والفوسفاتية وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعى في مصر. ويتبين من تقرير لغرفة الصناعات الكيماوية عن صناعة الأسمدة في مصر عام ٢٠١٥ أن مصر تستهلك سنوياً حوالي ١٠ مليون طن من الأسمدة الأزوتية، وحوالى مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، وحوالى ١٠٠ ألف طن من الأسمدة البوتاسية، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، بينما تستورد الأسمدة البوتاسية. ويتبين كذلك أن إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية يبلغ حوالي ٦,١٦ مليون طن عام ٢٠١٥، بينما يبلغ إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية قرابة ١,٩٦ مليون طن في نفس العام.

ولقد تبين من بيانات عينة الدراسة أن حوالي ٩٥% من مزارعى العينة يشكون من عدم كفاية المقررات السمادية المحددة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة، احتكار عدد قليل من التجار لبيع الأسمدة بما يمكنهم من التحكم في أسعارها. وقد تبين كذلك أن قرابة ٣٢% من مزارعى العينة يستخدمون الأسمدة البوتاسية، وحوالى ٦٨% منهم لا يستخدمونها لارتفاع أسعارها. وقد تبين كذلك أن حوالي ٩٠% من المزارعين ليس لديهم أي فكرة عن الأسمدة الحيوية، وقرابة ٧% منهم لديهم فكرة بسيطة عنها ولكنهم يفضلون استخدام الأسمدة المجرية، وحوالى ٣% من المزارعين قاموا بتجربة لاستخدام أحد أنواع المخصبات الحيوية ويطلق عليه (TS) وهو من إنتاج إحدى الشركات الخاصة التي قامت بعمل دعاية له من خلال الجمعيات الزراعية، ولكنهم لم يقللوا من استخدامهم للأسمدة الأزوتية عند استخدامه، ولم يكرروا استخدامه نظراً لارتفاع سعره، وتأثيره البسيط على زيادة الإنتاج، وقد قام أحد المزارعين بتكرار استخدامه ولكنه وجد جودته قلت، ولم يعد له أي تأثير فعلاً عن استخدامه. أما الأسمدة العضوية فتزايدها قليلاً نسبة المستخدمين لها من مزارعى العينة فقرابة ١٣% من المزارعين استخدموا أحد الأسمدة العضوية المنتج من أحد الشركات الخاصة ويطلق عليه الهمر (الهيموك)، ويجدونه فعال في زيادة إنتاج المحاصيل وخاصة القمح والبرسيم، ويحفزهم على استخدامه تجار المبيدات، وقرابة ١٠% من المزارعين لديهم فكرة عن هذا المنتج ولكنهم لا يلجأون لاستخدامه لارتفاع سعره وارتفاع تكاليف الإنتاج، وحوالى ٧٧% يفضلون استخدام السماد البلدى عن استخدام الأسمدة العضوية.

**تأثير السماد الأزوتي والفوسفاتي على كمية إنتاج الأرز في الأراضي جيدة الصرف:** يبلغ عدد مزارعى الأرز الذين لا يوجد لديهم مشاكل في الصرف في عينة الدراسة ٤٣ مزارع، وقد تم تقدير العلاقة الدالية في صورتها التربيعية بين متوسط إنتاج الفدان من محصول الأرز بالطن في الأراضي جيدة الصرف بمحافظة البحيرة كمتغير تابع، و كل من وحدات الأزوت ووحدات الفوسفات المضافة لفدان الأرز بالكجم كمتغيرات مستقلة مؤثرة على إنتاجية محصول الأرز، وقد تم اشتقاق بعض المؤشرات الاقتصادية من هذه الدالة لتبين منها أن كمية السماد المثلى التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وتحقق تدنية التكاليف هي التي تتضمن ٩٣ كجم وحدة أزوت، ٣٧ كجم وحدة فوسفات للفدان المنزرع بالأرز، بينما المقررات السمادية المحددة لمحصول الأرز (وفقاً لتقديرات معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة) تبلغ ٦٠ كجم وحدة أزوت، ١٥ كجم وحدة فوسفات، ويتضمن المقرر السمادي المسلم للمزارعين من وزارة

$$* \text{ص}^8 \text{ ه} = 20,615 - 0,263 \text{ ه} + 0,01516 \text{ س} - 2, \text{ ه} - 0,392 \text{ س} + 0,00544 \text{ ه} \text{ س} - 2, \text{ ه} \text{ س} = 8,049$$

$$(1,016) \quad (4,214) \quad (4,405) \quad (1,761) \quad (1,324)$$

$$= 0,688 \text{ ه} - 2, \text{ ه} = 0,418$$

حيث ص<sup>٨</sup> القيمة التقديرية لمتوسط إنتاج الفدان من محصول الأرز بالطن، س<sup>٨</sup> ه تمثل وحدات السماد الأزوتي الصافية المضافة لفدان القمح بالكجم، بينما تمثل س<sup>٨</sup> ه وحدات السماد الفوسفاتي الصافية المضافة لفدان الأرز بالكجم. وقد تبنت معنوية النموذج ومعنوية المتغير المعبر عن وحدات السماد الأزوتي عند مستوى ٠,٠١، بينما تبنت معنوية المتغير المعبر عن وحدات السماد الفوسفاتي عند مستوى ٠,٠٥.

\*وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - قطاع الشؤون الاقتصادية - نشرة إحصاءات مستلزمات الإنتاج الزراعى عام ٢٠١٤ - مايو ٢٠١٥.

والفوسفاتي أنها موجبة وأقل من ١ وتبلغ حوالي ٠,٢ ، وقرابة ٠,٥٥ ، لكل منهما على التوالي بمعنى أن إنتاج عنصرى السماد الأزوتى والفوسفاتي من الأرز يقع في المرحلة الثانية للإنتاج ( المنطقة الرشيدة ) والتي يجب فيها تحديد الكمية المستخدمة من هذه العناصر ٠ وقد يعزى ذلك رغم زيادة كمية السماد المستخدمة في تلك الأراضي عن الأراضي جيدة الصرف إلى احتياجها إلى كميات أكبر من الأسمدة حتى تحقق إنتاجية جيدة

و بتقدير الكفاءة الاقتصادية الإنتاجية لعنصر السماد الأزوتى تبين أنها أكبر من الواحد إذ أن قيمة الإنتاجية الحدية لهذا المورد تبلغ قرابة ١١,٧٣ جنيهه و هي تزيد بذلك عن تكلفة استخدام الوحدة من هذا المورد وتبلغ قرابة ٥,٩٩ جنيهه ، كما تم تقدير الكفاءة الاقتصادية الإنتاجية لعنصر السماد الفوسفاتي وتبين أنها أكبر من الواحد إذ أن قيمة الإنتاجية الحدية لهذا المورد تبلغ حوالي ٧٧,٧٨ جنيهه و هي تزيد بذلك عن تكلفة استخدام الوحدة من هذا المورد وتبلغ حوالي ٥,٩٤ جنيهه ٠ و يجب بذلك تقليص الكميات المستخدمة من هذه الموارد حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع سعر الوحدة المستخدمة منها ٠

**تقدير الكفاءة الاقتصادية لإنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف وفقاً لمفهوم الإنتاج لعائد السعة الثابت والمتغير وكفاءة السعة باستخدام تحليل مغلف البيانات (DEA) :** لقد تبين من تقدير الكفاءة الفنية لإنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة في ظل ثبات العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة ٠,٦٣ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٨٦ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن مزارع الأرز في هذه الأراضي يمكنهم زيادة الإنتاج بنسبة تبلغ حوالي ١٣,٨% دون أى زيادة في كمية الأسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم ، و يعكس ذلك وجود فارق في الأسمدة الكيماوية محل الدراسة الأمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف إنتاج الأرز لهؤلاء المزارعين بنفس النسبة ٠

و يتبين باستعراض الكفاءة التوزيعية لإنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة في ظل ثبات العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالي ٠,٨٤ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ قرابة ٠,٩٦ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن إعادة توليف كميات السماد الكيماوى المستخدمة لدى مزارع الأرز في هذه الأراضي يوفر حوالي ٤% من تكاليف الإنتاج لديهم ٠ و يتبين كذلك باستعراض الكفاءة السعرية لإنتاج القمح في هذه الأراضي في ظل ثبات العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة ٠,٦ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ قرابة ٠,٨٣ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن مزارع الأرز في هذه الأراضي يمكنهم تحقيق نفس المستوى من إنتاج الأرز مع تقليل التكاليف المنفقة على السماد الكيماوى بنسبة تبلغ حوالي ١٧,٣% من التكاليف الحالية ٠

و يتبين من نتائج التحليل أن الكفاءة الفنية لإنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة في ظل تغير العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالي ٠,٦٣ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٨٩ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن مزارع الأرز في هذه الأراضي يمكنهم زيادة الإنتاج من الأرز بنسبة تبلغ حوالي ١٠,٧% دون أى زيادة في كمية الأسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم ، و يعكس ذلك وجود فارق في الأسمدة الكيماوية محل الدراسة الأمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف إنتاج الأرز لهؤلاء المزارعين بنفس النسبة ٠

و يتبين باستعراض الكفاءة التوزيعية لإنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة في ظل تغير العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالي ٠,٧٧ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ قرابة ٠,٩٦ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن إعادة توليف كميات السماد الكيماوى المستخدمة لدى مزارع الأرز في هذه الأراضي يوفر حوالي ٤,٢% من تكاليف الإنتاج لديهم ٠ و يتبين كذلك باستعراض الكفاءة السعرية لإنتاج الأرز في هذه الأراضي في ظل تغير العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالي ٠,٦٣ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٨٥ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن مزارع الأرز في هذه الأراضي يمكنهم تحقيق نفس المستوى من الإنتاج مع تقليل التكاليف المنفقة على السماد الكيماوى بنسبة تبلغ حوالي ١٤,٦% من التكاليف الحالية ٠

و يتبين من نتائج تقدير مقدار الإسراف في الأسمدة الكيماوية المستخدمة في الأراضي سيئة الصرف المنزرعة بالأرز في عينة الدراسة في ظل ثبات العائد للسعة أنه يبلغ حوالي ١٤,٢٣ كجم وحدة أزوت ، و حوالي ٦,١١ كجم وحدة فوسفات ، بينما يبلغ مقدار الإسراف في الأسمدة

الأرز في هذه الأراضي يمكنهم زيادة الإنتاج بنسبة تبلغ حوالي ٣٢% دون أى زيادة في كمية الأسمدة الكيماوية المستخدمة لديهم ، و يعكس ذلك وجود فارق كبير في الأسمدة الكيماوية محل الدراسة الأمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف إنتاج الأرز لهؤلاء المزارعين بنفس النسبة ٠

و يتبين باستعراض الكفاءة التوزيعية لإنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة في ظل تغير العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة ٠,٤٧ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٨٨ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن إعادة توليف كميات السماد الكيماوى المستخدمة لدى مزارع الأرز في هذه الأراضي يوفر حوالي ١١,٧% من تكاليف الإنتاج لديهم ٠ و يتبين كذلك باستعراض الكفاءة السعرية لإنتاج الأرز في هذه الأراضي في ظل تغير العائد للسعة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة ٠,٣٥ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٥٩ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن مزارع الأرز في هذه الأراضي يمكنهم تحقيق نفس المستوى من الإنتاج مع تقليل التكاليف المنفقة على السماد الكيماوى بنسبة تبلغ حوالي ٤٠,٦% من التكاليف الحالية ٠

و يتبين من خلال تقدير مقدار الإسراف في الأسمدة الكيماوية المستخدمة في عينة الدراسة في ظل ثبات العائد للسعة أنه يبلغ حوالي ٣٦,٦٦ كجم وحدة أزوت ، وحوالي ١١,٣٤ كجم وحدة فوسفات ، بينما يبلغ مقدار الإسراف في الأسمدة الكيماوية المستخدمة في عينة الدراسة في ظل تغير العائد للسعة حوالي ٣٢,٢٦ كجم وحدة أزوت ، و حوالي ٩,٤١ كجم وحدة فوسفات ٠ و يعنى ذلك وجود إهدار في استخدام الأسمدة الأزوتية و الفوسفاتية أى أنه كان من الممكن تحقيق نفس القدر من إنتاج الأرز بكمية أقل من هذا الأسمدة ، و يؤدي ذلك لانخفاض إنتاجية وحدة الأزوت و الفوسفات من الأرز في الأراضي سيئة الصرف فضلاً عن زيادة غير مبررة لتكاليف الإنتاج - ( جداول ٥ ، ٦ بالملاحق ) و يتبين كذلك أن كفاءة السعة لإنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة تتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالي ٠,٦٣ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ حوالي ٠,٨٨ لعينة الدراسة ٠ و يعنى ذلك أن مزارع الأرز في هذه الأراضي لم يحققوا كفاءة السعة المثلى و يمكنهم الوصول إليها من خلال زيادة إنتاجهم بنسبة تبلغ حوالي ١١,٣% ٠

**تأثير السماد الأزوتى و الفوسفاتي على كمية إنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف :** يبلغ عدد مزارع القمح الذين يعانون من مشاكل في الصرف في عينة الدراسة ٣٨ مزارع ، و قد تم تقدير العلاقة الدالية في صورتها التوزيعية بين متوسط إنتاج الفدان من محصول الأرز بالطن في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة كمتغير تابع ، و كل من وحدات الأزوت و وحدات الفوسفات المضافة لفدان الأرز بالكم كمتغيرات مستقلة مؤثرة على إنتاجية محصول الأرز<sup>٥</sup> ، و تم اشتقاق بعض المؤشرات الاقتصادية من هذه الدالة ليتبين منها أن كمية السماد المثلى التي تحقق الكفاءة الاقتصادية و تحقق تندية التكاليف هي التى تتضمن ٩٣ كجم وحدة أزوت ، ٣٣,٥ كجم وحدة فوسفات للفدان المنزرع بالأرز ، و يزداد بذلك مقدار السماد الأزوتى الذى يحقق تندية التكاليف عن المقرر السمدى المقرر من معهد بحوث الأراضي بنسبة تبلغ حوالي ٥٥% ، و عن المقرر السمدى المقرر للمزارعين من وزارة الزراعة بحوالى ٨٥% ، بينما يزداد مقدار السماد الفوسفاتي الذى يحقق تندية التكاليف عن المقرر السمدى المقرر من معهد بحوث الأراضي بنسبة تبلغ حوالي ١٢٣,٣% ٠

و يتبين كذلك أن كمية وحدات السماد الأزوتية المعظمة لإنتاجية الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة تبلغ قرابة ١٤٦,٦ كجم وحدة أزوت أى بنسبة زيادة تبلغ حوالي ١٤٤,٣% عن المقرر السمدى المقرر من معهد بحوث الأراضي ، و نسبة زيادة تبلغ حوالي ١٩١,٧% عن المقرر السمدى المقرر للمزارعين من وزارة الزراعة ٠ و يبلغ مقدار السماد الفوسفاتي المعظم لإنتاج الأرز في تلك الأراضي قرابة ٣١,٢ كجم وحدة فوسفات أى بنسبة زيادة تبلغ حوالي ١٠٨% عن المقرر السمدى المقرر من معهد بحوث الأراضي ٠

**تحديد المرحلة الاقتصادية لإنتاج عنصرى السماد الأزوتى و الفوسفاتي من الأرز في الأراضي سيئة الصرف :** لقد تبين من تقدير المعدل الحدى للاستبدال التكنولوجى لعنصرى السماد الأزوتى و الفوسفاتي أنه متناقص و يبلغ متوسطه في عينة الدراسة حوالي ٠,١٣١ ، مما يعكس أن إنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة يقع في منطقة الإنتاج الرشيدة ٠ وقد تبين بتقدير المرونة الإنتاجية لعنصرى السماد الأزوتى

حوالي ٢٧,٥ وحدة فوسفات بمتوسط يبلغ قرابة ٢٥,٧ وحدة آزوت ، و انحراف معياري يبلغ قرابة ٨,٧١ وحدة فوسفات ، و خطأ معياري للمتوسط يبلغ قرابة ١,٣٣ وحدة فوسفات . أما كمية السماد الفوسفاتي المستخدمة لزراعة فدان الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة فتتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالي ١٨,٥ وحدة فوسفات و حد أقصى يبلغ حوالي ٧٤,٥ وحدة فوسفات بمتوسط يبلغ قرابة ٣٩,٤١ وحدة فوسفات ، و انحراف معياري يبلغ حوالي ١٢,٦٤ وحدة فوسفات ، و خطأ معياري للمتوسط يبلغ حوالي ٢,٥٥ وحدة فوسفات .

و يتبين من نتائج تحليل اختبارات للفرق بين متوسطي عينتين أو مجموعتين مستقلتين (Independent Samples T Test) أن القيمة الاحتمالية لاختبار ليفين لتجانس التباينات (Levene's Test for Equality of Variances) بين المجموعتين - متمثلتين في كمية السماد الفوسفاتي المستخدمة لزراعة فدان الأرز في الأراضي جيدة و سيئة الصرف - أقل من ٠,٠٥ ، و لذلك نقبل الفرض البديل متمثلاً في عدم تجانس تباين المجموعتين . و يتبين كذلك أن قيمة ت بـ تبلغ حوالي ٥,٦١ ، و أن القيمة الاحتمالية المصاحبة لها أقل من ٠,٠٥ ، و لذلك نقبل الفرض البديل بوجود فرق معنوي بين متوسطي كمية السماد الفوسفاتي المستخدمة لزراعة فدان الأرز في الأراضي جيدة و سيئة الصرف بمحافظة البحيرة - ( جدول ٩ بالملحق ) .

و يتبين مما سبق إسراف المزارعين في إستخدامهم لعنصري السماد الأزوتي و الفوسفاتي ، و يعزى ذلك لعدم توافر الوعي الكافي لهؤلاء المزارعين و ضعف الدور الذي يقوم به المرشدين الزراعيين ، مع إنخفاض الثقة في العاملين بوزارة الزراعة لتبائط حل المشاكل التي يعانون منها .

و يتضح من البحث أن مقدار الإسراف في الأسمدة الكيماوية في الأراضي سيئة الصرف أقل من نظيره في الأراضي جيدة الصرف بالرغم من أن كميات الأسمدة الكيماوية في المستخدمة فيها يفوق مثيله في الأراضي جيدة الصرف . و يعزى ذلك إلى احتياج الأراضي سيئة الصرف لكميات أكبر من الأسمدة الكيماوية لتحقيق قدر مناسب من الإنتاج الذي يتطلب سرعة حل مشاكل الصرف التي يعاني منها المزارعين حتى لا يسبب ذلك مزيد من الإهدار في الأسمدة الكيماوية ، فضلاً عن إنخفاض إنتاجية المحاصيل المنزرعة في هذه الأراضي .

**مشاكل مزارعي العينة و التوصيات :** تتمثل أهم مشاكل مزارعي العينة في إنسداد المصارف بالحشائش ، و عدم تطهير المصارف بصفة دورية مما يؤدي لارتفاع منسوب المياه في الأراضي و زيادة نسبة الملوحة ، و عدم توافر مكابس كافية لقص الأرز ، و ارتفاع تكاليف كبسه أو عقده بما يمثل عبء على المزارعين ، بالإضافة إلى تأخر وصول السماد للجمعية و لذلك يتم الحصول على الأسمدة على دفعتين أو ثلاث ، و تهالك شبكة الصرف المغطى ، و عدم تطهير الترع بصفة دورية و تلوث مياه الترع التي يروى منها بمياه الصرف الصحي . و يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية و مستلزمات الإنتاج جداً بالنسبة للعائد ، و تجر الأسمدة لسوء تخزينها ، و عدم كفاية المقررات السماوية المنصرفة ، و ضعف دور الإرشاد الزراعي في توجيه المزارع . فضلاً عن عدم انضباط فترات المناوبة ، و ضعف المياه أو غلقها أثناء فترات الري في ظل ارتفاع تكاليف الري الارتوازي مما يدفع بعض المزارعين للري من مياه المصرف التي يختلط فيه مياه الصرف الزراعي بالصرف الصحي . و يوصى البحث بضرورة تطهير المصارف المكشوفة بصفة دورية و في بداية الموسم الزراعي ، و تجديد شبكة الصرف المغطى للتغلب على سوء الصرف الزراعي و زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية و الحد من الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية ، بالإضافة إلى ضرورة الرقابة المشددة على تجارة الأسمدة حتى لا يتم غش الأسمدة و التلاعب بالفلاح ، و تذليل كل العقبات أمام المزارعين عند استلام المحاصيل الزراعية و تحديد أسعار مناسبة لها حتى لا يتجه المزارعون للتجار مما يؤدي لاحتكارهم للمحاصيل الزراعية و التحكم بأسعارها . فضلاً عن تبني الجمعية الزراعية لحقول إرشادية في الموسم الشتوي و الصيفي ، و توفير مكابس لقص الأرز و يتم كبسه و أخذه من الفلاح بدون مقابل حتى لا يمثل عبء على الفلاح ، و يوصى البحث كذلك بضرورة تنظيم دورات إرشادية دورية لتوعية المزارعين و الاستماع لمشاكلهم و توجيههم بصفة مستمرة ، و قيام المرشدين الزراعيين بمعاينة دورية للأراضي الزراعية للتعرف على مشاكل المزارعين على الطبيعة ، و توفير الأسمدة المركبة و العضوية و

الكيماوية المستخدمة في عينة الدراسة في ظل تغير العائد للسعة حوالي ١٢,٨١ كجم وحدة آزوت ، و حوالي ٥,١٩ كجم وحدة فوسفات . و يعنى ذلك وجود إهدار في استخدام الأسمدة الأزوتية و الفوسفاتية أي أنه كان من الممكن تحقيق نفس القدر من إنتاج الأرز بكمية أقل من هذا الأسمدة ، و يؤدي ذلك لانخفاض إنتاجية وحدة الأزوت و الفوسفات من الأرز في هذه الأراضي فضلاً عن زيادة غير مبررة لتكاليف الإنتاج - ( جدول ٥ بالملحق ) .

و يتبين كذلك أن كفاءة السعة لإنتاج الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة تتراوح بين حد أدنى يبلغ قرابة ٠,٠٨ ، و حد أقصى يبلغ حوالي ١ بمتوسط يبلغ قرابة ٠,٩٧ لعينة الدراسة . و يعنى ذلك أن مزارعي الأرز في هذه الأراضي لم يحققوا كفاءة السعة المثلى و يمكنهم الوصول إليها من خلال زيادة إنتاجهم بنسبة تبلغ حوالي ٣,٤% حتى يتحقق الحجم الأمثل للإنتاج .

**اختبار الفرق بين متوسطي إنتاجية الأرز و متوسطي الكمية المستخدمة من السماد الأزوتي و الفوسفاتي في الأراضي جيدة و سيئة الصرف :** يبلغ عدد أفراد العينة ١٢٤ مزارع ٤٣ منهم لم يقوموا بزراعة الأرز ، و يبلغ عدد مزارعي العينة الذين قاموا بزراعة الأرز في أراضي جيدة الصرف ٤٣ مزارع ، بينما يبلغ عدد المزارعين الذين قاموا بزراعته في أراضي سيئة الصرف ٣٨ مزارع .

و تتراوح إنتاجية فدان الأرز في الأراضي جيدة الصرف و سيئة الصرف بمحافظة البحيرة بين حد أدنى يبلغ حوالي ٢ طن و حد أقصى يبلغ حوالي ٤ طن . و يبلغ متوسط إنتاجية فدان الأرز في الأراضي جيدة الصرف حوالي ٣,١٤ طن ، و انحراف معياري يبلغ حوالي ٠,٥٣ طن ، و خطأ معياري للمتوسط يبلغ حوالي ٠,٠٨ طن . أما متوسط إنتاجية فدان الأرز في الأراضي سيئة الصرف فيبلغ حوالي ٢,٧١ طن ، و انحراف معياري يبلغ حوالي ٠,٥١ طن ، و خطأ معياري للمتوسط يبلغ حوالي ٠,٠٨ طن .

و يتبين من نتائج تحليل اختبارات للفرق بين متوسطي عينتين أو مجموعتين مستقلتين (Independent Samples T Test) أن القيمة الاحتمالية لاختبار ليفين لتجانس التباينات (Levene's Test for Equality of Variances) بين المجموعتين - متمثلتين في إنتاجية الأرز لمزارعي الأراضي جيدة و سيئة الصرف - أكبر من ٠,٠٥ ، لذلك نقبل الفرض الصفري متمثلاً في تجانس تباين المجموعتين . و يتبين كذلك أن قيمة ت بـ تبلغ حوالي ٣,٦٩ ، و أن القيمة الاحتمالية المصاحبة لها أقل من ٠,٠٥ ، و لذلك نقبل الفرض البديل بوجود فرق معنوي بين متوسطي إنتاجية الأرز في الأراضي جيدة و سيئة الصرف بمحافظة البحيرة - ( جدول ٧ بالملحق ) .

و تتراوح كمية السماد الأزوتي المستخدمة لزراعة فدان الأرز في الأراضي جيدة الصرف بمحافظة البحيرة في صورة وحدات الأزوت الصافية بين حد أدنى يبلغ حوالي ٤١,٢ وحدة آزوت و حد أقصى يبلغ حوالي ١٣٩,٥ وحدة آزوت بمتوسط يبلغ حوالي ٨٦ وحدة آزوت ، و انحراف معياري يبلغ حوالي ٢٥,٢٧ وحدة آزوت ، و خطأ معياري للمتوسط يبلغ حوالي ٣,٨٥ وحدة آزوت . أما كمية السماد الأزوتي المستخدمة لزراعة فدان الأرز في الأراضي سيئة الصرف بمحافظة البحيرة فتتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالي ٦٧,١ وحدة آزوت و حد أقصى يبلغ حوالي ١٣٩,٥ وحدة آزوت بمتوسط يبلغ قرابة ٩٥,٥ وحدة آزوت ، و انحراف معياري يبلغ قرابة ١٦,٤٢ وحدة آزوت ، و خطأ معياري للمتوسط يبلغ حوالي ٢,٦٦ وحدة آزوت .

و يتبين من نتائج تحليل اختبارات للفرق بين متوسطي عينتين أو مجموعتين مستقلتين (Independent Samples T Test) أن القيمة الاحتمالية لاختبار ليفين لتجانس التباينات (Levene's Test for Equality of Variances) بين المجموعتين - متمثلتين في كمية السماد الأزوتي المستخدمة لزراعة فدان الأرز في الأراضي جيدة و سيئة الصرف - أقل من ٠,٠٥ ، و لذلك نقبل الفرض البديل متمثلاً في عدم تجانس تباين المجموعتين . و يتبين كذلك أن قيمة ت بـ تبلغ قرابة ٢,٠٢ ، و أن القيمة الاحتمالية المصاحبة لها أقل من ٠,٠٥ ، و لذلك نقبل الفرض البديل بوجود فرق معنوي بين متوسطي كمية السماد الأزوتي المستخدمة لزراعة فدان الأرز في الأراضي جيدة و سيئة الصرف بمحافظة البحيرة - ( جدول ٨ بالملحق ) .

و تتراوح كمية السماد الفوسفاتي المستخدمة لزراعة فدان الأرز في الأراضي جيدة الصرف بمحافظة البحيرة في صورة وحدات الأزوت الصافية بين حد أدنى يبلغ حوالي ٩,٢٥ وحدة فوسفات و حد أقصى يبلغ

### جدول ٢. توزيع عينة الدراسة على المراكز المختارة في محافظة البحيرة لمتوسط الفترة ٢٠١٣-٢٠١٥ .

المركز	عدد الحائزين		المساحة المنزرعة		الحياسة
	العدد	%	بالفدان	%	
أبو حمص	٤٦٢٦٦	٢٢.١١	٨٢٠٩٢	٢٣.٨٩	٢٣.١٣
كفر الدوار	٣٥٨٤٢	١٧.١٢	٧١٢٨٤	٢٠.٧٥	١٨.٩٧
الدلتجات	٣٢٠٤١	١٥.٣١	٦٩٤٢٣	٢٠.٢١	١٧.٧٠
كوم حماده	٤٤٥٦٨	٢١.٢٩	٦٠٦١٤	١٧.٦٤	١٩.٥٠
دمنهور	٥٠٥٩١	٢٤.١٧	٦٠١٦٠	١٧.٥١	٢٠.٧٠
الإجمالي	٢٠٩٣٠٨	١٠٠	٣٤٨١٦٨	١٠٠	١٠٠

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات مديرية الزراعة بالبحيرة- إدارة الشؤون الزراعية- التعاون والحياسة- بيانات غير منشورة.

### جدول ٣. الأهمية النسبية لمحافظة البحيرة في إنتاج الأرز بين مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمتوسط الفترة ٢٠١١-٢٠١٥ .

البيان المحافظة	الإنتاج بالألف طن	الأهمية النسبية %
الدقهلية	١٨١٩,٤٥٨	٣٢,٩٧
كفر الشيخ الشرقية	١١٠١,٧٨٧	١٩,٩٦
البحيرة الغربية	٩٠١,٠٤٢	١٦,٣٢
محافظة أخرى	٧٧٣,٣٣٢	١٤,٠١
إجمالي الجمهورية	٥٢٧,٤١٠	٩,٥٦
	٣٩٦,٠٨٦	٧,١٨
	٥٥١٩,١١٥	١٠٠

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات نشرات قطاع الشؤون الاقتصادية - أعداد مختلفة - وزارة الزراعة .

### جدول ٤. الأهمية النسبية لمختلف المحاصيل الصيفية المنزرعة بمحافظة البحيرة لمتوسط الفترة ٢٠١١-٢٠١٥ .

البيان المركز	المساحة بالألف فدان	الأهمية النسبية %
الأرز	١٨٧,٧٧١	٣٥,٠٤
الذرة الشامية الصيفي	١٨٢,٣٢٦	٣٤,٠٣
القطن	٨٩,٨٧١	١٦,٧٧
محاصيل أخرى	٧٥,٨٨٤	١٤,١٦
المساحة المحصولية	٥٣٥,٨٥٢	١٠٠

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات نشرات قطاع الشؤون الاقتصادية - أعداد مختلفة - وزارة الزراعة .

### جدول ٥. مقدار الإسراف و المستهدف في وحدات الأرز و الفوسفات المستخدمة لإنتاج الأرز بالكجم .

السماد	الأراضي جيدة الصرف ( في ظل ثبات العائد للسعة) الفعلي المستهدف الإسراف	الأراضي سيئة الصرف ( في ظل ثبات العائد للسعة) الفعلي المستهدف الإسراف
الأزوتي	٤٩,٣٤	٣٦,٦٦
الفوسفاتي	٢٥,٦٩	١٤,٣٥
المصدر: نتائج التحليل الإحصائي لبيانات العينة باستخدام برنامج DEA .	١١,٣٤	٣٩,٤١

### جدول ٦. مقدار الإسراف و المستهدف في وحدات الأرز و الفوسفات المستخدمة لإنتاج الأرز بالكجم .

السماد	الأراضي جيدة الصرف ( في ظل تغير العائد للسعة) الفعلي المستهدف الإسراف	الأراضي سيئة الصرف ( في ظل تغير العائد للسعة) الفعلي المستهدف الإسراف
الأزوتي	٥٣,٧٤	٣٢,٢٦
الفوسفاتي	٢٥,٦٩	١٦,٢٨
المصدر: نتائج التحليل الإحصائي لبيانات العينة باستخدام برنامج DEA .	٩,٤١	٣٩,٤١

### جدول ٧. اختبارات للفرق بين متوسطي إنتاجية محصول الأرز في الأراضي جيدة و سيئة الصرف .

	Levene's Test for Equality of Variances		T-Test for Equality of Means		Sig. (2-tailed)
	F	Sig.	t	df	
Equal variances assumed	0.022	0.884	3.691	79	.000
Equal variances not assumed			3.700	78.397	.000

المصدر: حسب من بيانات عينة الدراسة

الحيوية بالجمعيات الزراعية ، و عمل حقول إرشادية لبيان تأثيرها و إقناع الفلاحين باستخدامها .

## المراجع

سعید محمد فؤاد ، أمال محمد المغازی (دكاترة) - دراسة اقتصادية لإنتاج محصول الأرز بمحافظة الشرقية - المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي- المجلد (١٧) - العدد (٢)- يونيو ٢٠٠٧ .  
سمر محمود عبد العظيم - اقتصاديات إنتاج بعض محاصيل الحبوب تحت الظروف البيئية في الأراضي الجديدة - رسالة دكتوراه - قسم العلوم الزراعية - معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة عين شمس - ٢٠١١ .

شريف الجبلى (دكتور) - صناعة الأسمدة في مصر - غرفة الصناعات الكيماوية - اتحاد الصناعات المصرية - ٢٠١٥ .

عصام صبرى (دكتور) ، أخرون (دكاترة) - دراسة اقتصادية لكفاءة استخدام الموارد الزراعية فى إنتاج محصول الزيتون فى محافظة شمال سيناء - المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي- المجلد (٢٠) - العدد (٣)- سبتمبر ٢٠١٠ .

فؤاد بن محمد الأقسام - تحليل اقتصادى لواقع و اتجاهات استخدام الأسمدة الكيماوية و علاقتها بالإنتاج النباتى فى المملكة العربية السعودية - بحث مقدم استكمالاً لدرجة بكالوريوس العلوم فى الاقتصاد الزراعي- قسم الاقتصاد الزراعي - كلية علوم الأغذية و الزراعة - جامعة الملك سعود - السعودية - ٢٠٠٦ .  
مختار عبد الحفيظ عبد المجيد - دراسة اقتصادية لاستخدام الأسمدة الكيماوية فى الزراعة المصرية - رسالة ماجستير - قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة المنيا - ٢٠٠٩ .

مديرية الزراعة بالبحيرة - إدارة الشؤون الزراعية - التعاون و الحياسة - بيانات غير منشورة - ٢٠١٥ .

وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي - قطاع الشؤون الاقتصادية - نشرة الإحصاءات الزراعية - القاهرة - أعداد مختلفة .

وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي - قطاع الشؤون الاقتصادية - نشرة إحصاءات مستلزمات الإنتاج الزراعي عام ٢٠١٤ - مايو ٢٠١٥ .

Awudu Abdulai & Wallace Huffman - Structural Adjustment and Economic Efficiency of Rice Farmers in Northern Ghana - Economic Development and Cultural Change - Vol. 48, No. 3 (April 2000).

Le Quang Long, others - Study on Economic Efficiency in Rice Production of Cuu Long Delta - Cuu Long Delta Rice Research Institute -Vietnam, Vol. 19 - 2013.

Souleymane Ouedraogo (dr) - Technical and Economic Efficiency of Rice Production on the Irrigated Plain of Bagre (Burkina Faso): A Stochastic Frontier Approach - Social Sciences Institute - Journal of Economics and Sustainable Development - Burkina Faso - Vol.6, No.14, 2015.

## الملحق

### جدول ١. الأهمية النسبية لمراكز محافظة البحيرة من حيث المساحة المحصولية لمتوسط الفترة ٢٠١٣-٢٠١٥ .

البيان المركز	المساحة المحصولية بالألف فدان	الأهمية النسبية %
أبو حمص	٢٦٦,٠٤٩	٢٠,٤٣
كفر الدوار	١٤٩,٧١٧	١١,٥٠
الدلتجات	١٤٢,٩١٧	١٠,٩٧
كوم حماده	١٢٤,٩٩٩	٩,٦٠
دمنهور	١٢٣,١٣٢	٩,٤٦
مراكز أخرى	٤٩٥,٢٩٩	٣٨,٠٤
الإجمالي	١٣٠٢,١١٣	١٠٠

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات مديرية الزراعة بالبحيرة- إدارة الشؤون الزراعية- التعاون و الحياسة- بيانات غير منشورة

جدول ٩. اختبارات للفرق بين متوسطي الكمية المستخدمة من وحدات السماد الفوسفاتية الصافية لإنتاج محصول الأرز في الأراضي جيدة وسينة الصرف .

	Levene's Test for Equality of Variances		T-Test for Equality of Means		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)
Equal variances assumed	5.826	0.018	- 5.740	79	.000
Equal variances not assumed			- 5.614	64.528	.000

المصدر: حسب من بيانات عينة الدراسة

جدول ٨. اختبارات للفرق بين متوسطي الكمية المستخدمة من وحدات السماد الأزوتى الصافية لإنتاج محصول الأرز في الأراضي جيدة وسينة الصرف .

	Levene's Test for Equality of Variances		T-Test for Equality of Means		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)
Equal variances assumed	8.276	0.005	- 1.969	79	.052
Equal variances not assumed			- 2.019	72.829	.047

المصدر: حسب من بيانات عينة الدراسة

## An economic study of the efficiency of the usage of chemical fertilizers in the production of the most important summer crops in Beheira Governorate

Rania A. Elshaer

Senior Res. Agricultural Economics Res. Instit., Agric.Res.Center

### ABSTRACT

This research aims mainly to identify the effect of the chemical fertilizers usage efficiency on rice crop productivity, and also the effect of agricultural drainage problems on the efficiency of the fertilizers usage and rice crop productivity in Beheira Governorate, as well as to determine the amount of wastage in chemical fertilizer usage. In addition to that the research aims to determine the economic phase of chemical fertilizers production of rice, as well as to identify the problems and obstacles faced by the farmers in the usage of chemical fertilizers and affect the productivity of rice crop so that the policy makers can put clear policies to increase the efficiency of the distribution and usage of this important Egyptian agricultural input, as well as to identify the extent of the growers knowledge and usage of organic and bio- fertilizers . The research shows that rice accounts for about 35% of the total area of summer crops cultivated in Beheira during the period (2011 – 2015) and it also shows the decreasing of rice productivity in Beheira during the period (2006 – 2015). The research results show that the amount of nitrogenous fertilizer units which achieve the maximum productivity of rice in good and bad drainage soils is more than the estimated amount of nitrogen fertilizer units by about (44.5-144.3) % ,and more than the amount delivered to farmers from the Ministry of Agriculture by about (72.5-191.7) % .The amount of phosphate fertilizer which achieves the maximum productivity of rice in good and bad drainage soils is also more than the estimated amount of phosphate fertilizer units by about (108 - 136) % . The research results also show that the nitrogenous and phosphate fertilizer productivity of rice in good drainage soils located in the third stage of production and that means that the production is decreasing for the negative marginal productivity of these elements, however in bad agricultural drainage soils these elements productivity located in the second stage of production. The research has estimated the wastage in chemical fertilizers used in the study sample in good drainage soils ranges from about (32.26 – 36.66) kg nitrogen unit, and about (9.41 - 11.34) kg Unit phosphate, however the wastage in chemical fertilizers used in the study sample in bad agricultural drainage soils ranges from about (12.81 - 14.23) kg nitrogen unit, and about (5.19 - 6.11) kg phosphate Unit, this is due to the need of bad agricultural drainage soils for larger quantities of fertilizers in order to achieve good productivity. The research shows that rice farmers in good agricultural drainage soils can increase their production by about (32 - 39.9) % , and rice farmers in bad agricultural drainage soils can increase their production by about (10.7 to 13.8) % without any increase in the amount of chemical fertilizers used, that means that there is wastage in the usage of chemical fertilizers, which leads to lower nitrogen and phosphate unit productivity of rice in those soils as well as the unjustified increase of production costs . The study recommends the need to eliminate agricultural drainage problems, the need for strict control on fertilizers trade. In addition to that the government must overcome all obstacles to farmers at time of the receipt of agricultural crops and determine appropriate prices for these crops to stop traders monopoly of agricultural crops and control of their prices. as well as providing rice straw compressors and collecting the straw from the farmers without money instead of burning it . The study also recommends the need to organize guiding courses to educate farmers and listen to their problems and guide them continuously, as well as the need to provide organic, compound and bio-fertilizers in agricultural associations, prepare indicative fields to persuade farmers with these fertilizers benefits.

٥ ص ٤٤٧٨ + ٠٠١٩٣٨ س ١ هـ - ٠٠٠٠٦٦١ س ٢ هـ - ٠٠٢١٢ س ٣ هـ + ٠٠٠٣٤٠١ س ٤ هـ - ١٠٠٦١٨ = ف  
 (٤٠٥٠٨) (٥٠١٢٢) (١٠٨٢٤-) (٣٠٣٠٨ -) (٣٠٥١٦) (٣٠٧٥٠ = ر - ٢ = ٠٠٥١٠  
 حيث ص ٨ هـ القيمة التقديرية لمتوسط إنتاج الفدان من محصول الأرز بالطن في الأراضي سينة الصرف بمحافظة البحيرة ، س ٤ هـ تمثل وحدات السماد الأزوتى الصافية المضافة لفدان الأرز بالكجم ، بينما تمثل س ٣ هـ وحدات السماد الفوسفاتى الصافية المضافة لفدان الأرز بالكجم . وقد ثبتت معنوية النموذج و معنوية المتغيرات المستقلة عند مستوى ٠٠٠٠١ .